



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY.

4478^a

Exchange

July 22, 1908 - March 10, 1909.

JUL 22 1908

4978^a

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
DE LA SOCIÉTÉ
DES SCIENCES
PHYSIQUES ET NATURELLES

DE BORDEAUX

Année 1906-1907

PARIS

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES

Quai des Augustins, 55

A BORDEAUX

CHEZ FERET & FILS, LIBRAIRES

15, cours de l'Intendance, 15

1907

LIBRARY
HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASS.

JUL 22 1908

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
DE LA SOCIÉTÉ DES
SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES
DE BORDEAUX

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
DE LA SOCIÉTÉ
DES SCIENCES
PHYSIQUES ET NATURELLES

DE BORDEAUX

Année 1906-1907

PARIS

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES

Quai des Augustins, 55

A BORDEAUX

CHEZ FERET & FILS, LIBRAIRES

15, cours de l'Intendance, 15

1907

200

LISTE

DES

PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS DE LA SOCIÉTÉ

DE 1853 A 1907

ANNÉE	PRÉSIDENT	VICE-PRÉSIDENT
1853-1854	BAZIN	DELBOS
1854-1855	BAZIN	»
1855-1856	BAZIN	»
1856-1857	ORÉ	»
1857-1858	BAUDRIMONT	»
1858-1859	BAZIN	»
1859-1860	BAUDRIMONT	»
1860-1861	ABRIA	»
1861-1862	LESPIAULT	ORÉ
1862-1863	BAUDRIMONT	ROYER
1863-1864	ORÉ	AZAM
1864-1865	AZAM	ROYER
1865-1866	ROYER	H. GINTRAC
1866-1867	H. GINTRAC	O. DE LACOLONGE
1867-1868	O. DE LACOLONGE	GLOTIN
1868-1869	GLOTIN	JEANNEL
1869-1870	LINDER	DELFORTERIE
1870-1871	LINDER	DELFORTERIE
1871-1872	DELFORTERIE	ABRIA
1872-1873	ABRIA	RATHEAU
1873-1874	BAUDRIMONT	SERRÉ-GUINO
1874-1875	SERRÉ-GUINO	BAYSSELLANCE
1875-1876	BAYSSELLANCE	LOQUIN

ANNÉE	PRÉSIDENT	VICE-PRÉSIDENT
1876-1877	LOQUIN	HAUTREUX
1877-1878	HAUTREUX	E. BOUTAN
1878-1879	E. BOUTAN	MICÉ
1879-1880	DUPUY	MILLARDET
1880-1881	MILLARDET	DE LAGRANVAL
1881-1882	DE LAGRANVAL	G. RAYET
1882-1883	G. RAYET	FOURNET
1883-1884	G. RAYET	FOURNET
1884-1885	G. RAYET	FOURNET
1885-1886	G. RAYET	BOUCHARD
1886-1887	G. RAYET	BOUCHARD
1887-1888	G. RAYET	AZAM
1888-1889	G. RAYET	TANNERY
1889-1890	TANNERY	GAYON
1890-1891	AZAM	GAYON
1891-1892	DUPUY	GAYON
1892-1893	DROGUET	BLAREZ
1893-1894	BAYSSELLANCE	BLAREZ
1894-1895	BLAREZ	HAUTREUX
1895-1896	DE LAGRANVAL	HAUTREUX
1896-1897	DURÈGNE	BOULOUGH
1897-1898	BOULOUGH	STROHL
1898-1899	STROHL	RENOUS
1899-1900	RENOUS	SARRAN
1900-1901	SARRAN	BARTHE
1901-1902	BARTHE	CARLES
1902-1903	CARLES	CARMIGNAC-DESCOMBES
1903-1904	CARMIGNAC-DESCOMBES	BARBARIN
1904-1905	BARBARIN	DE NABIAS
1905-1906	DE NABIAS	LOISEAU
1906-1907	LOISEAU	CHADU

LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Pendant l'année 1906-1907.

COMPOSITION DU BUREAU POUR L'ANNÉE 1906-1907.

MM. LOISEAU, *	<i>Président.</i>	
CHADU, *	<i>Vice-Président.</i>	
VÈZES,	<i>Secrétaire général.</i>	
RICHARD,	} <i>Secrétaires adjoints.</i>	
HUGOT,		
PRÉVOST,	<i>Archiviste.</i>	
DE SAINT-MARTIN,	<i>Archiviste adjoint.</i>	
CHEVALLIER,	<i>Trésorier.</i>	
BARBARIN,	} <i>Membres du Conseil.</i>	
BARTHE, *		
BAYSSELLANCE, O. *,		
BLAREZ,		
BOULOUGH,		
CARLES,		
FIGUIER, *		
DE LAGRANDEVALL, *		
DE NABIAS, *		
PÉREZ, *		
RENOUS,		
SARRAN,		

MEMBRES TITULAIRES (1).

- MM. ARRIVAUT, préparateur à la Faculté des Sciences.
AULNAY (D'), propriétaire à Mérignac.
BARBARIN, professeur au Lycée.
BARCKHAUSEN, O. *, professeur à la Faculté de Droit.
BARTHE, *, professeur à la Faculté de Médecine.
BAUDEUF (M^{re}), professeur au Lycée de jeunes filles.
BAYSSELLANCE, O. *, ingénieur des Constructions navales en retraite, ancien maire de Bordeaux.
BERGONIÉ, *, professeur à la Faculté de Médecine.
BLAREZ, professeur à la Faculté de Médecine.
BOULLAY, professeur au Lycée.
BOULOUGH, professeur au Lycée.
BOYER, préparateur à la Faculté des Sciences.

(1) Les membres dont le nom est précédé d'un astérisque sont membres à vie.

- MM. CARLES, agrégé à la Faculté de Médecine.
CARMIGNAC-DESCOMBES, *, ingénieur, percepteur à Bordeaux.
CAUBET, professeur à la Faculté des Sciences.
CAVALIÉ, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.
CHADU, professeur au Lycée.
CHAINED, professeur à la Faculté des Sciences.
*CHAPON, directeur des imprimeries de *La Gironde*.
CHATEAU, licencié ès sciences, pharmacien-major.
CHENEVIER, chimiste en chef au chemin de fer du Midi.
CHEVALLIER, docteur ès sciences, préparateur à la Faculté des Sciences.
CHIPART, ingénieur des Mines.
COLOT, licencié ès sciences, professeur de Mathématiques.
COUSIN, professeur à la Faculté des Sciences.
DEBRUN, chimiste en chef des Douanes à Nice.
DELVAL, ingénieur des Manufactures de l'État.
DENIGÈS, *, professeur à la Faculté de Médecine.
DESBROUSSES, ingénieur des Manufactures de l'État.
DEVAUX, professeur à la Faculté des Sciences.
DOUBLET, astronome à l'Observatoire.
DUBAQUIÉ (l'abbé), licencié ès sciences.
DUBOURG, professeur à la Faculté des Sciences.
DUCELLIEZ, préparateur à la Faculté des Sciences.
DUFFOUR, professeur au Lycée.
DUHEM, correspondant de l'Institut, professeur à la Faculté des Sciences.
DUPOUY, professeur à la Faculté de Médecine.
DURÈGNE, ingénieur des Télégraphes.
ELLIE, ingénieur civil.
ESCLANGON, professeur à la Faculté des Sciences.
FALLOT, professeur à la Faculté des Sciences.
FIGUIER, *, professeur honoraire à la Faculté de Médecine.
GADEN, négociant.
GARD, chef des travaux à la Faculté des Sciences.
GAULNE (de), propriétaire.
*GAYON, O. *, correspondant de l'Institut, doyen de la Faculté des Sciences, chimiste en chef à la Douane.
GOGUEL, professeur à la Faculté des Sciences.
GOSSART, professeur à la Faculté des Sciences.
GOUTTES, inspecteur divisionnaire du travail à Bordeaux.
HAUTREUX, *, lieutenant de vaisseau, directeur des mouvements du port en retraite.
HOCHART, propriétaire.
HUGOT, docteur ès sciences, chef de travaux à la Faculté des Sciences.
ISSALY (l'abbé), licencié ès sciences mathématiques.
JOLYET, *, professeur à la Faculté de Médecine.
JOUET, propriétaire.
JOUQUET, professeur à l'École des Mines de Saint-Étienne.
KOWALSKI, professeur de Mathématiques.
KOWALSKI (J^e), docteur ès sciences.
LABATUT, préparateur à la Faculté des Sciences.
LABORDE, docteur ès sciences, sous-directeur de la Station agronomique.
LAGACHE, ingénieur des Arts et Manufactures.

MM. LAGRANVAL (DE), *, professeur honoraire de Mathématiques spéciales au Lycée.

LAMY, architecte.

LANDE, O. *, ancien maire de Bordeaux, professeur à la Faculté de Médecine.

LASSERRE, chimiste des Douanes.

LENOBLE, maître de conférences à la Faculté des Sciences de Lille.

LOISEAU, *, ingénieur en chef des Poudres et Salpêtres.

LOISELEUR, professeur au Lycée.

MANVILLE, docteur ès sciences, préparateur à la Faculté des Sciences.

MARCHIS, professeur à la Faculté des Sciences.

***MICE, O. ***, recteur honoraire.

MORISOT, préparateur à la Faculté des Sciences.

MOULINE, professeur de Sciences.

NABIAS (DE), *, doyen de la Faculté de Médecine.

PADE, doyen de la Faculté des Sciences.

PALMADE, professeur au Lycée de Montpellier.

PÉLABON, professeur à la Faculté des Sciences de Lille.

PÉREZ (J.), *, professeur honoraire à la Faculté des Sciences.

PÉREZ (Ch.), professeur à la Faculté des Sciences.

PICART, professeur à la Faculté des Sciences, directeur de l'Observatoire.

PIETTRE, professeur au Lycée d'Oran.

PITARD, professeur à l'École de Médecine de Tours.

PRÉVOST, ingénieur civil des Mines.

RENOUS, ingénieur civil.

RICHARD, docteur ès sciences, chef des travaux chimiques à la Faculté des Sciences.

ROCH, chimiste.

ROCHOUX, industriel.

ROZIER, professeur de Mathématiques.

SAINT-MARTIN (DE), propriétaire.

SANSON, professeur au Lycée.

***SARRAN**, professeur au Lycée.

SAUVAGEAU, professeur à la Faculté des Sciences.

SERRES, professeur au Lycée.

SOULARD, industriel.

VALLANDÉ (DE), docteur-médecin au Porge (Gironde).

VÉZES, professeur à la Faculté des Sciences.

VIAULT, *, professeur à la Faculté de Médecine.

VIGOUROUX, professeur à la Faculté des Sciences.

MEMBRES HONORAIRES

MM. BERTIN, membre de l'Institut, directeur du Génie maritime.

DARBOUX (G.), C. *, membre de l'Institut, doyen honoraire de la Faculté des Sciences de Paris.

LINDER, O. *, inspecteur général des Mines, à Paris.

PIONCHON, *, professeur à la Faculté des Sciences de Dijon.

ROUX, *, directeur de l'Institut Pasteur, à Paris.

VOLTERRA, membre de l'Université royale de Rome.

MEMBRES CORRESPONDANTS

- MM. ANDREEFF, professeur à l'Université de Kharkof.
ARDISSONE, professeur de Botanique à l'École Royale d'Angleterre de Milan.
ARIÈS, capitaine du Génie.
CERTZU (Max.), professeur au Gymnase de Thorn.
CHAVASTELON, professeur à la Faculté des Sciences de Clermont.
DILLNER (G.), professeur à l'Université d'Upsal.
ÉLIE, professeur au collège d'Abbeville.
ERNST (A.), professeur d'Histoire naturelle à l'Université de Caracas.
GAUTHIER-VILLARS, *, libraire-éditeur, à Paris.
GOMES TEIXEIRA (F.), professeur de l'Université de Coïmbre.
GUIMARAÈS, membre de l'Académie de Lisbonne.
GÜNTHER (Dr. Sig.), professeur au Gymnase d'Ansbach.
HADAMARD, professeur à la Sorbonne.
HAYDEN, géologue du Gouvernement des États-Unis.
LAISANT, *, ancien officier du Génie.
MUELLER (baron Ferd. von), membre de la Société Royale de Londres
directeur du Jardin Botanique de Melbourne (Australie).
PICART, professeur de Botanique en retraite, à Marmande (Lot-et-Garonne).
ROIG Y TORRES (D. Rafael), naturaliste à Barcelone, directeur de la
Crónica Científica.
WEYR (Ed.), professeur à l'Université de Prague.
ZAWODNY (D'), à Vienne.
-

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES DE BORDEAUX

Séance du 26 octobre 1906.

PRÉSIDENCE DE M. DE NABIAS

Le scrutin pour le renouvellement du Bureau de la Société pour l'année 1906-1907 donne les résultats suivants :

<i>Président.</i>	M. LOISEAU.
<i>Vice-Président.</i>	M. CHADU. .
<i>Secrétaire général.</i>	M. VÈZES.
<i>Archiviste.</i>	M. PRÉVOST.
<i>Archiviste adjoint.</i>	M. DE SAINT-MARTIN.
<i>Trésorier</i>	M. CHEVALLIER.
<i>Secrétaires adjoints.</i>	MM. HUGOT et RICHARD.

Le scrutin pour l'élection des membres du Conseil renouvelables en 1906 fournit les résultats suivants :

Sont élus : MM. Carles, Figuié, Pérez, Renous.

En conséquence, le Conseil, pour l'année 1906-1907, est composé comme suit :

Conseil d'administration (1906-1907):

1 ^{re} SÉRIE	2 ^{me} SÉRIE	3 ^{me} SÉRIE
Renouvelable en 1907	Renouvelable en 1908	Renouvelable en 1909
MM. BAYSSELLANCE. BLAREZ. BOULOUGH. DE LAGRANVAL.	MM. BARBARIN. BARTHE. DE NABIAS. SARRAN.	MM. CARLES. FIGUIER. PÉREZ. RENOUS.

Sont ensuite élus membres de la Commission des finances et d'impression : MM. Baysse, Boulou, Carles, de Lagrandval, Pérez.

M. de Nabias, avant de procéder à l'installation du nouveau bureau, félicite les membres élus et tout particulièrement M. Chadu, récemment nommé chevalier de la Légion d'honneur.

La Société charge M. Barbarin de rédiger une notice sur M. de Tilly, membre honoraire de la Société. Cette notice sera insérée dans le prochain volume des Procès-verbaux.

Sur les risques d'incendie des usines de résine;

Par M. VÈZES.

II

Dans l'étude que nous avons consacrée précédemment (séance du 10 mai 1906) aux risques d'incendie des usines de résine, nous avons principalement eu en vue le cas des usines où la distillation est précédée d'une préparation (fusion préalable) de la térébenthine. Lorsqu'on distille à cru, c'est-à-dire sans cette opération préliminaire, une nouvelle cause d'incendie, heureusement facile à éviter, vient s'adjoindre à celles que nous avons énumérées.

Dans ce cas, en effet, les impuretés solides (griches et grep) que contient la gemme sont introduites avec elle dans l'appareil distillatoire et se retrouvent, après la distillation et la coulée des produits secs, sur les tamis en toile métallique que vient de traverser la colophane. Ces débris solides sont imprégnés de colophane fondue et présentent au contact de l'air une surface relativement considérable; ils sont, au moment où s'achève la filtration de la colophane, à une température d'au moins 140°; enfin, la colophane qui les imprègne les rend très mauvais conducteurs de la chaleur. Or, on sait que l'oxydation que subit la colophane au contact de l'air est d'autant plus rapide que la surface de contact est plus grande et la température plus élevée; à 140°, en particulier, sa vitesse est déjà notable. Elle dégage de la chaleur et, vu la mauvaise conductibilité de la colophane, la chaleur ainsi dégagée ne peut se transmettre aux corps environnants : la réaction est pratiquement adiabatique. Elle ira donc en s'accéléérant, et la température, s'élevant de plus en plus, finira par atteindre le point nécessaire pour l'inflammation des vapeurs de colophane. Ainsi

s'explique l'inflammation spontanée, plusieurs fois constatée par les industriels landais pendant les journées chaudes de l'été, des résidus de distillation à cru. Pour l'éviter, il suffit de « noyer » ces résidus, en vidant le tamis, aussitôt la filtration achevée, dans un bassin plein d'eau. Cette simple précaution, qui ne doit jamais être négligée, suffit pour que les usines landaises n'aient plus à craindre d'incendie provoqué par la combustion spontanée de ces résidus.

Sur le mécanisme d'action des anesthésiques généraux;

Par le D^r DE NABIAS.

Le mécanisme d'action des anesthésiques généraux doit être cherché dans les phénomènes intimes qui se passent dans l'intérieur des cellules vivantes soumises à leur atteinte.

Malgré les essais de Cl. Bernard⁽¹⁾ et de Binz⁽²⁾ dirigés dans ce sens, ces phénomènes sont encore à peu près inconnus.

Raphaël Dubois⁽³⁾ a émis l'ingénieuse idée que l'anesthésie, phénomène général dans toute cellule vivante, était due à une élimination d'eau causée par l'action de l'agent anesthésique. Tout anesthésique général, d'après ce savant, exerce une action déshydratante sur les cellules, augmente la tension de dissociation de l'eau dans les tissus et par conséquent modifie par une sorte de soustraction d'eau la nature chimique des éléments anatomiques. « Si l'on met en vases clos des plantes grasses, des échévérias, par exemple, en contact avec des vapeurs d'éther, elles laissent, au bout d'un certain temps, transsuder au travers de l'épiderme de grosses gouttes d'eau..... »

Ce qui rend cette hypothèse assez vraisemblable, dit Charles Richet⁽⁴⁾, c'est l'analogie de la déshydratation expérimentale, au point de vue des effets produits, avec l'anesthésie. En plaçant des graines, ou

(¹) Cl. BERNARD, *Leçons sur les anesthésiques*. Paris, Baillière, 1875.

(²) BINZ, Zur Wirkungsweite schlafmachender Stoffe (*Arch. f. exp. Pathol.*, 1876).

(³) Raphaël DUBOIS, Mécanisme de l'action des anesthésiques (*Rev. génér. des Sciences pures et appliquées*, 1891). — Id. *Anesthésie physiologique et ses applications*. Paris, 1894. — Id. *Leçons de physiologie générale et comparée*. Paris, 1898.

(⁴) Ch. RICHT, Article *Anesthésie* du *Dict. de physiologie*.

des microbes, ou des rotifères dans de l'air sec, on les dessèche et on paralyse leur activité, mais l'activité revient quand on leur rend l'eau qu'on avait enlevée.

Cette action déshydratante des anesthésiques généraux (chloroforme, éther, etc.), sur le protoplasma vivant est réelle et doit être admise sans conteste. C'est ainsi même qu'on a pu mettre en évidence des ferments endocellulaires dans les liquides transsudés des cellules sous l'influence du chloroforme⁽¹⁾. La question mise en doute est celle de savoir si la dissociation de l'eau et des tissus se produit au cours de l'anesthésie ou lorsque la destruction cellulaire est déjà un fait accompli.

C'est à ce point de vue que la théorie de Raphaël Dubois pour l'explication de l'anesthésie a été violemment combattue il y a encore peu de temps par Overton⁽²⁾. D'après cet auteur, l'excrétion considérable d'eau observée par Dubois n'a rien à faire avec la narcose; elle est le résultat d'une lésion, d'une destruction du protoplasme. Des expériences faites par Overton lui-même sur le muscle, il semble bien résulter que, quand un muscle est anesthésié et non tué, la quantité d'eau qui en sort est extrêmement petite et beaucoup moindre que celle qu'on peut obtenir en changeant, par l'injection de substances cristalloïdes, par exemple, ses conditions osmotiques. La perte d'eau n'est donc pas, pour Overton, le fait essentiel, déterminant, de l'anesthésie. La théorie de Dubois doit être rejetée.

Dastre a écrit de son côté : « La seule chose que nous sachions, c'est que le chloroforme, l'éther et l'anesthésique, d'une façon générale, agissent sur la matière protoplasmique, dans laquelle sont taillées, sous des figures diverses, toutes les parties organiques : par là nous comprenons l'universalité d'une action qui ne s'arrête pas à la limite des règnes et qui ne respecte pas les barrières fragiles que nos prédécesseurs avaient dressées entre la vie animale et la vie végétative. L'anesthésique agit sur cette substance commune en la désorganisant mécaniquement, physiquement ou chimiquement, et suspend ainsi temporairement ou définitivement les différents modes d'activité. Et maintenant arrêtons-nous : il n'y a plus d'explication au delà...⁽³⁾ »

(1) A. DASTRE, *Dialyse chloroformique* (*Soc. biol.*, 1900).

(2) OVERTON, *Studien über die Narkose*, 1901.

(3) A. DASTRE, *Les anesthésiques*, p. 32.

Sans doute, l'absolu est impossible à atteindre. Mais y a-t-il lieu pour cela de cesser de produire des observations nouvelles?

Si la théorie de Dubois n'explique pas le mécanisme de l'anesthésie, elle peut indiquer le sens des phénomènes qui tendent à se produire. Pour notre part, nous avons eu la curiosité de voir les phénomènes qui se passent à l'intérieur des cellules sous l'influence immédiate des anesthésiques, jugeant qu'il n'était pas sans intérêt de savoir comment se comporte le protoplasma, même frappé de mort. Quelque incomplètes qu'elles soient, nous donnons ici le résultat de nos observations, avec l'espoir qu'elles solliciteront des recherches nouvelles. Peut-être sera-t-il possible, en répétant les essais, de graduer l'action des agents anesthésiques à des états cellulaires ressortissant à des modifications physiologiques moins intenses que celles obtenues jusqu'ici, et correspondant alors à la perte unique de la sensibilité, à l'anesthésie simple, impliquant le retour intégral à l'état normal.

Il importe, pour de telles expériences, que les sujets d'études soient relativement faciles. Nous avons choisi les cellules des poils staminateurs de *Tradescantia*. L'observation en est directe et peut ne comporter aucune manipulation de nature à fausser d'avance les résultats.

Les poils de *Tradescantia* sont constitués par une série de cellules allongées dont les dimensions diminuent à mesure qu'on s'approche de l'extrémité du poil. Dans les cellules terminales, le protoplasma remplit généralement toute la cavité du phytocyste. Dans les cellules médianes et basilaires, il se laisse creuser par des lacunes plus ou moins grandes que remplit le suc cellulaire. Parfois il n'existe qu'une lacune centrale; le protoplasma tapisse alors la paroi cellulaire en formant l'utricule azotée de Hugo Mohl. Quelle que soit sa disposition, le cytoplasme n'abandonne jamais la paroi cellulosique pour se condenser au centre de la cellule.

La *figure 1* représente des cellules de poils de *Tradescantia virginica* après fixation. On voit que le protoplasma non rétracté s'étale dans toute l'étendue de la loge cellulaire.

Tous les fixateurs ne conviennent pas pour obtenir cet aspect. Les poils imbibés d'une matière grasse ne se prêtent pas à l'action des liquides osmiques, qui les colorent en noir, ni des solutions aqueuses, qui ne les pénètrent que difficilement. L'alcool absolu, l'alcool à 90°, l'alcool additionné d'acide acétique tuent le protoplasma sans le rétracter. L'alcool acétique (510 p. 100) paraît particulièrement con-

venir pour donner l'aspect de ce qui existe à l'état normal. De plus, sous son action, la matière colorante violette des poils se colore en rose et vient se fixer sur le noyau, auquel il donne une belle teinte rouge. Cette matière colorante est un véritable indicateur, rougissant avec les acides et verdissant avec les alcalis.

Les poils de *Tradescantia virginica* var. *albiflora* ne présentent pas cette matière colorante et peuvent être avantageusement utilisées pour l'examen direct sans l'emploi de réactifs.

Voyons maintenant ce qui se passe sous l'influence des anesthésiques généraux.

Quant ont fait agir sous le microscope des vapeurs d'éther sur les poils staminaux fraîchement détachés de la fleur épanouie, on voit se produire instantanément le spectacle suivant : le protoplasme, qui semble fixé à l'extrémité postérieure de la cellule, se détache brusquement, abandonne la paroi cellulaire et se contracte sous forme d'un boyau plus ou moins allongé, n'occupant plus qu'une partie de la loge cellulosique. Le phénomène est un peu voilé par la matière colorante violette, qui obscurcit les cellules dans le *Tradescantia virginica*. Appliqué directement, l'éther dissout la matière colorante, éclaircit les cellules et rend alors le phénomène d'une netteté remarquable.

La *figure 2* représente deux cellules contiguës influencées par les vapeurs d'éther. Le protoplasma est rétracté au centre de la loge cellulosique sous forme d'un boyau irrégulièrement contourné dans lequel le noyau apparaît condensé en un corps sphérique très régulier. Dans cette figure, la transsudation liquide du protoplasme est peu évidente.

Il n'en est pas de même dans la *figure 3*. Celle-ci représente une cellule influencée encore par les vapeurs d'éther. La photographie a été prise au moment où le protoplasme est déjà rétracté au centre de la loge cellulosique. Le noyau apparaît dans cette masse irrégulière comme une sphère à contours réguliers. De petites taches blanches indiquent les gouttelettes transsudées à la surface du protoplasme. Celles-ci sont très nombreuses et de dimensions inégales.

En réalité, sous l'influence de l'agent anesthésique, deux phénomènes se produisent presque simultanément dans les cellules staminales des *Tradescantia* :

1° Un phénomène de contractilité du protoplasme relativement rapide;

2° Un phénomène de transsudation sous forme de gouttelettes

du suc cellulaire au moment de la contraction brusque du protoplasma.

Il se peut qu'au début de l'anesthésie il y ait aussi un mouvement de contraction de la cellule plus ou moins important, mouvement de défense en quelque sorte, et même expulsion à ce moment d'une certaine quantité d'eau du protoplasme. Nous n'avons pas été



FIG. 1.



FIG. 2.



FIG. 3.

assez heureux jusqu'à ce jour pour obtenir des mouvements protoplasmiques assez limités ni une déshydratation suffisamment faible pour observer le retour du contenu des cellules anesthésiées à l'état vraiment normal. Nous n'avons donc pas observé, au sens rigoureux des mots, le mécanisme de l'anesthésie, mais la mort cellulaire sous l'influence des agents anesthésiques.

L'apparition de ces phénomènes dans la période anesthésique elle-

même : modification de l'état du protoplasma et déshydratation, n'en paraît pas moins pouvoir être observée à un degré compatible avec le retour de la cellule à la vie normale.

C'est ainsi que Fauré-Frémiet a pu anesthésier lentement, sans le tuer, un infusoire cilié : le *glaucoma pyriformis* ⁽¹⁾. Or, cette anesthésie, dit-il, est caractérisée au point de vue physique par une cessation des mouvements et par une réfringence spéciale du protoplasma, ce qui semble bien indiquer une *déshydratation*. Une déshydratation trop vive, trop rapide ou trop prolongée détermine la mort du protoplasme. C'est ce qui est arrivé dans nos expériences. Une déshydratation lente et légère eût été sans doute compatible avec une vie atténuée, vie lente ou anesthésie.

De tels phénomènes relatifs aux modifications protoplasmiques et à la déshydratation sous l'influence des anesthésiques avec, en plus, condensation des éléments solides du noyau, ont été déjà entrevus, quoique moins nettement, dans les cellules nerveuses géantes des gastéropodes ⁽²⁾.

Ils doivent se produire aussi dans les cellules nerveuses humaines lorsque l'anesthésie est mortelle, peut-être même lorsque, sans être mortelle, l'anesthésie se complique d'accidents temporaires plus ou moins graves.

Suivant des circonstances encore indéterminées, la cellule nerveuse se montre plus ou moins sensible à l'égard de l'agent anesthésique. Des réactions de défense caractérisées chez les animaux supérieurs par des vomissements, par exemple, se produiront dans un cas et point dans l'autre.

Il semble, toutefois, que le degré d'hydratation préalable de la cellule nerveuse ne soit pas sans influence sur la genèse de ces réactions, un degré d'hydratation plus élevé rendant le protoplasme moins vulnérable et mieux en état, par conséquent d'éviter l'action nocive d'une dose trop forte de l'agent anesthésique. Il n'est peut-être pas sans intérêt de citer à ce sujet l'observation curieuse de M. Denucé sur

⁽¹⁾ Emmanuel FAURÉ-FRÉMIET, Phénomènes protoplasmiques dus à l'anesthésie chez *Glaucoma pyriformis* (*C. R. de la Soc. de Biol.*, 16 mars 1906).

⁽²⁾ B. LE NABIAS, Noyau lobé des cellules nerveuses chez les gastéropodes pulmonés aquatiques. Action des anesthésiques généraux (chloroforme). Communication faite au XIII^e Congrès international de Médecine (section d'histologie et d'embryologie). Paris, 2-9 août 1900.

l'absorption d'une certaine quantité d'eau avant la chloroformisation pour éviter les vomissements post-opératoires (1) :

« Une heure et demie avant l'heure de l'opération, on fait boire au sujet un grand verre d'eau fraîche. Cette dose est répétée de demi-heure en demi-heure jusqu'au moment même où va commencer la chloroformisation. C'est donc en tout quatre grands verres d'eau que le sujet absorbe avant son opération, soit 800 grammes environ, et il boit le dernier verre juste avant de s'endormir.

» Les résultats ont dépassé toutes mes espérances, dit M. Denucé ; pas un des malades chez lesquels ce procédé a été mis en œuvre n'a eu le moindre vomissement post-opératoire, pas même la moindre nausée après son réveil. Et même pendant l'anesthésie, durant tout le temps de l'opération, pas une seule fois je n'ai eu à observer de vomissements. Jamais l'eau que le malade avait absorbée n'a été rejetée. »

M. Denucé a fait ainsi une vingtaine d'opérations, dont quelques-unes très longues, dans les conditions les plus favorables. C'est là vraisemblablement une série des plus heureuses. Il est à prévoir que beaucoup de malades vomiront encore, malgré l'absorption d'eau. Ce fait clinique n'en paraît pas moins comporter une certaine part de vérité et méritait, à notre avis, d'être rapproché des données scientifiques qui attribuent la mort par les anesthésiques à un phénomène de déshydratation.

Séance du 8 novembre 1906.

PRÉSIDENCE DE M. LOISEAU.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

MES CHERS COLLÈGUES,

Je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait en me désignant comme président de la Société des Sciences physiques de notre ville.

Je le dois, sans doute, surtout à votre bienveillance, car je n'ai d'autres titres à cette distinction qu'un amour profond pour la

(1) M. DENUCÉ, Absorption d'une certaine quantité d'eau avant la chloroformisation pour éviter les vomissements post-opératoires. Communication faite à la Société de Médecine et de Chirurgie de Bordeaux, 9 décembre 1904.

Science, puisé autrefois dans la forte éducation intellectuelle donnée par l'Ecole polytechnique, et mon admiration pour ses méthodes, ses progrès et le rôle magnifique qu'elle remplit dans l'organisme social.

Je reconnais que ma tâche m'apparaît aussi facile qu'agréable, grâce à l'esprit d'aimable confraternité et de courtoisie qui règne dans nos réunions, et assuré que je suis du concours précieux de notre secrétaire général, M. Vèzes, et de notre secrétaire adjoint, M. Richard, à qui j'adresse les remerciements de la Société pour le dévouement inlassable qu'ils mettent à son service. En leur demandant une fois de plus de se partager encore le fardeau de ces fonctions, vous avez marqué la haute estime en laquelle vous tenez leur talent et leur compétence.

C'est un devoir du même genre — c'est-à-dire de ceux qu'on est heureux de remplir — dont je m'acquitte en exprimant à mon éminent prédécesseur combien nous avons été heureux de le voir à la tête de notre Société pendant l'année qui vient de s'écouler. Nul de nous n'a oublié avec quelle maîtrise, devant l'assistance éclairée accourue pour l'entendre à l'occasion de notre Cinquantenaire, il a retracé le rôle de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux et la part prise par elle au mouvement scientifique de la seconde moitié du siècle dernier, dans une allocution où le charme et la perfection de la forme s'alliaient si heureusement à la finesse de l'analyse, à l'ingéniosité des rapprochements et à la profondeur des vues.

S'il est un modèle sur qui l'on doive prétendre se régler, c'est assurément M. de Nabias. J'y ferai, quant à moi, mes efforts tout au moins, persuadé, mes chers collègues, d'être aidé de votre concours pour maintenir la Société à la place où vous l'avez portée et, si faire se peut, élargir encore celle-ci et augmenter son action et sa part d'influence dans la vie intellectuelle de la région par des moyens pratiques dont l'étude vous sera proposée.

Séance du 22 novembre 1906.

PRÉSIDENCE DE M. LOISEAU

Sur la proposition de divers membres, le Bureau est invité à s'occuper de la préparation de la Séance publique annuelle de la Société.

Séance du 6 décembre 1906.

PRÉSIDENCE DE M. LOISEAU

Le fluor dans les eaux minérales;

Par M. le D^r P. CARLES.

Lorsque, dans l'*Annuaire des eaux minérales de 1894*, on examine les résultats les plus récents des analyses des eaux minérales françaises, on constate que le fluor figure uniquement comme élément constituant de ces eaux dans les sources de Bourbonne, de Plombières, Orezza, Contrexéville. Encore n'y est-il mentionné qu'à l'état de *traces* et souvent sur la même ligne que l'arsenic ou autres.

A la page 123, il est écrit cependant : « M. de Gouvenain signale dans la source Grande-Grille de Vichy 0,0076 de fluor. Mais cette indication a été contrôlée et ne paraît nullement fondée. »

A la page 112, on trouve en plus : « M. de Gouvenain a signalé dans l'eau de Bourbon-l'Archambault une teneur notable de fluorure de calcium (0^{re}0027). Mais la vérification du fait a fourni un résultat négatif. »

Enfin, à la page 115, on lit : « D'après M. de Gouvenain, l'eau de Nérès renfermerait 0,00614 de fluor. Cette indication donne lieu à la même observation que pour Vichy et Bourbon-l'Archambault. »

Or, il est écrit à la page 76 : « La recherche du fluor sur le résidu de l'évaporation est incertaine, à raison de la présence d'une quantité de silice souvent notable. Le fluor a été recherché non dans le résidu brut, mais dans le précipité ammoniacal produit dans la solution chlorhydrique de ce résidu, après élimination de la silice. »

Ces lignes sont à retenir. Elles expliquent probablement la différence des conclusions prises par les deux chimistes précédents. Elles disent également pourquoi l'auteur dont le nom suit a été en désaccord aussi avec lui-même; et pourquoi encore nos nombreux résultats ont été si différents dans leur généralité de ceux de nos prédécesseurs.

Il y a, en effet, deux manières d'éliminer la silice, une par voie acide, l'autre par voie alcaline :

La première, la plus suivie, consiste à arroser le résidu de l'eau avec de l'acide chlorhydrique en léger excès et ensuite à dessécher à 100°. On est même le plus souvent obligé de renouveler l'opération plusieurs fois. Eh bien, quand on mélange 0,25 de spath fluor naturel finement pulvérisé avec 2 grammes d'acide chlorhydrique, il se dégage, à basse température, assez de gaz fluorhydrique pour faire une série de magnifiques gravures sur verre. Quand on sépare la silice par ce moyen, l'opération se faisant forcément à chaud, on a donc de grandes chances de volatiliser la totalité du fluor en présence en cours d'opération (1).

Dans la seconde voie, alcaline cette fois, l'eau minérale, additionnée de 2.50 de bicarbonate de soude par litre, est évaporée aux 8/10^{es} environ par ébullition. On filtre, et dans le filtrat on ajoute du carbonate d'ammoniaque en faisant encore bouillir jusqu'à réduction à 100 centicubes. On filtre de nouveau pour retenir les derniers vestiges de silice et, dans le liquide recueilli, on précipite le fluor avec les détails recommandés plus bas.

Nous nous sommes tardivement aperçu que ce second mode de séparation s'impose quand les eaux sont très riches en silice. Dans le cas contraire, notre procédé général est plus simple, plus rapide et aussi exact.

Dans son *Traité d'hydrologie de 1873*, page 765, Jules Lefort, après avoir annoncé en 1859 l'absence de fluor dans les eaux de Nérès, indique que s'il a pu l'y découvrir en 1873, c'est grâce à de nom-

(1) Chaque fois que l'on ajoute, même à froid, un acide sur un carbonate sec contenant des fluorures quelconques, il nous a paru qu'il y avait volatilisation partielle de l'acide fluorhydrique.

Quand on fait réagir l'acide chlorhydrique sur le fluorure de potassium le métal se partage inégalement; entre les deux acides, il se fait un état d'équilibre (Dammer, t. I, p. 589)

L'acide chlorhydrique en réagissant sur les fluorures et fluosilicates produit des équilibres, et l'action n'est pas totale.

L'acide fluorhydrique peut être libéré des fluorures par l'action de l'acide oxalique ou encore des acides tartrique et citrique (*Traité de Chimie minérale* de Moissan, t. I, p. 80 et 84).

Si les silicates fluorifères sont décomposables par les acides et si l'on sépare la silice par évaporation, tout le fluor peut se volatiliser. Voir Frésenius, *Chimie quantitative: Séparation du fluor et de la silice*, p. 556.

breuses précautions. Néanmoins, il n'en a décelé que des traces. Dans le nombre de ces précautions, Lefort fait figurer aussi l'obligation de priver le résidu salin de sa silice. Voilà pourquoi il attribue légitimement son insuccès premier à ce qu'une partie de cette silice avait été conservée par mégarde dans le résidu.

En 1901, nous avons été plus heureux que Lefort sur ces mêmes eaux de Nérès. Pour y découvrir le fluor il nous a suffi, à cette époque, de concentrer par évaporation quelques litres d'eau, de rejeter les insolubles et d'ajouter aux parties solubles naturellement *alcalines* de l'acétate de chaux, avec un léger excès d'acide acétique. Le précipité, chauffé avec de l'acide sulfurique, nous a permis de graver un certain nombre de plaques de verre. (*Journ. pharm. et chim.*, 1901, p. 562.)

Fort de ce précédent, nous avons projeté de mettre le fluor en relief dans un grand nombre d'eaux minérales. Celles du Plateau central nous ont tenté les premières, parce que le fluorure de calcium est plus commun en ces contrées qu'ailleurs, grâce au voisinage des terrains volcaniques et aux origines que lui assigne la nouvelle théorie du professeur A. Gautier. On verra bientôt que nos recherches embrassent aujourd'hui la majeure partie des sources importantes du territoire français.

D'une façon générale, voici comment nous procédons maintenant :

On verse un litre de l'eau minérale dans une capsule de porcelaine, en ayant soin de retenir le sable très fin qui existe dans beaucoup de bouteilles, et on porte à l'ébullition en présence d'un fragment de papier rouge de tournesol. Le papier bleuit toujours. On éteint le feu et on ajoute dans l'eau 5 centicubes de solution d'acétate de potasse à parties égales, puis 5, 10, 15 centicubes de solution saturée à froid de chlorure de baryum, de façon à en avoir un excès. Alors on verse de l'acide chlorydrique goutte à goutte, de façon à redonner au papier une couleur rouge persistante. On brasse un moment pour faire dégager le gaz carbonique; enfin, on laisse refroidir en repos pendant deux heures au moins.

A ce terme, on s'assure de l'excès de baryte et on passe sur un filtre à analyses sans plis en présence de pulpe de papier Berzélius⁽¹⁾. Le résidu recueilli, lavé et essoré, est calciné, et les cendres, portées dans un creuset de platine, y sont délayées avec de l'acide sulfurique pur.

(¹) Les deux papiers exempts de fluor.

Enfin, on recouvre avec une plaque de verre enduite de cire, sur laquelle on a écrit avec un poinçon d'os. Le verre est refroidi par un cylindre rempli d'eau; mais on se trouve mieux, selon le conseil de M. Blarez, de former sa base de baudruche, et d'établir dans son sein un courant d'eau froide.

La durée de chauffage, de une heure et demie en moyenne, doit être prolongée quand les sulfates sont très abondants. Nous en avons trouvé qui gravaient encore après cinq heures. La présence du fluor est révélée par une vraie gravure sur le verre mis à nu (2). Le creux formé a une profondeur proportionnelle à la dose de fluor dégagé. Quand cet agent de corrosion est plus abondant, il se fait un dépôt blanc dans la gravure. La chaleur dégagée sous le creuset doit être tout le temps suffisante pour volatiliser *légèrement* l'acide sulfurique.

Tous les agents chimiques mis en usage réclament au préalable un essai à blanc. Si nous mettons un mélange d'acétate de potasse et de chlorure de baryum, c'est parce que l'acétate de baryte — comme tous les sels de baryte à acides organiques — recommandé par M. Blarez pour remplacer avec raison l'acétate de chaux, est *fort rarement* exempt de fluor, même quand il est très bien cristallisé et réputé pur.

Pour les eaux bicarbonatées, il est utile aussi qu'avant de séparer le dépôt fluoruré, l'acide carbonique se soit dégagé. Il faut encore que l'acidité du milieu soit *très faible*, sans quoi on peut perdre beaucoup de fluor. En voici une preuve, qui a d'ailleurs aussi un intérêt au point de vue de la formation et de la décomposition des eaux minérales.

Broyons dans un mortier d'agate quelques grammes de spath fluor; faisons-les bouillir dans de l'eau chlorydrique et filtrons. Si dans ce liquide limpide on verse de l'ammoniaque en excès, il se sépare un abondant précipité. Lavons-le, délayons-le dans 700 grammes d'eau et, dans une carafe à sparklets, saturons ce mélange d'acide carbonique avec deux olives. Après une heure, recevons cette eau mousseuse dans un vase à précipités où se trouve déjà de la pulpe de papier Berzélius; filtrons sévèrement et enfin chauffons doucement et *très lentement* au

(2) Lorsque, même avec l'œil armé de la loupe, on doute de la présence de la gravure, il n'y a qu'à faire arriver obliquement un rayon de soleil sur la plaque et à recevoir l'image au-dessous sur un papier blanc. Le moindre creux du verre laisse alors sur ce papier une ombre noire bien lisible.

bain-marie. Dans les douze à vingt heures, il se séparera des cristaux cubiques, inattaquables sous le microscope par l'acide acétique. Ces cristaux, au contact de l'acide sulfurique, donnent des vapeurs qui gravent merveilleusement le verre.

C'est en appliquant ces principes et en observant ces précautions que nous avons opéré sur les eaux dont les noms suivent. On a toujours agi sur un litre. Les dosages ont été faits par comparaison avec une gamme de plaques gravées de même à l'avance, au moyen de doses connues de fluorure de sodium.

En formant notre liste ci-dessous, nous avons suivi l'ordre adopté dans l'*Annuaire des Eaux minérales de 1894*.

PLATEAU CENTRAL

Fluor traduit en Fluorure de sodium

	gr.
Morvan. Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), par litre.	0,005 (Lymbe).
Beaujolais. Saint-Galmier (Loiret) Badoit, —	0,007 Badoit.
— Saint-Alban (Loire) —	0,005
Bourbonnais. Bourbon-l'Archambault (Allier), —	0,005
— Nérès (Allier), —	0,007 (César).
— Evaux (Creuse), —	0,009
Nivernais. Pougues (Nièvre), —	0,005 St-Léger.
Groupe de VICHY A. Grande-Grille (Allier), —	0,018
— — B. Puits-Chomel, — —	0,010
— — C. Lucas, — —	0,015
— — D. Hauterive, — —	0,018
— — E. Célestins, — —	0,015
— — F. Dames, — —	0,005
— — G. Parc, — —	0,018
— — H. Lardy, — —	0,018
— — I. Hôpital, — —	0,018
— — J. Cusset-Andréau, — —	0,014
— — K. St-Yorre, — —	0,017
Les Puys. Chateldon (Puy-de-Dôme), —	0,009
— Chatelguyon, — —	0,009 Gubler.
— Royat St-Marc, — —	0,005 St-Marc.
— — César, — —	0,002 César.
— Châteauneuf, — —	0,005
— Mont-Dore-Madeleine, — —	0,005 Madeleine.
— Mont-Dore-Bardon, — —	0,003 Bardon.
— Labourboule-Choussy, — —	0,005 Choussy.
— St-Nectaire-le-Haut, — —	0,015
Cantal. Vic-sur-Cère (Cantal), —	0,005
— Teissières-les-Bouliès (Cantal), —	0,005
Groupe de VALS A. St-Jean (Ardèche), —	0,002 St-Jean.
Vivaraïs — B. Madeleine (Ardèche), —	0,002 Madeleine.
— — C. Favorite, — —	0,005 Favorite.
— — D. Impératrice, — —	0,003
— — E. Rigolette, — —	0,002
— — F. Vivaraïses n° 1, —	0,006

Fluor traduit en Fluorure de sodium.

PLATEAU CENTRAL (suite)

		par litre.	gr.
Vivaraïs de VALS	G. Vivaraïses n° 3,	—	0,004
—	Condillac (Drôme),	—	0,005
Rouergue.	Cransac (Aveyron),	—	0,005
Montagne noire	A. Lamalou (Hérault),	—	0,005 Usclande.
—	B. — — —	—	0,002 Bourges.
—	C. — — —	—	0,006 Marie.
—	Balaruc,	—	0,007
Vosges.	Plombières Savonneuses,	—	0,008
—	Dames,	—	0,012
—	Crucifix,	—	0,012
—	Contrexéville,	—	0,009 Pavillon.
—	A. Luxeuil (Hte-Marné) Grand bain,	—	0,006
—	B. — — — Ferrugineuse,	—	0,001
—	C. — — — Dames,	—	0,007
—	D. — — — Hygie,	—	0,001
—	Bourbonne-les-Bains (Hte-Marne),	—	0,009
—	Bussang (Vosges),	—	0,005
Jura.	Allevard (Isère),	—	0,005
—	Uriage (Isère),	—	Néant.
Alpes	A. Aix-les-Bains (Savoie) Deux-Reines,	—	Néant.
—	B. — — — source Soufre,	—	0,004
—	Challes (Savoie),	—	0,014
Pyrénées	A. Cauterets (Htes-Pyr.) la Raillère,	—	0,002
—	B. — — — César,	—	0,002
—	Barèges — — — Bordeu,	—	0,004
—	A. Bagn.-de-Luchon — — — Pré,	—	0,014
—	B. — — — Bayon,	—	0,013
—	C. — — — la Grotte,	—	0,012
—	D. — — — Bordeu,	—	0,012
—	Ax-les-Thermes (Ariège), A. Pilhes,	—	0,005
—	— — — B. Bainfort,	—	0,010
—	— — — C. Bleue,	—	0,004
—	— — — D. Viguerie,	—	0,010
—	— — — E. Alcaline,	—	0,005
—	— — — F. Abeilles,	—	0,004
—	Bagnères-de-Bigorre (Htes-Pyr.) Labassère,	—	0,013
—	— — — la Peyrie,	—	0,010
—	— — — Salut,	—	Néant.
—	— — — Salies,	—	0,005
—	Le Boulou (Pyr.-Or.) Boulou,	—	0,005
—	— — — Clémentine,	—	0,005
—	Aulus (Ariège) A. Darmagnac,	—	0,005
—	— — — B. Ferrugineuse,	—	0,005
—	— — — C. Trois Césars,	—	0,002
—	— — — D. Bacqué,	—	0,003
—	Bonnes (Basses-Pyr.) source Vieille,	—	0,012
Corbières.	Alet (Aude) Communale,	—	0,003
Béarn.	Salies-de-Béarn. Eau mères des salines,	—	0,003
—	Dax (Landes),	—	0,009 Source chaude.
Corse.	Orezza,	—	0,003
Bocage normand.	Bagnoles de l'Orne,	—	Néant grande Source.
—	— — — — —	—	Néant Source Fée.

Fluor traduit en Fluorure de sodium

	gr.
<i>La plaine.</i> Vittel (Vosges) grande Source, par litre.	0,001
— — — Source salée,	0,009
Savoie. Evian (Hte-Saône) Cachat,	0,010
Quercy. Miers (Lot),	0,009
Océan. Eau de mer Arcachon,	0,012
— Hunyadi Janos,	0,005

CONCLUSIONS

Voilà donc quatre-vingt-treize échantillons d'eaux minérales naturelles, parmi lesquelles figure l'eau de mer, qui ont été soumises à la recherche du fluor. Comme cet essai représente, même pour les plus entraînés, une certaine contingence, la plupart des échantillons a été analysés plusieurs fois.

On vient de voir que la présence du fluor est à peu près générale, puisque cinq sources seulement ont donné des résultats négatifs. Dans les autres, la gravure est partout manifeste. En agissant par comparaison avec la gamme des plaques, on trouve que la moyenne de fluor, traduit en fluorure de sodium, est de 7 milligrammes par litre. Mais cette moyenne descendrait à 0,005 si on ne faisait pas intervenir dans le nombre les eaux bicarbonatées et certaines eaux sulfureuses.

Quoique dans notre mode opératoire la silice soit peu retenue, il n'en est pas moins vrai qu'elle doit encore réduire les doses annoncées. Ceci arrive surtout quand elle atteint 0,175 par litre comme à Mont-Dore (1); ou 0,130 à Saint-Nectaire; 0,120 à Chatelguyon; 0,093 à Luchon; 0,090 à Royat; 0,060 à Vichy.

Malgré cela, le degré d'alcalinité de l'eau paraît en rapport étroit avec celui de fluor dégagé. Le groupe de Vichy en offre un exemple frappant, puisque sur les onze sources mises à l'épreuve la moyenne est de 0,015, c'est-à-dire triple de la moyenne générale.

Il y a encore à noter les différences que présentent dans les sulfureuses, Challes avec ses 0,014, contre Luchon avec 0,012; Ax avec sa moyenne de 0,006; Cauterets avec sa moyenne de 0,063, et Uriage avec néant.

Quant aux eaux de table bicarbonatées calcaires, le fluor y existe partout, mais avec 0,005 comme la moyenne générale.

(1) Où la source Madeleine a donné néant par notre méthode ordinaire, tandis qu'elle a révélé 0,004 à 0,005 après séparation de la silice, mais par voie alcaline.

Enfin, au moment où l'eau de mer entre franchement dans la thérapeutique interne, n'oublions pas que devant fatalement contenir en dissolution toutes les espèces chimiques du globe, elle arrive avec ses 0,012 de fluorures par litre. Peut-être y a-t-il lieu d'indiquer que notre eau avait été puisée depuis très peu de jours et avait été gardée en bouteilles bien closes, afin de lui conserver tout son acide carbonique naturel. L'exemple de Nérès, où nous avons montré jadis que la déminéralisation se faisait au fur et à mesure du départ de l'acide carbonique, mérite sur ce point d'être retenu. Mais on prendra plus encore en considération notre expérience de la carafe à sparklets. On y voit mieux, en effet, le rôle de l'acide carbonique dans la genèse des eaux minérales et le sort qui attend leurs éléments constitutants quand cet acide se dégage. Tout cela doit être retenu par ceux qui prescrivent, gardent et emploient les eaux minérales, médicaments naturels dont la composition se révèle tous les jours plus complexe.

Séance du 20 décembre 1906.

PRÉSIDENCE DE M. LOISEAU

Avant de donner la parole à M. Carles, M. le Président félicite M. Padé qui, récemment nommé doyen de la Faculté des Sciences, vient de se voir attribuer par l'Institut le Grand Prix des Sciences Mathématiques pour un important mémoire sur les Fractions continues.

M. le Président envoie aussi ses félicitations à M. Gruvel, auquel l'Institut a accordé le Prix Jérôme Ponty pour son travail sur les Cirrhipèdes.

A propos du fluor dans les eaux minérales;

Par M. P. CARLES.

Dans la dernière séance, nous avons annoncé que nous venions de découvrir le fluor en quantité variable dans la plupart des eaux minérales françaises. Ce résultat présente de l'intérêt, avons-nous dit, pour plusieurs raisons, et au seul point de vue chimique, parce que cette

présence a été niée par le chimiste hydrologue actuellement le plus en relief.

Pour expliquer ce désaccord, nous avons fait ressortir que nous précipitions le fluor dans l'eau minérale bouillante et non évaporée, mais simplement acidulée à l'acide chlorhydrique en présence de l'acétate de baryte; que, dans ces conditions, la silice restait en dissolution et passait à travers le filtre, tandis que tout le fluor était retenu et décomposé ultérieurement. Que, au contraire, M. Willm dissolvait le résidu de l'eau dans l'acide chlorhydrique, séparait la silice et précipitait ensuite le fluor de la dissolution chlorhydrique par l'ammoniaque. Or, dans ces conditions, la séparation de cette silice ne peut avoir lieu que de deux façons :

1° En faisant évaporer la dissolution chlorhydrique à 100° et reprenant par l'eau chlorhydrique;

2° En ajoutant dans cette dissolution du carbonate d'ammoniaque en excès.

Dans le premier cas, nous avons prétendu que l'HCl était capable de dégager et faire perdre l'acide fluorhydrique.

Nous ajouterons que, dans le second cas, en rendant la liqueur alcaline, le fluor dissous retrouverait assez de bases terreuses et métalliques pour se précipiter, et qu'alors il suivrait entièrement la silice et serait rejeté.

Pour qu'il n'en fût pas ainsi, il aurait fallu que le résidu de l'eau, toujours alcalin, fût calciné ou très longtemps mis à bouillir avec du carbonate de soude. Dans ces conditions, en effet, ce carbonate alcalin forme du fluorure de sodium et du silicate de sodium. En ajoutant dans ce milieu du carbonate d'ammoniaque, toute la silice se fût précipitée, le fluor aurait été respecté et, par filtration, on eût privé le fluor de la silice. Ce fluor devenait dès lors disponible et pouvait être caractérisé ou dosé sans inconvénient par les sels de baryte, de chaux ou tout autre mode connu, sans oublier la gravure sur verre, qui est le mode le plus net et peut-être aussi le plus sensible⁽¹⁾, du moins quand on y a la main.

A cela on nous a objecté que l'HCl ne déplace pas l'acide fluorhydrique. Bien que notre expérience de l'acide carbonique comprimé sur

(¹) On peut, par ce procédé, graver visiblement le verre à l'œil nu ou à la loupe, selon la vue de chacun, avec moins d'un milligramme par litre d'eau de fluorure alcalin.

le spath fluor permit de pressentir le contraire, et bien que Frésenius l'eût déjà indiqué⁽¹⁾, nous avons tenu à le déterminer directement.

A cet effet, nous avons mis dans un creuset 0,25 de spath fluor en poudre et 2 grammes d'acide chlorhydrique pur et nous avons constaté qu'à chaud les vapeurs qui se dégagent corrodent le verre. A froid, au contraire, l'attaque des vapeurs est plus lente, et nous avons pu merveilleusement graver une série de quatre plaques de verre. Nous estimons qu'à une plaque par jour nous aurions pu obtenir dix gravures, bien nettes.

Nous persistons donc à dire que si on n'a pas retrouvé le fluor avant nous dans les eaux minérales, c'est parce qu'il s'est perdu dans les diverses manipulations chimiques qu'on a fait subir au résidu de l'eau.

Séance du 10 janvier 1907.

PRÉSIDENCE DE M. CHADU

Le vote sur la candidature de M. Serres, professeur au Lycée, présenté par MM. Boulouch et Gossart, est mis à l'ordre du jour de la prochaine séance.

M. le Président informe la Société que M. Bertin, membre de l'Institut, directeur du Génie maritime, commissaire général de l'Exposition maritime internationale de Bordeaux, a bien voulu se charger de faire, à la séance publique annuelle de la Société, le 22 janvier prochain, une conférence ayant pour titre : « Les vagues de la mer. »

Sur un nouveau mode de préparation de siliciures de nickel;

Par M. EM. VIGOUROUX.

Un mode analogue à celui qui a été adopté pour la préparation de siliciures définis, soit de fer, soit de cobalt, nous a permis de former, de même, des siliciures de nickel. De plus, les réactions ont été suivies

⁽¹⁾ *Chimie quantitative. Séparation des fluorures et des silicates*, p. 556 : « Si les silicates fluorifères sont décomposables par les acides et si l'on sépare la silice par évaporation, tout le fluor peut se volatiliser. »

de plus près, les produits successivement obtenus ayant été soumis à l'analyse.

Première action. — On prend 50^{gr} de nickel en poudre, nickel chimiquement pur préparé spécialement à cet effet, et on le chauffe d'abord dans l'hydrogène sur une nacelle en porcelaine contenue dans un tube de même nature; puis, dès que le chlorure de silicium commence à bouillir, le courant gazeux est arrêté et remplacé par les vapeurs de ce liquide que l'on dirige sur le métal de plus en plus chauffé. Au bout de quatre heures environ, le tout est abandonné au refroidissement : on constate que le métal a subi une diminution de poids très peu sensible et que sa poudre est à peine agglomérée. Après une *seconde action*, la masse est frittée, mais non fondue, elle ne pèse plus que 45^{gr}. Un *troisième* passage du chlorure de silicium sur cette masse frittée, qu'on a pulvérisée grossièrement, provoque dans la nacelle la formation d'un lingot parfaitement fondu ne pesant plus que 35^{gr}.

Ce lingot, qui présente l'apparence du nickel fondu, est assez cassant, cristallin à l'intérieur; il est possible de le fragmenter à l'aide du mortier d'Abich, bien qu'il s'aplatisse sensiblement. Enfin, propriété importante, *il n'est pas magnétique*, comme l'est le nickel. Avant de continuer à le faire réagir sur le chlorure, nous le soumettons à l'analyse.

Nous en attaquons un fragment à l'aide de l'acide azotique chaud et nous activons l'action par l'addition de quelques gouttes d'acide chlorhydrique. La silice résiduelle, qui est grise, est rendue blanche par décantation du liquide et addition d'eau régale au résidu. Le nickel est dosé par électrolyse de sa solution sulfurique ammoniacale.

RÉSULTATS	TROUVÉ		CALCULÉ pour Ni ⁴ Si
	I	II	
Nickel p. 100	88,96	89,20	89,17
Silicium p. 100 . . .	9,66	9,48	10,83
	98,62	98,68	100,00

avec 0,67 p. 100 de fer. Ces chiffres, comme on le voit, sont voisins de ceux donnant la formule Ni⁴Si.

En opérant sur 50^{gr} d'un second échantillon de nickel totalement dépouillé de fer et traité de même, à trois reprises consécutives, par le chlorure de silicium, nous sommes tombé sur un nickelosilicium de même nature pesant 37^{gr}, dont la composition était encore plus voisine de Ni⁴Si. On peut donc admettre que, dans le cas du nickel, la formule



s'applique à cette réaction, attendu que le poids de siliciure qu'elle indique comme devant se former correspond à 37^{gr}.

Nous prenons 36^{gr} de ce lingot exempt de fer et, après pulvérisation, le traitons une *quatrième fois* par le chlorure de silicium, à la température la plus élevée susceptible d'être obtenue dans notre four; nous trouvons une masse non fondue, mais dont le poids n'est plus que de 35^{gr}. Après une *cinquième* action, le produit est fondu en un bloc unique pesant exactement 32^{gr}, très cassant, à cassure très brillante et montrant des arêtes vives, il se pile plus facilement que l'échantillon ci-dessus analysé.

Sa composition est déterminée par une analyse effectuée en l'attaquant par l'eau régale doublée d'eau.

RÉSULTATS	I	II
Nickel p. 100.	84,58	84,78
Silicium p. 100	<u>15,06</u>	<u>15,14</u>
	99,64	99,92

Ces chiffres donnent une formule comprise entre Ni³Si et Ni⁴Si.

Sixième action. — On prend 26^{gr} du lingot précédent, pulvérisé très finement, puis tamisé, et on le soumet encore à l'attaque du chlorure de silicium, sans trop élever la température au début: au bout de deux heures de chauffe environ et après refroidissement, on constate qu'il n'a pas fondu, mais qu'il a subi une altération profonde; son poids est descendu à 25^{gr}. En recommençant à chauffer au sein du chlorure de silicium, encore une heure durant, et cela à la température maxima du four, on tombe sur un alliage fondu, cassant mais se maintenant sensiblement à 25^{gr}.

Septième action. — Ces 25^{gr} d'alliage sont encore pulvérisés et tamisés. Après une chauffe très prolongée et très forte vers la fin, toujours au sein du chlorure de silicium, il se forme un lingot fondu, homogène, à cassure grenue, pesant toujours 25^{gr}. Nous admettons que nous avons atteint la limite de saturation correspondant à la température de nos expériences qui se font autour de 1200°.

Deux échantillons de ce nickelosilicium-limite sont prélevés et attaqués, au bain-marie, par de l'eau régale étendue à 50 p. 100. Après insolubilisation de la silice, le nickel est dosé par électrolyse à l'état de sulfate ammoniacal.

RÉSULTATS	TROUVÉ		CALCULÉ pour Ni ³ Si
	I	II	
Nickel p. 100	80,32	80,28	80,52
Silicium p. 100 . . .	19,25	19,37	19,48
	99,57	99,65	100,00

En résumé, l'étude de l'action du chlorure de silicium sur le nickel amène à constater deux limites de siliciuration : *première limite* (inférieure) correspondant à Ni⁴Si, corps inconnu jusqu'à ce jour, défini vraisemblablement, son *indifférence* à l'action de l'aimant montrant bien qu'il ne renferme pas de nickel libre ; *deuxième limite* fournissant le corps Ni³Si déjà étudié par l'auteur.

Il n'est pas impossible que des températures plus élevées soient capables de provoquer la formation de composés plus fortement siliciés, toutes choses égales d'ailleurs.

Sur un nouveau mode de préparation du siliciure de chrome Cr³Si⁴;

Par M. EM. VIGOUROUX.

Dans plusieurs communications antérieures publiées dans ce même recueil, nous avons montré que le chlorure de silicium agissant respectivement sur le fer, le nickel, le cobalt, donnait naissance aux composés respectifs suivants : Fe²Si ; Ni²Si ; Co³Si. Ce même chlorure

de silicium, mis en action sur le chrome, dans les mêmes conditions de température, a fourni le corps Cr^2Si^2 .

Le mode opératoire est le même que dans les expériences antérieures. Le métal pur que nous utilisons, est le résultat d'une réduction aluminothermique d'oxydes de chrome. Nous en prenons 60^{gr} que nous pulvérisons finement à l'aide du mortier d'Abich et que nous introduisons, avec la nacelle qui les contient, dans un tube en porcelaine chauffé et parcouru par un courant de vapeur de chlorure de silicium.

Première action. — L'attaque commence vers le rouge; elle augmente d'intensité avec la température du four et, au rouge vif, on voit s'échapper, de la nacelle, des fumées grisâtres de chlorure chromeux qui viennent se déposer, en grande partie, dans le col du récipient condenseur qui fait suite au tube en porcelaine. Au bout de trois heures de marche et après refroidissement, on trouve dans la nacelle une masse métallique, peu ou pas altérée dans sa couche inférieure, mais ayant subi une attaque bien marquée dans sa partie supérieure et empâtée de chlorure chromeux fondu. Son poids brut n'est plus que de 40^{gr}.

Deuxième action. — Ces 40^{gr} sont soumis tels quels à un second traitement, après avoir été retournés sens dessus dessous, de façon à présenter leur couche inférieure à l'action des vapeurs de chlorure de silicium. L'attaque reprend d'une façon énergique et, le four étant porté à sa température maxima, on constate encore un fort dégagement de fumées. Après cette seconde opération, on tombe sur une substance métallique brillante, d'aspect tout différent du métal chrome, s'écrasant assez facilement; elle se trouve encore imprégnée d'un peu de chlorure chromeux et ne pèse que 16^{gr} environ.

Troisième action. — Ce second alliage est placé dans une nacelle plus petite et soumis, une troisième fois, à l'action du chlorure de silicium, afin d'en réaliser la fusion si possible. Durée de l'opération : quatre heures environ. On ne voit plus de fumées se dégager, d'une façon appréciable, comme dans les deux opérations précédentes, bien que le four soit longtemps maintenu à sa température maxima, c'est-à-dire vers 1200°. Après refroidissement, on retire de la nacelle une

masse qui n'est pas fondue mais simplement agglomérée, s'effritant très facilement sous le pilon, par simple pression de la main, en donnant des grains cristallins, d'aspect grisâtre ne pesant plus que 15^{gr}. Le peu de chlorure chromeux qui les souillait était entraîné par l'eau.

Leur *analyse* est effectuée de la façon suivante : attaque par les carbonates alcalins en fusion, additionnés d'un peu d'azotate de potassium vers la fin de l'opération. Projection de la masse froide dans l'acide chlorhydrique étendu, insolubilisation de la silice ; puis, reprise à l'ébullition, par l'acide chlorhydrique étendu, en présence d'un peu d'alcool qui garantit la transformation intégrale du chromate en chlorure chromique et précipitation de ce dernier à l'état d'hydrate, à l'aide de l'ammoniaque ; ce mode d'analyse a assuré le résultat I.

Comme le sesquioxyde de chrome, provenant de la calcination de l'hydrate précipité, n'était pas absolument pur, après insolubilisation de la silice, le résidu d'une seconde et d'une troisième opération a été évaporé plusieurs fois, en présence de l'acide azotique, puis encore traité par ce dernier que l'on additionnait, de temps en temps, de lamelles de chlorate de potassium. La filtration effectuée, on obtenait une liqueur renfermant avec le chromate alcalin, le fer et l'aluminium. Après les avoir précipités par l'ammoniaque, on dosait le chrome à l'état de chromate mercurieux. Le résidu de silice et ceux d'oxyde de fer et d'alumine étaient vérifiés à l'aide de l'acide fluorhydrique. De cette façon, on amenait les résultats II et III.

RÉSULTATS	CALCULÉ pour Cr ³ Si ₂	I
—	—	—
Chrome p. 100.	73,62	75,97
Silicium p. 100	26,38	24,15
	<u>100,00</u>	<u>100,12</u>
	II	III
	—	—
Chrome p. 100.	73,38	74,07
Silicium	25,46	25,10
Fer p. 100	0,80	0,78
	<u>99,54</u>	<u>99,95</u>

M. Barbarin communique à la Société un mémoire anglais de M. George Bruce Halsted, ayant pour titre : « Contribution non euclidienne à la philosophie. » La Société charge M. Barbarin de la traduction de ce mémoire.

Séance du 24 janvier 1907.

PRÉSIDENCE DE M. LOISEAU

La Société décide de prier MM. Esclangon et Gayon de vouloir bien préparer une notice sur M. Rayet, ancien président de la Société, récemment décédé.

M. Serres, professeur au Lycée, présenté par MM. Boulouch et Gossart, est élu membre titulaire.

**Action de la lumière ultraviolette sur les faux
équilibres électriques ;**

Par M^{me} BAUDEUF.

Tout conducteur électrisé placé en présence de corps quelconques portés à des potentiels différents, peut être considéré comme un corps en état de faux équilibre électrique.

On sait que diverses causes peuvent produire la déperdition électrique, notamment le voisinage de corps radioactifs, l'existence d'ondes hertziennes, l'introduction de gaz conducteurs, etc.

La plupart des auteurs assimilent à ces causes l'action des rayons ultraviolets. Cette action est cependant très nettement différente, ainsi que l'on peut le constater en ayant soin d'écarter les autres agents de déperdition.

On reconnaît que les rayons ultraviolets interviennent seuls en interceptant ces rayons par une lame de verre : la décharge cesse aussitôt.

ARRÊT DE LA DÉCHARGE D'UNE PLAQUE MÉTALLIQUE ÉCLAIRÉE PAR LES RAYONS ULTRAVIOLETS. — Une plaque métallique, chargée négativement, et frappée par la lumière de l'arc électrique, se décharge graduellement. On peut arrêter brusquement la déperdition de l'électricité en introduisant près du conducteur qui se décharge un autre conducteur porté à un potentiel négatif suffisant, et placé de manière telle que les lignes de champ s'éloignent de la face éclairée. Cela montre que les rayons ultraviolets ne suffisent pas à décharger un conducteur dont la charge totale est négative. Il faut, de plus, qu'il existe, du côté de la face éclairée, un champ électrique de sens convenable et d'intensité suffisante.

INFLUENCE DU CHAMP ÉLECTRIQUE SUR LA DÉPERDITION NÉGATIVE. — Pour montrer l'influence du champ sur la déperdition négative d'une plaque éclairée, il suffit de relier cette plaque à la feuille d'or d'un électromètre à décharges. La borne de cet électromètre est reliée au pôle négatif d'une pile de 200 éléments dont le pôle positif est au sol.

La borne étant ainsi portée à un potentiel de — 200 volts attire la feuille d'or qui se charge par contact au même potentiel, ainsi que la plaque P avec laquelle elle est en communication.

Si les rayons ultraviolets frappent la plaque P, cette plaque éprouve une déperdition graduelle, qui est mise en évidence par ce fait que la feuille d'or s'écarte peu à peu de son support et vient enfin toucher la borne. A ce moment, la feuille et la plaque P se trouvent portées de nouveau au potentiel de 200 volts, et le phénomène recommence.

La feuille d'or éprouve des oscillations régulières, dont la fréquence peut être prise comme mesure de la vitesse de la déperdition de l'électricité négative.

On peut alors constater que, si la plaque P est éloignée de tout autre corps, les oscillations sont peu fréquentes (6 par minute environ, pour une certaine intensité d'éclairement).

Si, sans modifier rien autre chose, on porte près de la plaque P une autre plaque P' reliée au sol, la vitesse de décharge augmente considérablement (15 oscillations par minute au lieu de 6). Si la plaque P' est portée à un potentiel positif, la fréquence des oscillations augmente encore; mais si, au contraire, P' est portée à un potentiel négatif, la fréquence diminue; si enfin on lui donne un potentiel égal à celui de P, les oscillations cessent complètement.

Dans un champ nul, il n'y a donc pas de déperdition négative.

CHARGE NÉGATIVE D'UNE PLAQUE MÉTALLIQUE ÉCLAIRÉE PAR LES RAYONS ULTRAVIOLETS. — On peut obtenir la charge négative d'une plaque éclairée par les rayons ultraviolets.

Pour cela il suffit de porter la plaque P' à un potentiel négatif supérieure à celui de P en valeur absolue, par exemple à -300 ou -400 volts et de l'éclairer.

Pour constater qu'il y a charge négative de P , il suffit de relier au sol la borne de l'électromètre à décharges. A mesure que la charge de P se produit, la feuille d'or reliée à P s'écarte de son support jusqu'au moment où elle veut toucher la borne. Elle se décharge, ainsi que P , par ce contact et le phénomène recommence.

La fréquence des oscillations mesure ici la vitesse de charge négative de la plaque P . On peut constater que cette vitesse croît avec l'intensité du champ et avec l'intensité de la lumière.

Si l'on veut connaître la valeur que peut atteindre le potentiel de la plaque P , il vaut mieux relier cette plaque à un électromètre à quadrants. On constate ainsi que le potentiel de P augmente d'abord rapidement, puis de plus en plus lentement, jusqu'à une certaine valeur maximum, qui n'est plus dépassée ensuite, quelle que soit la durée de l'expérience.

Ce potentiel maximum V est toujours notablement inférieur en valeur absolue à celui de la plaque P' . Il y a alors entre P et P' un état d'équilibre qui se maintient tant que les conditions de l'expérience demeurent les mêmes. Si l'on ramène P à un potentiel inférieur à V , ce potentiel croît de nouveau jusqu'à la même valeur V ; si au contraire on porte P à un potentiel V' supérieur à V , ce potentiel V' est conservé s'il n'est pas de beaucoup supérieur à celui de P' .

Cela rappelle les phénomènes relatifs aux faux équilibres chimiques. Si les deux plaques P et P' sont toutes deux isolées et reliées à des électromètres, on peut constater qu'à la charge négative de P correspond une décharge corrélative de P' sans laquelle la charge de P ne peut avoir lieu.

CHARGE POSITIVE D'UNE PLAQUE ÉCLAIRÉE. — Si au lieu de charger P' négativement, on lui donne un potentiel positif suffisant, P prendra sous l'influence du champ créé par P' et des rayons ultraviolets une charge positive.

La vitesse de charge croît avec le champ et avec l'éclairement. Le potentiel maximum obtenu, toujours inférieur à celui de P' , croît aussi

avec le champ et l'éclairement. A une charge positive de P correspond une décharge corrélative de P' qui s'arrête lorsqu'on fait cesser la charge de P.

Pour une certaine distance entre les deux plaques, et pour une intensité donnée de la lumière, à un potentiel fixe de P' correspond une valeur du potentiel V de P telle qu'il y a équilibre électrique entre les deux plaques. Si le potentiel de P est inférieur à V, ce potentiel s'élève jusqu'à la valeur V, mais si l'on donne à P un potentiel supérieur à V, et s'il n'y a dans le voisinage aucun corps susceptible de prendre une charge positive, P conserve son potentiel et demeure en faux équilibre en présence de P'.

CONTINUITÉ ENTRE LES DEUX PHÉNOMÈNES DE DÉCHARGE NÉGATIVE ET DE CHARGE POSITIVE. — Considérons une pile de 400 éléments dont Z est le pôle négatif, C le pôle positif. Prenons entre les deux pôles deux points fixes M et N tels que si l'on représente par V_C , V_M , V_N , V_Z les potentiels respectifs des points C, M, N, Z, on ait :

$$V_C - V_M = 100 \text{ volts}$$

$$V_M - V_N = 200 \text{ volts}$$

$$V_N - V_Z = 100 \text{ volts.}$$

Relions le point N à la borne de l'électromètre à décharges, dont la feuille d'or communique avec la plaque réceptrice P qui est éclairée. Relions M à la plaque agissante P'.

Si nous relions au sol le point Z, P prend une charge positive sous l'influence de la lumière et du champ créé entre les deux plaques.

Il en est de même si l'on met au sol le point N, ou tout autre point de la pile compris entre Z et N. Si l'on met au sol un point de la pile pris entre N et M, le phénomène subi par P sera une décharge négative suivie d'une charge positive.

Enfin, si l'on met au sol un point compris entre M et C, les oscillations de la feuille d'or correspondront à une décharge négative de P.

Or, dans les diverses expériences que l'on peut faire en reliant successivement au sol les différents points de la pile de Z jusqu'à C, la fréquence des oscillations ne varie qu'insensiblement d'une expérience à la suivante.

Il y a donc continuité entre la charge positive et la décharge négative de P.

Cette continuité nous amène à supposer que les deux phénomènes sont produits par un même mécanisme.

Plusieurs auteurs attribuent la déperdition négative à une convection d'ions négatifs, partant de la surface métallique éclairée, et appuient cette opinion sur le fait que les corps environnants se chargent négativement.

Dans le cas de la charge positive, on pourrait de même penser qu'une émission d'ions négatifs, par la surface éclairée, laisse la plaque chargée positivement. Mais, dans ce cas, il est impossible de constater aucune charge négative sur les corps environnants. Une petite lame métallique, placée entre les deux plaques en expérience, ne prend aucune charge sensible, si elle n'est pas éclairée, tandis qu'elle se charge *positivement* et non négativement, si elle reçoit des rayons ultraviolets directs ou réfléchis.

Une émission d'ions négatifs est donc bien difficile à admettre ici.

Quoi qu'il en soit, les deux phénomènes de charge positive et de décharge négative sont régis par les mêmes lois, que l'on peut résumer ainsi :

1° *Les rayons ultraviolets doivent frapper celle des deux plaques dont le potentiel est le plus bas ; l'éclairement de l'autre plaque n'influe pas sur le phénomène.*

2° *L'existence d'un champ électrique est nécessaire à la production du phénomène, et les lignes de ce champ doivent converger vers la face éclairée de la plaque. La plaque agissante, dont le potentiel est le plus élevé, doit être placée en regard de la face éclairée de la plaque réceptrice.*

3° *L'effet produit par les rayons ultraviolets, est d'atténuer l'état de faux équilibre existant entre les deux plaques, c'est-à-dire de diminuer la différence de potentiel existant entre elles.*

4° *Un nouvel état d'équilibre se produit, dans lequel cette différence de potentiel est toujours notable, et d'autant plus grande que les deux plaques sont plus éloignées.*

5° *Si on élève le potentiel de la plaque éclairée au-dessus de la valeur qu'il atteint sous l'influence du champ et des rayons ultraviolets, les plaques demeurent en faux équilibre dans l'état qui leur est imposé. Si, au contraire, on abaisse le potentiel de la plaque éclairée, il y a variation ultérieure de ce potentiel jusqu'à ce que la valeur d'équilibre soit atteinte de nouveau.*

Sur la réduction des oxydes par l'aluminium : réduction des oxydes de chrome;

Par M. EM. VIGOUROUX.

A la suite des travaux de M. H. Moissan sur la réduction de l'anhydride borique par le magnésium, nous avons entrepris autrefois des recherches touchant la décomposition de la silice soit par le magnésium, soit par l'aluminium.

L'action des poudres de silice et de magnésium avait été successivement étudiée par Phipson, Parkinson, Gattermann qui constatait la production de très fortes explosions, puis par Winckler qui, même en ne chauffant que deux décigrammes de leur mélange, constatait que des gerbes de feu s'échappaient brusquement de ses tubes et les brisaient. Dès 1895 nous avons publié : 1° que ces explosions étaient dues à l'humidité qui imprégnait les poudres : en les desséchant, nous avons pu facilement engager, dans une même réaction, plusieurs centaines de grammes de mélanges; 2° qu'il était inutile de porter la totalité de ces mélanges dans des foyers fortement chauffés, que la simple approche d'une allumette enflammée, susceptible de faire brûler quelques grains de magnésium, suffisait pour amorcer la réaction qui se propageait ensuite spontanément dans toute la masse; 3° que la chaleur correspondante était capable de fondre l'élément mis en liberté. Actuellement, l'industrie fabrique aisément des métaux fondus en réduisant leurs oxydes respectifs par l'aluminium.

Pour l'exécution de certaines préparations de laboratoires, visant surtout la production de corps chimiquement purs, nous avons parfois éprouvé des difficultés dans la réalisation de fusions complètes, la déperdition de chaleur étant proportionnellement plus grande pour de petites masses mises en réaction, d'une part, et, d'autre part, l'apport d'éléments étrangers soit par les matières premières, soit par les parois des récipients, devant être nul, le métal n'est pas ici souillé de toutes ces impuretés qui contribuent à amener, pour les métaux industriels, un abaissement notable de leur point de fusion. C'est ainsi que si le chrome aluminothermique industriel offre le précieux

avantage de ne pas contenir de carbone, il présente, en revanche, deux grands inconvénients : celui de ne pouvoir être fabriqué qu'en grandes masses et de se présenter dans des conditions telles qu'il s'éloigne de l'état de pureté. Avec de nombreux expérimentateurs nous pouvons dire que de relativement fortes proportions d'impuretés ne sont pas rares, impuretés telles que silicium, aluminium, fer, scorie, etc., ce qui n'a rien d'étonnant si l'on considère que les masses de matières premières à mettre en œuvre sont en quantité tellement grande qu'il est bien difficile de la préparer dans un grand état de pureté.

Dans le cours de nos recherches, nous n'avons utilisé que des matières premières de très grande pureté, préparées par nous, comme dans le cas des oxydes de chrome dont nous parlons plus bas, et nous avons remarqué que, *toutes choses égales d'ailleurs, l'oxyde du métal à obtenir doit présenter un degré d'oxydation d'autant plus élevé que la quantité de chaleur nécessaire à la fusion est plus grande.*

En effet, le poids d'aluminium à brûler devant augmenter en raison de l'infusibilité du métal, c'est-à-dire de la quantité de chaleur à produire pour le fondre, le poids d'oxygène que doit apporter l'oxyde doit également augmenter en raison de ce même poids d'aluminium à brûler.

D'autre part, *un oxyde est d'autant plus facilement réductible par un même agent que son degré d'oxydation est plus élevé* (c'est-à-dire que Fe^3O^3 est plus facile à réduire que FeO , ce que les sidérurgistes n'ignorent pas). Pour ces raisons, nous avons pensé qu'il pourrait être possible de réaliser des préparations de chrome pur, en quantités réduites, dans les laboratoires, en incorporant au sesquioxyde pur Cr^3O^3 , une certaine quantité d'anhydride CrO^3 .

Notre sesquioxyde de chrome est obtenu en partant du dichromate de potassium cristallisé; nous le transformons en chlorure double de chrome et de potassium, en traitant par l'acide chlorhydrique additionné d'alcool, puis nous en précipitons le sesquioxyde au moyen de l'ammoniaque; nous le calcinons. Quant à l'anhydride, pour sa préparation, nous utilisons le procédé Duvillier qui consiste à traiter le chromate de baryum par l'acide azotique. Au moment de réaliser une expérience, l'anhydride est broyé dans un mortier en présence du sesquioxyde; après addition de l'aluminium en poudre, la masse y est rendue homogène au moyen du pilon, puis versée dans un creuset à

parois de magnésie aussi pure que possible. L'amorce est constituée par un mélange très fin d'anhydride chromique et d'aluminium.

Premier essai. — Nous prenons : sesquioxyde, 600^{gr}; anhydride, 60^{gr}; aluminium, 210^{gr}. La réaction s'effectue sans projection, mais elle est lente (2 minutes environ); cependant la fusion s'est produite. Après refroidissement, on ne trouve que des nodules de métal disséminés dans la scorie; ils n'ont pu atteindre le fond du creuset. D'où température insuffisante.

Deuxième essai. — La proportion d'anhydride est augmentée (20 p. 100 par rapport au sesquioxyde, au lieu de 10 p. 100) et partant celle de l'aluminium. Nous mélangeons : sesquioxyde, 600^{gr}; anhydride, 120^{gr}; aluminium, 270^{gr}. La réaction s'effectue avec plus de vivacité que la précédente, sa durée est plus faible : une minute à peine. Le culot est parfaitement fondu et complètement séparé d'avec la scorie; son poids est de 350 grammes, il présente les propriétés générales reconnues au chrome pur.

Analyse du chrome. — Un fragment de notre métal est dissous dans l'acide chlorhydrique et la liqueur limpide est évaporée à sec de façon à insolubiliser la silice. Le résidu est ensuite additionné d'acide azotique et évaporé à plusieurs reprises dans le but de chasser complètement le chlore combiné. Après cela, on ajoute encore de l'acide azotique et l'on projette du chlorate de potassium afin d'oxyder complètement le chrome et de le faire passer à l'état d'acide chromique. On filtre et l'on obtient la silice provenant du silicium susceptible d'être allié au chrome, ainsi que quelques autres matières insolubles pouvant provenir de la scorie. La liqueur est alors traitée par l'ammoniaque en excès qui, tout en laissant le chromate en solution, précipite le fer et l'aluminium à l'état d'hydrate. Le liquide résultant de la filtration ne contient plus que le chrome, que l'on précipite à l'état de chromate mercurieux. Le résidu de silice et matières insolubles, après calcination et pesée, est traité par l'acide fluorhydrique et évaporé à sec. Une nouvelle pesée donne les matières autres que la silice; elles étaient en quantité négligeable. Le précipité calciné d'oxyde de fer et d'aluminium est de même vérifié à l'aide de l'acide fluorhydrique qui détruirait la silice susceptible de s'y trouver. Nous trouvons :

	I	II
	—	—
Chrome p. 100.	98,40	98,54
Silicium p. 100	0,40	0,36
Aluminium-fer p. 100.	0,74	0,85
	<u>99,54</u>	<u>99,75</u>

Le précipité renfermant de l'aluminium et du fer a été calculé comme alumine.

En utilisant un sesquioxyde de chrome privé de toute trace de fer et une brasque de magnésie préparée par calcination de l'azotate pur, il nous a été possible de faire monter encore la teneur en chrome. Quoiqu'il en soit, nous n'avons pas trouvé de chrome présentant un aussi grand degré de pureté et nous avons pu facilement l'utiliser pour nos premières recherches sur les ferrochromes et étudier son action sur le chlorure de silicium.

Nouveaux essais de préparation du cuivre pur ;

Par M. ÉM. VIGOUROUX.

Dans le cours de nos recherches sur le siliciure de cuivre, ayant eu à effectuer un certain nombre de préparations de ce corps, nous nous sommes attaché à n'utiliser qu'un métal aussi pur que possible. A cet effet, notre choix s'est d'abord porté sur le cuivre électrolytique fourni par le commerce, puis nous avons préféré le préparer nous-même ; mais la production de ce dernier, en proportion notable, dans notre laboratoire, exigeant un outillage spécial, nous avons imaginé le procédé suivant qui nous a permis d'obtenir assez rapidement ce corps à l'état de pureté et en quantité suffisamment grande.

Le principe consiste à réduire le chlorure cuivreux à l'aide de l'aluminium métallique, et cela en opérant par voie humide. Le chlorure cuivreux offrant les meilleures garanties de pureté, il est évident que le métal qui s'y trouve ne peut être que parfaitement pur. Le chlorure cuivreux est préparé par le procédé ordinaire : acide chlorhydrique additionné d'un peu d'acide azotique et cuivre en excès.

Ces matières premières sont d'abord vérifiées. Un fragment de quelques grammes de notre aluminium commercial se dissout dans l'acide chlorhydrique sans abandonner de résidu ; sa solution, après peroxydation par l'acide azotique, prend bien une teinte rouge lorsqu'on le soumet à l'épreuve du sulfocyanure, mais le ferrocyanure ne lui imprime qu'une très légère coloration bleue. Le cuivre commercial que nous utilisons est sous forme de tournure ; nous écartons, à l'aide d'une pince, les quelques impuretés solides qui le souillent, puis nous en dissolvons 1^{re} dans l'acide azotique. La liqueur bleue obtenue est suffisamment limpide et ne présente qu'un résidu blanc peu appréciable. Après élimination du cuivre et peroxydation du liquide restant, nous y provoquons un léger précipité rouille lorsque nous le traitons par l'ammoniaque. Enfin l'acide chlorhydrique, de même que l'acide azotique, décèle la présence d'un peu de fer.

La tournure de cuivre emplit des vases coniques à précipitation, mesurant de 20 à 25 centimètres de haut sur environ 12 centimètres de diamètre inférieur. On la noie aux deux tiers dans l'acide chlorhydrique et l'on chauffe le récipient doucement sur un bain de sable. Pour réaliser rapidement une solution concentrée de chlorure cuivreux, il est bon d'arroser fréquemment la tournure de quelques gouttes d'acide azotique de manière que l'attaque présente toujours une certaine vivacité. On obtient ainsi, en peu de temps, une liqueur épaisse, franchement noire, susceptible de se prendre en masse cristalline par refroidissement ; mais cette masse peut être dissoute aisément, même à froid, par agitation et addition de quelques centimètres cubes d'acide chlorhydrique.

Cette liqueur noire est filtrée rapidement, à l'abri de l'air, au-dessus d'un flacon à large goulot renfermant une proportion d'eau bouillie très grande par rapport au volume de la solution de chlorure cuivreux. Le filtre retient la tournure de cuivre en excès et quelques impuretés solides. Si la liqueur chlorhydrique à filtrer est chaude ou si l'eau bouillie qui doit la recevoir n'est pas froide, la précipitation du chlorure cuivreux n'a pas lieu sur le champ ; elle se fait lentement au fur et à mesure du refroidissement. On peut continuer à verser la liqueur noire dans l'eau bouillie tant que cette dernière ne prend pas une teinte foncée qui serait un indice de la présence d'un excès de chlorure cuivreux chlorhydrique.

La précipitation effectuée, le chlorure cuivreux, assez lourd, tombe

rapidement au fond du flacon. Le liquide surnageant est incolore, si l'on a employé de l'eau bouillie; il est légèrement vert si l'on a utilisé de l'eau non privée d'air. On laisse reposer une heure environ, on décante rapidement une première fois, puis on ajoute, pour la deuxième fois, une égale quantité d'eau distillée: la préparation présente, dès lors, les conditions favorables à la précipitation de son cuivre par l'aluminium.

Il est, dès ce moment, sans grand inconvénient de laisser le sel cuivreux se perchlorurer aux dépens de l'oxygène dissous dans l'eau et du peu d'acide qui reste, des expériences préliminaires ayant montré que l'aluminium déposait le chlorure cuivrique de même que le chlorure cuivreux.

On introduit donc, dans le flacon à large goulot, l'aluminium en gros fragments et en nombre aussi grand que possible, de façon que la précipitation soit rapide et, dans ce même but, on agite fréquemment le récipient. Pour 500^{cc} de tournure attaquée, le dépôt complet du métal s'est effectué en moins de 24 heures. La fin de l'opération est marquée par ce fait que le cuivre tombe rapidement au fond lorsqu'on secoue le flacon et que la liqueur surnageante présente une limpidité parfaite. Les fragments résiduels d'aluminium sont enlevés à l'aide d'une pince en bois et le cuivre est lavé à grande eau, par décantation.

Pour éliminer les traces d'aluminium ou de tout autre corps qui pourrait le souiller, on le traite par l'acide chlorhydrique commercial pur, à l'abri de l'air, et l'on chauffe au bain de sable jusqu'à ébullition prolongée. Le précipité est ensuite lavé de nouveau à l'eau distillée jusqu'à réaction franchement neutre, puis à l'alcool. On obtient ainsi un métal d'aspect rougeâtre qu'on sèche et qu'on désoxyde complètement en le chauffant légèrement dans une nacelle en porcelaine introduite à l'intérieur d'un tube en verre parcouru par un courant d'hydrogène. Après refroidissement dans ce gaz, le cuivre se présente sous l'aspect d'une poudre brillante, d'un beau rouge saumon. Il ne reste qu'à le conserver dans un flacon bouché à l'émeri où il ne s'altère pas, à condition que les lavages aient entraîné les plus faibles traces d'acide chlorhydrique.

Un prélèvement de ce cuivre, au sortir de l'hydrogène, a été attaqué par l'acide azotique et l'azotate de cuivre formé a été évaporé en présence de l'acide sulfurique, ce qui l'a transformé en sulfate que l'on a

soumis à l'analyse électrolytique. A quelques centièmes pour cent près, le poids du cuivre prélevé a été retrouvé et, dans les eaux résiduelles, on n'a rencontré ni corps précipitable par l'hydrogène sulfuré, ni fer, ni aluminium, ni d'autre métal. Ce cuivre se présentait donc dans les conditions d'une complète pureté.

REMARQUES. — I. Les eaux de lavage du chlorure cuivreux précipité entraînent souvent du cuivre en quantité très appréciable ; il en est de même de l'acide chlorhydrique servant à laver le cuivre précipité. Il y a intérêt à traiter ces eaux par l'aluminium, malgré la présence et du fer et d'une grande quantité d'acide chlorhydrique libre qui doit consommer inutilement de l'aluminium. La précipitation du cuivre est d'ailleurs immédiate, ce qui permet de supposer que ce n'est pas l'acide chlorhydrique qui, le premier, agit sur le chlorure d'aluminium ou que cette réaction a lieu concurremment avec l'attaque du métal réducteur par le chlorure cuivreux.

Le cuivre ainsi obtenu peut contenir les impuretés métalliques accompagnant la tournure de cuivre, impuretés qu'a pu précipiter l'aluminium (fer, par exemple). Aussi un lavage de ce cuivre par l'acide chlorhydrique étendu paraît nécessaire.

II. — *Par le chlorure cuivreux et le fer* on a, de même, obtenu du cuivre pur. Nous avons fait usage de clous se dissolvant dans l'acide chlorhydrique, sans abandonner de résidu. Ces clous, décapés ou non, précipitent également bien le cuivre du chlorure cuivreux ; mais la réaction complète vis-à-vis de ce dernier sel ne l'est qu'imparfaitement vis-à-vis de ses produits d'oxydation. Aussi est-il nécessaire de ne laver qu'en présence d'eau bouillie. Après avoir retiré les fragments de fer non attaqué, on élimine les dernières particules par une ébullition du cuivre dans l'acide chlorhydrique étendu, comme précédemment. On ne retrouve pas trace de fer dans ce cuivre précipité.

III. — *Par le sulfate de cuivre et l'aluminium*, du cuivre est mis en liberté. Un échantillon d'environ 4 à 5^{re} de ce sulfate ne se dissolvait pas entièrement dans l'eau chaude, le résidu insoluble abandonné était assez appréciable ; de plus, la solution filtrée contenait beaucoup de fer (décelable par l'ammoniaque). On peut constater que du

cuivre se précipite pour tous les degrés de concentration de la solution de sulfate, mais cette action est lente, *surtout pour les solutions concentrées*. En essayant de l'activer par échauffement de la liqueur, on n'obtient pas de bien meilleurs résultats. La fin de la réaction est indiquée par la décoloration complète de la liqueur; or, des solutions étendues sont restées plusieurs jours sans se décolorer. Ce procédé semble le moins rapide de tous ceux qui ont été essayés.

IV. — *Par le sulfate de cuivre et le fer* on précipite également du cuivre. Des clous, décapés par différents acides ou simplement dépolis, ont été introduits dans des tubes à essais contenant une même solution *étendue* de ce sulfate. Le dépôt s'est effectué également bien dans les différents tubes, complètement, et dans le même laps de temps. Avec des solutions *concentrées*, il s'est formé sur les clous un dépôt de cuivre adhérent à la suite duquel la réaction s'est arrêtée. Ce dépôt est d'une adhérence telle qu'on peut le gratter fortement à l'aide d'un couteau sans parvenir à l'enlever. Il n'est pas foncé et pulvérulent, comme ceux des essais précédents, mais brillant et de couleur claire, de même que les dépôts galvaniques ou le cuivre fraîchement décapé.

Comme résultat pratique, il semble important de n'expérimenter que sur des solutions qui, saturées à froid, doivent être étendues d'au moins leur volume d'eau. La marche de l'opération est indiquée par la couleur du bain qui passe, peu à peu, du bleu au vert. Le lavage de ce cuivre précipité, à l'aide de l'acide chlorhydrique étendu, s'impose d'autant plus ici que le sulfate ferreux formé s'oxyde peu à peu en donnant du sulfate ferrique qui précipite dans la liqueur et vient se mélanger au cuivre.

L'expérience nous a montré que ces trois derniers procédés permettent aussi de préparer du cuivre absolument exempt de fer.

Des essais ont encore été effectués dans le but de précipiter par le zinc le même métal contenu dans le sulfate de cuivre. La précipitation est rapide et complète, mais le dépôt présente un aspect noirâtre.

En résumé, c'est par l'action de l'aluminium sur le chlorure cuivreux que nous obtenons les meilleurs résultats dans la préparation du cuivre pur.

L'analyse électrolytique, avons-nous dit, a amené, pour composition centésimale, des chiffres très voisins de 100. Finalement, en

effectuant une forte prise, nous avons pu atteindre 100 pour 100. Ainsi, dans une dernière opération, nous avons prélevé 0,8893^{sr}, comme échantillon d'essai, et nous avons retrouvé 0,8893^{sr} comme dépôt final à la cathode.

Séance du 7 février 1907.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PRÉSIDENCE DE M. LOISEAU

La candidature, comme membre honoraire, de M. Bertin, membre de l'Institut, directeur du Génie maritime, est mise aux voix et adoptée.

Le Fluor et les Huîtres;

Par M. CARLES.

Comme il est bien établi que le fluorure de calcium fait partie du squelette des vertébrés dont il confirme la solidité, nous avons toujours pensé qu'il existait aussi dans les écailles ou squelette externe des huîtres. A plusieurs reprises nous l'y avons recherché, mais sans résultats. Lorsqu'il y a quelques mois, nous avons dosé dans l'eau de mer 0,012 de fluorures par litre, notre conviction s'est accrue et nous nous sommes mis alors à suspecter la fidélité de notre méthode opératoire. C'était celle-ci : les écailles plongées dans de l'eau chlorhydrique s'y dissolvaient peu à peu; puis, dans la solution filtrée et neutralisée par l'ammoniaque, on ajoutait un mélange d'acétate de potasse et de chlorure de baryum. Le soi-disant précipité fluoruré recueilli, séché et calciné, enfin chauffé doucement avec de l'acide sulfurique ne gravait jamais le verre.

Or, comme après MM. Berthelot et Moissan (1) nous avons constaté que le gaz fluorhydrique déplacé par l'acide chlorhydrique à froid gravait bien le verre; comme, d'autre part, nous avons vérifié que le fluorure de calcium précipité était soluble dans le gaz carbonique

(1) DAMMER, t. I, p. 589, et MOISSAN, *Chimie minérale*, t. I, p. 80.

nous avons pensé que les résultats négatifs tenaient à ce que tout l'acide fluorhydrique déplacé par l'acide chlorhydrique était entraîné par le gaz carbonique au fur et à mesure de sa mise en liberté.

Pour le vérifier, les mêmes écailles calcinées et finement pulvérisées ont été mises à bouillir pendant deux heures dans de l'eau alcalinisée avec du carbonate de potasse et, à la fin, avec un peu de carbonate d'ammoniaque pour séparer la silice. Une partie des fluorures terreux devait être ainsi solubilisée. En effet, ce liquide lentement saturé par l'acide acétique en présence du chlorure de baryum a fourni un précipité qui a gravé légèrement, mais manifestement le verre. L'essai suivant a mieux réussi : 100^{gr} d'écailles bien brossées pour enlever le sable siliceux et l'argile, puis concassées, ont été mises dans un vase à précipités avec de l'eau pure, un peu de chlorure de baryum et 60^{gr} environ d'acide acétique cristallisable; puis le tout a été chauffé au bain-marie à 50°. Après douze heures, on a recommencé jusqu'à dissolution et tout a été filtré.

En principe, le fluor combiné au baryum et à la chaux devait être réuni au sable, aux membranes animales et autres insolubles. Voilà pourquoi la réunion de tous ces derniers, dûment lavés, a été calcinée et soumise ensuite à des digestions successives dans l'acide chlorhydrique, afin de dissoudre les fluorures. En réalité, en saturant le liquide filtré par l'ammoniaque, nous avons bien décelé les fluorures par gravure sur verre; mais en opérant de même avec la liqueur acétique filtrée, nous en avons retrouvé bien davantage. Voilà pourquoi, dans les essais définitifs, nous avons toujours reconnu urgent de réunir ces deux parts de fluorures dissous et indissous en une même liqueur neutre, si ce n'est légèrement alcaline.

Dans tous les cas, en agissant ainsi, nous avons constaté :

1° Que 100^{gr} d'écailles d'huîtres fraîches comestibles d'Arcachon contiennent 0,012 de fluorures, soit exactement la dose qu'on trouve dans un litre de la même eau de mer ;

2° Que 100^{gr} d'écailles de moules en renferment sensiblement la même dose, encore 0,012;

3° Enfin, que 100^{gr} d'huîtres fossiles⁽¹⁾ en contiennent un peu plus, soit 0,015.

(¹) Ces écailles proviennent des coteaux de Sainte-Croix-du-Mont, commune située sur la rive droite de la Garonne à 45 kilomètres en amont de Bordeaux. Ces coteaux

Ces expériences nous confirment donc la nécessité de se méfier du concours simultané de l'acide chlorhydrique et du gaz carbonique pour dégager le fluor des matières animales aussi bien que minérales.

Elles nous confirment encore la solubilité relative des fluorures terreux dans les acides faibles, tels que l'acide acétique, où ils sont réputés insolubles.

Elles nous apprennent, enfin, que l'huître se sert des fluorures terreux de la mer pour assurer la dureté et la résistance de ses écailles, comme les vertébrés le font à terre pour leur squelette interne.

Sur le dosage iodométrique de l'acide borique;

Par M. L. BARTHE.

En 1894, je me suis occupé⁽¹⁾ du dosage volumétrique de l'acide borique et des borates et j'avais montré à ce moment quelle était la modification à apporter à la méthode pour la rendre pratique et exacte. J'avais fait observer en même temps que si la glycérine permettait d'employer l'acidimétrie, en rendant à l'acide borique sa fonction acide, il était curieux d'observer qu'en présence de la glycérine, cet acide ne pouvait être titré par l'iodométrie : l'acide borique seul ou mélangé à la glycérine est incapable de libérer une quantité correspondante d'iode quand on le met en présence d'une solution d'iodate ioduré. La réaction n'est jamais totale, au moins dans les 48 heures qui suivent le moment où l'on a opéré le mélange d'acide borique, de glycérine et de solutions iodatées. Les températures de 10° à 25° n'ont aucune influence sur la vitesse de la réaction.

J. Prescher⁽²⁾ a signalé que L.-C. Jones a proposé « d'effectuer le

sont à 50 mètres environ au-dessus du fleuve. Le banc des huîtres est à quelques mètres au-dessous du plateau supérieur, il a 6 à 8 mètres d'épaisseur, si bien qu'en son milieu on a pu creuser des grottes et des caves. Les gens du pays prétendent qu'il a environ 100 mètres de longueur sur 50 de largeur. Les vignes sont rarement en contact immédiat avec le banc, mais il y a quelques crus où les coquilles sont nombreuses dans le sol cultivé de la vigne. La présence de ces coquilles ne paraît pas avoir d'influence sensible sur la qualité des vins de cette commune, bien que la plupart soient des vins blancs légèrement doux, d'une très grande finesse et pour ce motif fort recherchés. On prétend seulement que les vins récoltés en terrains à huîtres deviennent plus brillants et plus aisément limpides que les autres.

⁽¹⁾ *Journal de pharm. et chim.*, 15 fév. 1904, p. 163.

⁽²⁾ PRESCHER, *Archiv. de pharmacie*, 242, 1904, p. 203.

dosage volumétrique de l'acide borique par iodométrie en employant la mannite ». J'ai repris mes essais de dosage antérieur iodométrique de l'acide borique, non plus en présence de la glycérine alcool triatomique, mais en remplaçant celle-ci par la mannite, alcool hexatomique. Dans la pratique, en expérimentant avec un acide borique pur, desséché sous cloche au-dessus de SO^4H^+ , et dans le vide, titré préalablement par l'acidimétrie et mélangé avec la solution iodatée iodurée (iodure de potassium, 30 parties; iodate de potasse, 4 parties; eau, q. s. p. 1000), la mannite ne m'a pas donné de meilleurs résultats que la glycérine. Dans les mêmes conditions de temps et de température, de 1 à 48 heures et de 10 à 25°, la réaction n'est jamais totale, et le déplacement de la quantité d'iode correspondante n'est pas complet.

En essayant de mettre à profit une observation faite à propos de la séparation de l'iode du brome par MM. H. Baubigny et P. Rivals⁽¹⁾, qui ont annoncé que l'acide borique agit à froid sur les iodures, et qu'en faisant intervenir, en justes proportions, 2MnO^2 , H^2O provenant de la réduction de KMnO^4 par l'alcool, on obtient de bons résultats, j'ai répété mes expériences entre 10 et 25°, en présence de MnO^2 ainsi préparé et en proportions variables. Je n'ai pas obtenu de meilleurs résultats. Il est juste de dire que les auteurs précités, pour le cas spécial qu'ils ont en vue (la séparation des iodures et des bromures), conseillent de chauffer au bain-marie pour volatiliser tout l'iode, condition qui n'est plus applicable à un dosage volumétrique ordinaire.

Je considère donc que le dosage iodométrique de l'acide borique en présence de la glycérine et même de la mannite est impossible à réaliser dans les conditions que j'ai fait connaître, qui sont les conditions ordinaires d'expérimentation en usage dans les laboratoires.

Séance du 21 février 1907.

PRÉSIDENCE DE M. CARLES.

M. Arrivaut dépose sur le bureau de la Société un mémoire dont il demande l'impression. Ce mémoire a pour titre : « Contribution à l'étude des alliages de manganèse. »

L'examen de ce mémoire est confié à MM. Vèzes et Vigouroux.

(¹) C. R., 1903, 137, 650-653.

MM. Vèzes et Vigouroux sont élus commissaires chargés de l'examen de ce mémoire.

Théorie osmotique des Solutions;

Par M. M. VÈZES.

Cette communication sera publiée ultérieurement.

Séance du 7 mars 1907.

PRÉSIDENTE DE M. LOISEAU

M. Picart, directeur de l'Observatoire de Floirac, professeur à la Faculté des Sciences, est élu membre titulaire.

MM. Vèzes et Vigouroux déposent sur le bureau de la Société leurs rapports concluant à l'impression du mémoire de M. Arrivaut, ayant pour titre : « Contribution à l'étude des alliages du manganèse. »

Les conclusions de ces rapports sont adoptées.

Sur les bronzes à base de nickel;

Par M. Em. VIGOUROUX.

Le *bronze*, c'est-à-dire l'alliage de cuivre et d'étain, a joué un rôle considérable dans l'histoire de la métallurgie, et si l'*acier* a réussi à prendre la tête, lorsqu'on compare leurs chiffres respectifs de consommation, il faut bien reconnaître que le premier n'a pas encore son rival lorsqu'il s'agit de l'industrie spéciale de nombreux objets fabriqués. Sa grande importance explique et justifie les si intéressants travaux scientifiques auxquels ce corps a donné lieu, travaux qui

n'ont pas peu contribué à le faire connaître et à en développer les applications.

Cette simple considération amène à pressentir combien pourraient être fécondes en résultats pratiques les recherches que l'on orienterait sur un bronze d'une nature tout autre, c'est-à-dire sur l'alliage de l'étain avec ce métal que l'on appelle parfois le *cuivre blanc*, et plus communément le nickel, métal qui, par certains de ses caractères, tenant du cuivre d'une part et du fer d'autre part, viendrait apporter à ces sortes d'alliages des qualités de l'un et de l'autre et pourrait faire espérer des utilisations aussi nouvelles qu'insoupçonnées jusqu'à ce jour.

Malheureusement, les recherches sur ce genre de corps à l'état pur sont encore peu nombreuses, peut-être en raison de ce que, si le minerai de nickel n'est plus chose rare actuellement, c'est le métal chimiquement pur qui n'est guère répandu, à l'inverse du cuivre, et qu'il faut du temps et beaucoup de soin pour amener le nickel commercial à un état convenable de pureté.

Je me suis engagé dans la voie de ces recherches nouvelles et viens apporter aujourd'hui quelques résultats. Inutile de dire qu'ils ont été obtenus en n'utilisant que des métaux préparés par mes soins et dans un grand état de pureté.

L'étain commercial a été dépouillé du très peu d'impuretés qu'il retient encore, par les procédés classiques ; le nickel a été débarrassé non seulement de son silicium, cuivre, fer, etc., mais encore de son compagnon constant le cobalt, d'une façon aussi complète que possible.

Je ne ferai connaître, pour commencer, que les résultats d'un certain nombre d'essais (dont trois principaux), qui ont porté sur des alliages renfermant plus de 65 p. 100 d'étain.

Essai I. — Un premier alliage est préparé en prenant un poids d'étain de beaucoup supérieur à celui du nickel. Dans une nacelle en magnésie est versée de la poudre de nickel et au-dessus un petit lingot d'étain est posé. Le récipient ainsi chargé est introduit à l'intérieur d'un tube en porcelaine que l'on fait parcourir par un courant lent d'hydrogène, et le tout est chauffé dans un four Schloësing. Après la chauffe, qui n'a pas duré plus de trois quarts d'heure et qui a amené le ramollissement du tube en porcelaine,

l'ensemble de l'appareil est abandonné à un refroidissement très lent.

Le produit résultant de cette première expérience se présente sous la forme d'un culot fondu, homogène à l'œil nu, ayant pour composition :

Nickel.	26,22 p. 100
Étain	<u>73,64</u> —
	99,86

C'est un lingot de nuance gris de fer, à texture cristalline, dur (difficilement rayé par une pointe d'acier), cassant (il suffit de le laisser tomber sur la pierre pour qu'il se brise) et facilement pilé au mortier d'Abich. Enfin il est *sonore* et sans action sur l'aiguille aimantée.

L'acide chlorhydrique le détruit d'une façon complète et le tout entre en dissolution; il en est de même de l'acide sulfurique. L'acide azotique en désagrége les fragments peu à peu et complètement, mais il n'y a pas dissolution; il apparaît une poudre blanche d'acide métastannique, en même temps que du bloc se détachent de petits fragments métalliques, brillants et d'apparence cristalline.

Essai II. — La proportion d'étain est augmentée; ce dernier, toujours sous forme de lingot, est posé sur la poudre de nickel et l'opération est conduite comme dans le premier essai.

Le culot, complètement fondu et d'apparence homogène en la plupart de ses points, renferme :

Nickel.	16,37 p. 100
Étain	<u>83,65</u> —
	100,02

Ce lingot est dur, cassant, à section grisâtre, tirant sur le bleu; il présente à la surface un certain nombre de soufflures dont les cavités sont emplies de nombreux cristaux parfaitement discernables à l'œil nu. Il ne manifeste pas la sonorité du précédent et n'agit pas sur le barreau aimanté. Les acides chlorhydrique et sulfurique le dissolvent à la façon du premier alliage; quant à l'acide azotique, il l'attaque avec dégagement de vapeurs nitreuses, apparition d'acide métastannique et d'un résidu métallique, cristallin, sans qu'il y ait dissolution de nickel.

Essai III. — La proportion d'étain à incorporer est portée à un taux encore plus élevé. Après opération et refroidissement, dans les mêmes conditions antérieures, on trouve un culot homogène titrant :

Nickel.	6,93 p. 100
Étain	92,71 —
	<hr/>
	99,64

L'alliage, d'aspect blanc bleuâtre, ressemble suffisamment à de l'étain; il se laisse couper aisément, s'aplatit facilement, n'est ni sonore ni magnétique; toutefois, il manifeste une dureté un peu plus grande que ce dernier métal et présente une surface sillonnée de stries.

L'acide chlorhydrique l'attaque et le dissout complètement; de même l'acide sulfurique. L'acide azotique, à une teneur ne dépassant pas 50 p. 100, le ronge peu à peu en formant encore de l'acide métastannique et en isolant de nombreux petits grains métalliques. On ne trouve que très peu de nickel dans la liqueur nitrique.

L'analyse de ces alliages s'effectue par une attaque à l'eau régale très faible qui les dissout rapidement et complètement. Après évaporation au bain-marie jusqu'à siccité, de façon à chasser l'excès d'acide azotique, on reprend le résidu par l'acide chlorhydrique étendu. Dans cette nouvelle solution, l'étain est précipité à chaud par l'hydrogène sulfuré et, de la liqueur filtrée, le nickel est généralement éliminé au moyen de la potasse. Quelquefois il est transformé en sulfate double de nickel et d'ammoniaque et dosé par électrolyse.

CONCLUSION. — 1° Par action directe du nickel et de l'étain purs, on forme des alliages dont les teneurs respectives en étain sont : 73,64 p. 100, 83,65 p. 100 et 92,71 p. 100, le reste étant uniquement constitué par du nickel; 2° le premier possède la particularité d'être *sonore*, comme certains bronzes ordinaires, et ils présentent tous les trois le caractère commun d'être *non magnétiques* (ce qui porte à admettre que le nickel ne s'y trouve pas à l'état libre) et d'abandonner, sous l'action de l'acide azotique, un résidu métallique d'apparence plus ou moins cristalline. Il va être démontré que ces différents résidus, issus d'alliages à teneurs variables, présentent la même composition et que cette dernière répond à la formule d'un composé défini.

Première étude d'un corps retiré de certains alliages riches de nickel et d'étain;

Par M. EM. VIGOUROUX.

Dans la précédente note, il a été montré comment on peut séparer des alliages de nickel et d'étain riches en ce dernier métal, des corps métalliques, d'apparence généralement cristalline, et il a été exposé qu'ils possédaient tous la même composition. Cette dernière répond à la formule NiSn qui exige :

Nickel	33,24 p. 100.
Étain.	66,76 —
	<hr/> 100,00

Pour *isoler* la substance NiSn, il suffit de prendre l'un quelconque de ces alliages et de le soumettre à des attaques alternées à l'acide azotique chaud et à la potasse caustique en fusion. On termine par un lavage final avec le même acide en solution étendue.

Le premier lingot, titrant 73,64 p. 100 d'étain, est concassé grossièrement puis traité, à chaud, par une solution d'acide azotique à 25 p. 100. Un peu de nickel entre en dissolution dès le début de l'opération, mais, au bout de peu de temps, il n'en passe que des quantités excessivement faibles. La majeure partie de l'acide métastannique est éliminée par décantation et le peu qui peut encore souiller le résidu métallique est enlevé par attaque, au creuset d'argent, à l'aide de la potasse caustique fondue. Trois traitements analogues sont nécessaires pour le départ de la totalité de l'étain libre. Le produit est lavé une dernière fois dans de l'acide azotique étendu, et finalement le résidu se trouve constitué par un nouvel alliage dans lequel la teneur en étain est descendue de 73,64 p. 100 à un chiffre voisin de 66,76 p. 100.

L'analyse donne, en effet :

	I	II
	<hr/>	<hr/>
Nickel p. 100.	33,45	33,37
Étain —	66,88	66,26
	<hr/> 100,33	<hr/> 99,63

Le second lingot, au titre de 85,65 p. 100, est soumis au même traitement. L'acide azotique chaud, qui produit d'abord un dégagement de vapeurs rutilantes, ne dissout pas de nickel; ce n'est qu'après désagrégation complète du culot que ce liquide, continuant à agir, amène un peu de ce métal à l'état de solution. Après trois séries d'actions alternées, à l'acide azotique et à la potasse en fusion, la teneur du culot est descendue à 71,33 p. 100. Par une quatrième, plus énergique encore, suivie d'une digestion finale dans l'acide azotique bouillant, opérations qui ont pour effet d'entraîner un peu de nickel en même temps que beaucoup d'étain, la substance résiduelle est amenée à une teneur très voisine de la formule correspondant à NiSn. A partir de cette teneur, de nouvelles attaques ne font plus baisser la proportion d'étain.

On trouve alors :

	I	II
Nickel p. 100.	33,20	33,71
Etain —	66,06	66,41
	<u>99,26</u>	<u>100,12</u>

Le troisième lingot, d'une contenance en étain atteignant 92,71 p. 100, est attaqué de la même façon. Une solution chaude d'acide azotique, à une teneur ne dépassant pas 50 p. 100, lui enlève de grandes quantités d'étain à l'état d'acide métastannique et des proportions excessivement faibles de nickel. Par décantation, la majeure partie du composé stannique s'élimine encore et, par l'effet de la potasse caustique fondue, son élimination s'achève. En réitérant cette double action et en lavant finalement le résidu avec de l'acide azotique, on fait disparaître complètement l'étain libre. Le corps, isolé de ce troisième échantillon, répond encore sensiblement à la formule NiSn. L'analyse donne, en effet:

	I	II
Nickel p. 100.	33,97	32,79
Etain —	66,57	66,24
	<u>100,54</u>	<u>99,03</u>

PROPRIÉTÉS. — La substance NiSn se présente généralement sous la forme d'une poudre cristalline blanc d'argent, qui montre, au micro-

scope, des facettes brillantes très nettes et absolument dépourvues d'acide métastannique; sous l'action de l'air acide du laboratoire elle prend rapidement un aspect plus foncé. Son action est nulle sur l'aiguille aimantée. Sa densité, prise dans la glace fondante, est voisine de 8,44 (moyenne de trois déterminations); sa densité calculée serait 7,93: la formation de ce corps est donc accompagnée d'une contraction.

Le chlore n'agit pas à froid, mais, dès le rouge, il y a formation des deux chlorures et la nacelle se vide complètement; dans le tube, on constate la présence de paillettes de chlorure de nickel anhydre, le chlorure d'étain ayant été entraîné plus loin.

L'oxygène brûle ce corps au rouge avec incandescence; il apparaît dans la nacelle une masse fondue, verdâtre, mélange des deux oxydes de nickel et d'étain.

La vapeur de soufre, à chaud, transforme facilement les deux métaux en sulfure sans qu'il y ait incandescence.

L'acide chlorhydrique, étendu ou concentré, le dissout complètement en agissant d'une façon modérée; il en est de même de l'acide sulfurique, bien que son attaque soit un peu moins vive.

L'acide azotique ne produit qu'un effet nul lorsqu'il est dilué; à l'état concentré et bouillant, l'action qui se manifeste est encore excessivement faible; ce n'est que par une ébullition prolongée que le poids de ce corps peut être sensiblement diminué.

Dans l'eau régale, même peu chargée d'acide azotique, la dissolution du produit devient très facile.

Les alcalis, même fondus au creuset d'argent, ne décèlent qu'une action très lente. Les carbonates alcalins, en fusion dans le platine, sont dans le même cas; le fait est analogue pour les azotates alcalins fondus également.

C'est le chlorate de potassium qui, avant d'atteindre son point de fusion, désagrège et oxyde assez facilement la matière.

Le *mode général d'analyse* a été indiqué dans la note précédente; il n'a pas varié.

CONCLUSIONS ET REMARQUES. — 1° Certains bronzes purs, à base de nickel, contenant de 73,64 à 92,71 p. 100 d'étain, alternativement traités à chaud par l'acide azotique et la potasse caustique, subissent un abaissement graduel de leur teneur en étain (tout en ne se dépouil-

lant sensiblement que de ce dernier) et finissent par atteindre une limite fixe, la même pour tous, très voisine de 66,76 p. 100 et correspondant à la formule NiSn .

2° La substance non magnétique, répondant à cette composition et qui présente le caractère d'un composé défini, paraît constituer le seul corps, le plus chargé en étain, susceptible d'être isolé de tout alliage présentant une teneur centésimale comprise entre 66,76 et 100. Le composé défini nickel-étain le plus riche contiendrait donc ces deux métaux alliés dans les proportions respectives de 1 à 2.

Dès 1896, M. H. Gautier ⁽¹⁾ établissait expérimentalement la courbe de fusibilité des alliages nickel-étain; et, en 1901, M. G. Charpy ⁽²⁾ attribuait à ces mêmes corps une constitution analogue à celle des alliages de cuivre et d'antimoine.

La courbe tracée par M. H. Gautier ne décèle rien de particulier pour le point se rapportant à la composition de notre corps NiSn ; elle marque l'existence d'un maximum correspondant à un alliage ayant une teneur de 43 p. 100 de nickel (soit 57 p. 100 d'étain), ce qui permit au même auteur d'y signaler la présence du composé défini Ni^2Sn^3 qu'il déclare ne pas avoir isolé. Ce dernier se rencontrait donc dans des lingots renfermant des proportions d'étain inférieures à celles qui font l'objet de notre étude.

Quoi qu'il en soit, s'il n'est pas interdit d'opiner que les formules des corps susceptibles d'être rencontrés dans ces alliages ne représentent que des solutions solides, des eutectiques ou des mélanges isomorphes, il est du moins défendu de dire que ces sortes d'état soient le fait de la présence du nickel et de l'étain libres dans ces mêmes alliages. Outre qu'il deviendrait difficile d'expliquer certaines particularités nouvelles, la perte de la propriété magnétique du nickel, par exemple, les résultats de l'expérience suivante suffiraient seuls pour faire rejeter une telle hypothèse. Nous avons préparé un mélange de poudres de nickel et d'étain, respectivement dans les proportions voisines de 1 à 2 et nous l'avons chauffé légèrement au fond d'un petit tube à essai: à peine l'étain entraînait-il en fusion qu'une *vive incandescence* se produisait, la totalité de la masse se transformait en

(1) H. GAUTIER, *Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, t. CXXIII, p. 109, année 1896.

(2) G. CHARPY, *Contribution à l'étude des alliages*, p. 137, année 1901.

un culot complètement fondu et ce dernier abandonnait rapidement de très brillants cristaux, dès qu'on l'attaquait par l'acide azotique chaud.

Donc, dans ces sortes de bronzes, le nickel et l'étain existent réellement à l'état de combinaison.

La détermination des poids moléculaires et ses anomalies;

Par M. M. VÈZES.

Cette communication sera publiée ultérieurement.

Séance du 21 mars 1907.

PRÉSIDENTE DE M. LOISEAU

Première étude sur les alliages de cobalt et d'étain;

Par M. F. DUCELLIEZ.

Les alliages de cobalt et d'étain n'ont été que peu étudiés jusqu'ici. Ayant entrepris un travail sur ce sujet, j'ai préparé des culots contenant ces deux métaux en proportions différentes. La fusion a été effectuée, au moyen du four Schloesing, dans une nacelle en magnésie, placée dans un tube en porcelaine, parcouru par un courant d'hydrogène. Le cobalt en poudre a été mis dans le fond de la nacelle et recouvert par un lingot d'étain.

Le métal employé est de marque Banca, analysé au laboratoire et ne contenant que peu d'impuretés. Le cobalt provient de cobalt en cubes, débarrassé de la silice et du carbone en le mettant en solution, des autres impuretés en le faisant passer à l'état de chlorure pur-purécobaltique, puis en lavant ce produit à l'acide chlorhydrique. Ce chlorure, amené en solution aqueuse, donne par la potasse un

précipité d'oxyde de cobalt anhydre; il suffit de laver ce précipité et de le réduire dans l'hydrogène, pour avoir du cobalt pur en poudre.

Les culots ont des aspects bien différents suivant leur teneur en étain. De 100 à 85 p. 100 d'étain ils se rapprochent de ce corps, on peut les couper; au-dessous de cette teneur, ils deviennent durs et cassants.

CULOT I. — Il est de couleur gris clair avec des points brillants, il tombe en poussière au mortier d'Abich. Sa composition est :

Co	19,11
Sn	80,89
	<hr/>
	100,00

CULOT II. — La surface de ce culot présente l'aspect d'un réseau de lames cristallines, on peut le couper; il s'aplatit sous le marteau. A l'analyse, il donne :

Co	10,42
Sn	89,28
	<hr/>
	99,70

CULOT III. — Il a l'apparence de l'étain, dont il garde la grande malléabilité; il contient :

Co	6,35
Sn	92,91
	<hr/>
	99,26

Ces trois lingots ne sont pas attirables à l'aimant; les acides chlorhydrique et sulfurique les attaquent complètement.

COMPOSÉ CoSn. — Au moyen d'attaques appropriées, j'ai pu retirer de chacun des culots précédents un résidu métallique répondant à la formule CoSn. La composition calculée correspondant à cette formule est :

Co	33,24
Sn	66,76
	<hr/>
	100,00

La succession des opérations à faire subir aux culots est la suivante :

1° Porphyrisation au mortier d'agate (au début, on casse le culot ou on le coupe en petits fragments).

2° Attaque par l'acide azotique à 25 p. 100 et bouillant. Le résidu est alors mélangé à de l'acide métastannique; pour se débarrasser de la majeure partie de ce dernier, on procède par lévigation.

3° On traite le résidu par de la potasse fondue dans un creuset d'argent.

4° Le produit est lavé à l'eau, l'alcool, l'éther; puis séché.

Le culot I, broyé au mortier d'Abich, contenait, après avoir subi deux fois les opérations indiquées : 71,12 p. 100 d'étain; 68,59 p. 100 après avoir été traité une troisième fois.

L'analyse donne, après une nouvelle série d'opérations :

Co	33,62	33,71
Sn	66,48	66,21
	<hr/>	<hr/>
	100,00	99,92

Des attaques nouvelles diminuent alors légèrement le poids du résidu, mais ne modifient pas sa composition.

Le culot II, coupé en morceaux, se désagrége de lui-même dans l'acide azotique. Analysé après quatre séries d'attaques, il donne :

	1 ^{re} ANALYSE	2 ^e ANALYSE
Co	33,39	33,61
Sn	66,82	66,08
	<hr/>	<hr/>
	100,21	99,69

composition que des attaques ultérieures ne modifient pas.

Le culot III, amené en morceaux, se désagrége comme le précédent, sous l'influence de l'acide azotique; traité un même nombre de fois, il donne à l'analyse :

Co	33,60
Sn	66,56
	<hr/>
	100,16

Ce résidu a été attaqué, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le poids de matière nécessaire à un dosage; celui-ci a fourni :

Co	33,04
Sn	66,79
	<hr/> 99,83

CHALEUR DE FORMATION DE LA COMBINAISON CoSn . — Ce qui précède montre que l'étain et le cobalt se combinent dans la proportion simple de 2 d'étain pour 1 de cobalt; une expérience assez délicate à bien réussir montre que, de plus, dans ces proportions, l'union des deux métaux a lieu avec un fort dégagement de chaleur, portant la masse au rouge vif.

On fait un mélange intime, dans les proportions indiquées, de cobalt en poudre et d'étain grenailé aussi petit que possible; ce mélange est placé dans un tube à essais. Si l'on porte au rouge, simplement à l'aide d'un bec Bunsen, un point du mélange, les deux métaux se combinent à cet endroit et l'on y constate l'incandescence. La réaction ainsi amorcée se propage dans tout le mélange en le portant au rouge vif.

Pour réussir, il faut : 1° que les deux métaux soient parfaitement mélangés; 2° que le cobalt soit réduit à fond. Cette deuxième condition est difficile à réaliser, car lorsque l'on chauffe, sans en éliminer l'air, le mélange d'étain et de cobalt, ce dernier paraît s'oxyder légèrement à la surface. Aussi faut-il opérer dans un tube fermé par un bouchon, livrant passage à deux tubes, l'un des deux donnant accès à de l'hydrogène et faire passer ce gaz un certain temps, avant de commencer l'opération. Après l'expérience, lorsqu'elle a bien réussi, le tube est déformé; le contenu est fondu en grains collés ensemble.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DE CoSn . — Cet alliage à formule définie se présente sous la forme d'une poudre grise, plus foncée que les culots lui ayant donné naissance; il n'est pas attirable à l'aimant. Sa densité théorique, 7,675, est plus faible que la densité trouvée, 8,950; cette dernière est même supérieure à celle du cobalt, le plus lourd des métaux qu'il contient.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DE CoSn . — Le chlore gazeux attaque

complètement l'alliage au rouge, sans incandescence; les chlorures se volatilisent.

L'oxygène réagit, avec incandescence, lorsque l'on place l'alliage dans un tube, porté préalablement au rouge et parcouru par ce gaz.

La vapeur du soufre donne, au rouge, des sulfures fondus, sans incandescence.

Les acides chlorhydrique et sulfurique attaquent complètement l'alliage.

L'acide azotique étendu ne l'attaque pas, même à l'ébullition; concentré et chaud, il l'attaque faiblement.

Les carbonates alcalins, les alcalis en fusion n'ont sur lui qu'une action lente.

Les oxydants fondus: azotates alcalins, chlorate de potassium, l'oxydent difficilement.

ANALYSE. — Pour analyser ces corps, on les a attaqués par l'eau régale faible en acide azotique; la solution a été évaporée partiellement au bain-marie, avec quelques additions d'acide chlorhydrique. Cette solution, étendue et bouillante, a été soumise à l'action de l'hydrogène sulfuré, jusqu'à refroidissement. Avant de filtrer le sulfure d'étain, elle a été mise au bain de sable jusqu'à disparition de l'odeur du réactif. L'oxyde d'étain provenant de la calcination du sulfure a été pesé.

La liqueur filtrée, soumise à l'évaporation et à l'action de l'acide sulfurique, a donné du sulfate de cobalt que l'on a pesé.

Quelques dosages de cobalt ont été contrôlés par l'électrolyse.

CONCLUSION. — 1° J'ai isolé un alliage de formule définie: CoSn , en traitant par l'acide azotique et la potasse des culots dont la teneur en étain varie de 100 à 66 p. 100.

2° J'ai montré que l'alliage CoSn est un composé exothermique.

3° J'ai étudié les propriétés de la combinaison CoSn .

Les ions et la dissociation électrolytique;

Par M. M. VÈZES.

Cette communication sera publiée ultérieurement.

*Séance du 11 avril 1907.*PRÉSIDENCE DE M. LOISEAU

La Société décide de publier dans ses Mémoires une notice de M. J. Tannery sur P. Tannery, ainsi que la liste bibliographique des œuvres de ce savant. Cette liste, préparée par les soins de M. P. Tannery, sera uniquement réservée à nos Mémoires.

*Séance du 25 avril 1907.*PRÉSIDENCE DE M. BAYSSELLANCE

Le vote sur la candidature de M. l'abbé Dubaquié, présenté par MM. Dubourg et Gayon, et sur celle de M. Chateau, pharmacien militaire, présenté par MM. Dubourg et Vèzes, est mis à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Les bronzes à base de nickel;**III**Par M. ÉM. VIGOUROUX.

Antérieurement (1), l'auteur du présent Mémoire a fait paraître deux premières études sur ces sortes de bronzes; nous exposerons aujourd'hui les résultats obtenus avec des corps renfermant des proportions d'étain comprises entre 0 et 40 p. 100.

Les préparations sont toujours effectuées au four Schloesing chauffant un tube en porcelaine parcouru par un courant d'hydrogène pur et sec. A son intérieur se trouve une nacelle en magnésie dans laquelle le mélange des deux métaux est amené à fusion.

(1) ÉM. VIGOUROUX, Les bronzes à base de nickel (*Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences physiques*, 7 mars 1907) et : Première étude sur un corps contenu dans certains bronzes à base de nickel (mêmes *procès-verbaux*, 7 mars 1907).

1^{er} essai. — On prépare un mélange voisin de 10 p. 100 d'étain. Ce métal finement grenailé est mélangé avec du nickel en poudre; les deux corps sont comprimés en cylindres et ces derniers sont amenés à fusion. Le culot obtenu présente une texture homogène et une sonorité très perceptible; il est un peu magnétique; n'est pas susceptible d'être pilé; pour le fragmenter, il faut la lime. Il est composé de nickel, 91,19; étain, 9,01 p. 100. Total : 100,20.

L'acide chlorhydrique l'attaque complètement dès qu'il est un peu concentré; il en est de même de l'acide azotique commercial. Sous l'action de ce dernier très étendu d'eau (1 p. 100 d'acide), le nickel s'attaque surtout le premier et, dans le très faible résidu qu'on a pu recueillir, résidu s'altérant à l'air, la teneur en étain était déjà montée à 34,19 p. 100.

2^e essai. — On élève la proportion d'étain et le culot est préparé dans les mêmes conditions que précédemment. Il est formé de :

Nickel p. 100	77,90
Étain p. 100	<u>22,74</u>
	100,64

Cet alliage présente une texture cristalline et une dureté assez grande : l'acier le raye difficilement et le mortier d'Abich le brise assez facilement; peu magnétique. L'acide chlorhydrique concentré le dissout complètement et l'acide azotique concentré, au contraire, abandonne une certaine quantité de résidu.

Environ 10 grammes de culot brut sont broyés et traités par une solution d'acide azotique à 10 p. 100. Une vive attaque se manifeste avec passage, en solution, d'une grande quantité de nickel et dépôt d'une substance cristalline, dense, accompagnée d'acide métastannique et d'une matière noirâtre qui, par lévigation, s'élimine partiellement avec ce dernier acide. Après reprise rapide dans la potasse en solution concentrée en creuset d'argent, il ne reste plus que de la matière noirâtre relativement légère que l'on sépare par décantation et 2 ou 3 grammes de beaux cristaux de couleur claire, tirant sur le brun.

Ces cristaux brun clair, qui n'agissaient plus sur l'aiguille aimantée, titraient :

	I	II
	—	—
Nickel p. 100.	59,04	59,61
Étain p. 100.	40,05	39,54
	<u>99,09</u>	<u>99,15</u>

3^e *essai*. — On porte la teneur en étain au-dessus de 30 p. 100, en opérant encore au four Schlœsing avec du nickel en poudre et de l'étain pur grenailé. Le titre du culot est de :

Nickel p. 100	66,33
Étain p. 100	33,05
	<u>99,38</u>

Alliage bien fondu, très cassant, se broyant facilement au mortier d'Abich ; faiblement magnétique.

Après lui avoir fait subir un broyage, on le soumet à une première attaque à l'aide d'une solution d'acide azotique à 15 p. 100 que l'on fait suivre d'un traitement à la potasse pour enlever un peu d'acide métastannique qui a été formé. L'analyse du corps isolé fournit alors les résultats I ; une seconde attaque très prolongée à l'aide de l'acide azotique à 10 p. 100, également suivie d'un traitement à la potasse, amène encore l'apparition d'une matière bronzée, cristalline, répondant à la composition II.

	I	II
	—	—
Nickel p. 100	59,37	60,22
Étain p. 100	40,27	39,71
	<u>99,64</u>	<u>99,93</u>

4^e *essai*. — Un mélange d'étain en proportion encore plus grande et de nickel préparé comme dans le 3^e *essai*, puis chauffé comme précédemment, a fourni un culot bien fondu de couleur bronzée, cassant, sonore, peu magnétique, particulièrement bien cristallisé, d'après l'examen de sa cassure qui rappelle celle du granit. Sa composition :

	I	II
	—	—
Nickel p. 100.	61,54	61,40
Étain p. 100.	37,66	37,51
	<u>99,20</u>	<u>98,91</u>

11 gr. 80 du culot broyé sont soumis à l'action de l'acide azotique à 10 p. 100 en solution bouillante. L'attaque, moins vive que dans les cas précédents, entraîne encore le passage de nickel dans la liqueur et la formation d'un résidu métallique brun clair souillé d'un peu d'acide métastannique; on l'enlève par la potasse et l'on recommence cette série d'attaques, plusieurs fois, après avoir encore pilé le résidu. Lorsqu'il ne pèse plus que 5 gr. 3, c'est-à-dire lorsqu'il a été réduit à peu près de moitié, son analyse donne :

Nickel p. 100.	61,12
Étain p. 100.	<u>38,54</u>
	99,66

Une seconde attaque de 5 grammes de ce résidu par l'acide azotique à 15 p. 100, puis par la potasse, fournit 3 gr. 2 de matière dont l'analyse révèle :

	<u>I</u>	<u>II</u>
Nickel p. 100.	59,64	59,30
Étain p. 100.	<u>40,75</u>	<u>40,99</u>
	100,39	100,29

Une troisième attaque, effectuée sur la substance résiduelle, donne : 59,02 p. 100 pour le nickel, et 41,00 p. 100 pour l'étain; total : 100,02; ce qui montre la constance de sa composition.

Tous ces corps, ainsi isolés, répondent assez exactement à la formule du composé défini Ni^*Sn qui exige : nickel, 59,78 p. 100; étain, 40,22 p. 100.

PROPRIÉTÉS. — Le corps répondant à la formule Ni^*Sn présente généralement la couleur brun clair, lorsqu'il est en poudre qui fonce à l'air bien que lentement; les culots qui l'engendrent ont l'aspect d'autant plus bronzé qu'ils sont plus voisins de sa formule; sa nuance est absolument différente de celle du corps NiSn , étudié précédemment, qui tire plutôt sur le gris d'acier. Il n'est pas magnétique, bien que les culots qui l'engendrent le soient, et est soluble dans le nickel. Sa densité à 0 est de 8,98 (moyenne de trois déterminations); sa densité calculée serait 8,17 s'il y avait simple mélange.

L'oxygène l'attaque au rouge, mais lentement, en raison de la couche compacte d'oxyde, de couleur verte qui le recouvre. Le chlore

agit de même vers la même température et cela avec incandescence. A l'intérieur de la nacelle se trouve une masse fondue, jaune, brillante et, à l'extérieur, des paillettes également jaunes et brillantes, le tout constitué par du chlorure de nickel; le chlorure d'étain a distillé plus loin; par l'hydrogène sulfuré, après dissolution des produits contenus dans le tube, on n'en trouve pas trace.

L'acide chlorhydrique agit dès la température ordinaire, même lorsqu'il est étendu; dans le même liquide chaud, concentré ou non, la dissolution est complète bien qu'assez longue à s'achever.

L'acide sulfurique le dissout très rapidement à chaud; son action se manifeste même à froid; elle devient facilement complète.

L'acide azotique, lorsqu'il est étendu et froid, ne produit que peu d'effet; chaud, il agit légèrement; à l'état concentré et chaud, il fait apparaître de l'acide métastannique; toutefois, il serait très difficile de rendre complète l'attaque. C'est celui des acides auquel ce corps oppose le plus de résistance.

L'eau régale entraîne une dissolution rapide, sans résidu.

La potasse en solution n'a pas d'action; en fusion, son effet corrosif ne s'exerce que très lentement.

CONCLUSIONS. — 1° Des culots contenant jusqu'à 40 p. 100 d'étain et faiblement magnétique fournissent un corps répondant à la formule Ni^2Sn non magnétique;

2° L'isolement se fait à l'aide de l'acide azotique : il passe d'abord beaucoup de nickel et l'attaque est vive; il s'attaque ensuite du nickel et de l'étain, et l'action devient lente.

Ajoutons enfin qu'au-dessous d'une teneur en étain très voisine de 40 p. 100, les alliages nickel-étain préparés par nous sont magnétiques; pour des teneurs supérieures, tous les lingots que nous avons étudiés ne manifestent pas de propriété magnétique.

Action du silicium en excès sur le cuivre en présence d'un autre élément;

Par M. ÉMILE VIGOUROUX.

En juillet 1901, nous avons résumé dans ces *Procès-verbaux* les résultats de nos recherches touchant l'action du silicium en excès sur

le cuivre en publiant que « la quantité maxima de silicium susceptible de rester combinée avec le cuivre était voisine de 10 p. 100 », chiffre qui correspond à la formule Cu^4Si .

Plus tard, M. Lebeau, dans les *Comptes rendus de l'Académie des Sciences* d'abord (15 janvier 1906), dans le *Bulletin de la Société Chimique de Paris* ensuite (5 octobre 1906), a recherché quelle influence pouvaient avoir la vitesse de refroidissement d'un mélange fondu de cuivre et de silicium et aussi la teneur en silicium total sur cette limite de siliciuration. Il en conclut que cette limite correspond bien à Cu^4Si .

Nous nous sommes demandé quelle pourrait être l'influence de la présence d'un tiers élément, mis en contact avec le cuivre et le silicium toujours en excès, au moment où on les fait entrer en réaction.

Les résultats nouveaux que nous présentons aujourd'hui se rapportent au plomb, au bismuth et à l'antimoine.

INFLUENCE DU PLOMB. — Les proportions utilisées sont les suivantes : cuivre pur préparé par le chlorure cuivreux et l'aluminium, 81,74 grammes ; silicium cristallisé pur, 18,26 grammes. Total : 100 grammes. A ces 100 grammes, il est ajouté 10 p. 100 de silicium, ce qui porte le total à 110 grammes et ce poids de mélange des deux corps est additionné de 220 grammes de plomb pur de l'azotate, en petits fragments.

Les morceaux de plomb sont empilés dans une nacelle en porcelaine et, dans les interstices, le mélange de cuivre et de silicium est versé. La charge est introduite au milieu d'un tube en porcelaine que, durant la chauffe, parcourra un courant lent d'hydrogène pur et sec. Cette dernière s'effectue dans un four porté à une température oscillant autour de 1200° et sa durée est d'environ trois heures.

Après refroidissement, en même temps qu'un peu de plomb solidifié à l'intérieur du tube, on trouve dans la nacelle un culot fondu, constitué par une masse unique, mais dénué de toute homogénéité. Avant d'en poursuivre l'étude, il est jugé préférable de le soumettre à une nouvelle fusion. A cet effet, on le fragmente et on le chauffe une seconde fois en se plaçant dans les mêmes conditions précédentes.

Le nouveau lingot, arrivé à la température ordinaire, se présente constitué à la partie inférieure par une couche oblongue de métal manifestant la souplesse et la couleur bleuâtre du plomb et, figés du

côté de sa face supérieure, un certain nombre de nodules, plus ou moins circulaires, mesurant 20 millimètres de diamètre environ et deux ou trois millimètres d'épaisseur.

La couche inférieure, dépouillée aussi complètement que possible des dernières particules de ces nodules, présente la composition du plomb presque pur. L'analyse n'y révèle, en fait de silicium et cuivre, que les faibles proportions centésimales suivantes : silicium libre, 0,009; silicium combiné, 0,111; cuivre, 1,003. On les y trouve en dissolvant 30,673 grammes de ce plomb impur dans l'acide azotique, insolubilisant et filtrant. Le résidu renferme le silicium et la silice qui se séparent par l'eau acidulée d'acide fluorhydrique; la liqueur contient le plomb et le cuivre et ce dernier se dose par électrolyse, après précipitation du plomb par addition d'acide sulfurique.

Quant aux nodules de la face supérieure, ils sont soigneusement détachés du culot, avec la pointe d'un couteau, et soumis à une analyse qualitative préliminaire qui montre l'absence du plomb. Dans ces conditions, leur dosage s'effectue de la façon suivante : attaque par l'acide azotique étendu et chaud jusqu'à épuisement complet; insolubilisation en présence de l'acide chlorhydrique; reprise par ce même liquide étendu, afin d'entraîner tout le cuivre que l'on dose par électrolyse à l'état de sulfate; pesée du résidu de l'insolubilisation, puis lavage de ce dernier avec de l'eau fluorhydrique; ce qui disparaît est compté comme silice. Le second résidu est évalué en silicium libre dans ce cas et dans celui des deux métaux suivants. On en détermine facilement le poids. Ce dernier, retranché du poids du résidu total, fait connaître celui de la silice et partant celui du silicium combiné.

Les analyses de deux échantillons I et II d'environ 1 gramme chacun sont conduites de cette façon, avec introduction de cette variante que les deux résidus d'insolubilisation sont réunis après leur pesée et traités ensemble par l'eau fluorhydrique.

RÉSULTATS

	I	II
Cuivre p. 100.	83,40	84,00
Silicium combiné p. 100 . . .	9,53	9,35
Silicium libre p. 100. . . . ;	6,40	6,40
TOTAL.	99,33	99,75

En effectuant la somme du cuivre et du silicium combiné et en ramenant leurs proportions à 100, on trouve comme silicium combiné les chiffres respectifs de 10,25 pour I et 10,00 pour II. C'est donc le composé Cu^4Si qui se forme sous l'influence du silicium en excès en présence du plomb. Nous avons pu facilement l'identifier en traitant, par la potasse étendue, les nodules détachés du plomb : le silicium libre s'élimine et le siliciure de cuivre reste avec ses caractères.

INFLUENCE DU BISMUTH. — Les proportions mises en œuvre sont les suivantes : cuivre, 81 grammes ; silicium cristallisé, 28,50 grammes ; bismuth, 200 grammes. Ces trois substances, en poudre grossière, sont mélangées à l'aide d'un mortier et tassées dans une grande nacelle en porcelaine que l'on chauffe ensuite dans les mêmes conditions précédentes.

Le résultat de l'opération est un culot bien fondu contenu dans la nacelle, pesant 280 grammes et ayant épousé la forme de cette dernière. Hors de la nacelle on trouve, du côté de l'orifice de sortie du tube, une certaine quantité de substance métallique qui n'est autre que du bismuth pur absolument exempt de cuivre et de silicium. Les deux produits se cassent facilement avec la main.

Une section du lingot retiré de la nacelle montre qu'il est constitué par trois couches : une première couche inférieure, abondante, lamellaire, blanchâtre et à reflets jaune pâle, présentant l'apparence du bismuth. Une seconde couche au-dessus et noyée dans la masse ; de forme lenticulaire et à reflets rougeâtres, comme le siliciure de cuivre. Enfin, à la surface supérieure, une troisième couche d'aspect gris noir, semblable à du silicium cristallisé fondu ou fritté.

La couche inférieure, analysée rapidement, montre que l'on a affaire à du bismuth à peu près pur, ne renfermant que de très faibles proportions de cuivre et de silicium. On trouve, en effet : bismuth, 95,16 ; Cu, 3,28 ; silicium combiné, 0,37 ; silicium libre, traces.

La substance rougeâtre, la plus importante pour nous, est soumise à un dosage aussi rigoureux que possible. En conséquence, dans la masse concassée, les petits morceaux rouges sont triés à la pince, puis attaqués après porphyrisation. Un essai qualitatif ayant montré qu'ils ne renferment pas de bismuth, ils sont analysés comme un siliciure de cuivre ne contenant que du silicium en excès, les deux résidus d'insolubilisation étant réunis, comme dans le cas du plomb.

RÉSULTATS

	I	II
	—	—
Cuivre	83,80 p. 100	84,20 p. 100
Silicium combiné. .	10,84 —	10,78 —
Silicium libre . . .	5,30 —	5,30 —
	<hr/>	<hr/>
TOTAL. . . .	99,94	100,28

Ici encore, en effectuant la somme du cuivre et du silicium combiné et en rapportant à 100 les chiffres obtenus, on trouve une proportion de silicium combiné égale à 11,45 pour l'essai I et à 11,34 pour l'essai II. Ces chiffres cadrent suffisamment avec ceux qui correspondent à la formule du corps Cu^4Si .

INFLUENCE DE L'ANTIMOINE. — Les poids respectifs des matières premières engagées dans la réaction sont les suivantes : cuivre, 81 grammes; silicium cristallisé, 28,50 grammes; antimoine, 200 grammes. Ces diverses substances, la troisième en fragments, les deux premières en poudre grossière, sont mélangées et chauffées comme dans les opérations précédentes.

Après refroidissement, on trouve dans la nacelle un culot formé d'un seul bloc dans lequel les différentes substances qui le constituent paraissent disséminées d'une façon régulière. Du côté de la sortie du tube, des grains d'antimoine se sont déposés.

Dans le cas de ce métal, il n'est pas possible de séparer mécaniquement les différentes substances qui concourent à la constitution du culot. L'acide chlorhydrique, agissant à l'ébullition sur une certaine quantité de l'alliage grossièrement pulvérisé, ne produit pas d'action sensible non plus, d'où la séparation des différents constituants paraît difficile en cette occurrence.

Vu la difficulté d'écarter l'antimoine sans altérer le siliciure de cuivre, le lingot est soumis tel quel à l'analyse, ce qui fixera néanmoins sur les proportions relatives de cuivre et de silicium combinés. Une attaque énergique de deux échantillons d'environ 1 gramme chacun est effectuée par l'eau régale, pendant une demi-journée, dans des fioles d'Erlemmeyer. L'action terminée, les produits respectifs

chacun est effectuée par l'eau régale, pendant une demi-journée, dans des fioles d'Erlemmeyer. L'action terminée, les produits respectifs transvasés dans deux capsules sont évaporés à siccité et insolubilisés. La reprise est faite par l'acide chlorhydrique; après filtration, on a sur le filtre la silice et le silicium en excès et, dans la liqueur, le cuivre et l'antimoine à l'état de chlorures. Une ébullition prolongée de leur solution étendue, additionnée de carbonate de soude en excès, suivie d'une forte acidulation par l'acide azotique après repos prolongé, sépare le cuivre à l'état de sel en solution et l'antimoine à l'état de composé oxygéné insoluble que l'on pèse. Le cuivre, transformé en sulfate, est dosé par électrolyse.

Nous trouvons :

	I	II
	—	—
Cuivre	35,80 p. 100	36,00
Silicium combiné . . .	3,60 —	4,10
Silicium libre	4,20 —	4,20
Antimoine.	56,50 —	56,17
TOTAL	100,10 —	100,47

Ici encore, en totalisant le cuivre et le silicium combiné et en rapportant à 100 la proportion de ce dernier, on trouve pour l'échantillon I le chiffre 9,13, et pour le II, le chiffre 10,22.

CONCLUSIONS. — 1° En présence du plomb, du bismuth ou de l'antimoine, le silicium en excès réagit sur le cuivre seul pour donner naissance à un siliciure de cuivre;

2° Ce siliciure n'est pas distribué de la même façon dans chacun des trois métaux : la majeure partie surnage, soit le plomb, soit le bismuth; il paraît uniformément réparti au sein de l'antimoine;

3° Les chiffres établissant la limite de siliciuration du cuivre y sont encore voisins de 10 p. 100; cela montre que, même en présence de ces éléments, c'est toujours le corps Cu^4Si dont on enregistre la formation;

4° Enfin, les résultats précédents nous fournissent quelques renseignements sur le degré de solubilité du siliciure de cuivre dans le plomb, le bismuth et l'antimoine.

M. Manville commence une série de conférences sur la théorie électronique de la matière :

**1^{re} Partie : Décharge à travers les liquides. Ions électrolytiques; charge électrique des ions.
Vitesse des ions.**

Séance du 16 mai 1907.

PRÉSIDENCE DE M. CHADU

M. l'abbé Dubaquié et M. Chateau, pharmacien militaire, sont élus membres titulaires de la Société.

**Sur deux passages du calcul différentiel
et intégral d'A. de Morgan ⁽¹⁾;**

Par M. H. PADÉ.

I. LA NOTION DE COUPURE DANS LA DÉFINITION DES NOMBRES IRRATIONNELS. — Dans son *Introduction à la théorie des fonctions d'une variable*, M. J. Tannery s'exprime ainsi: « ... J'ai débuté par l'introduction des nombres irrationnels. J'ai développé une indication » donnée par M. Joseph Bertrand, dans son excellent *Traité d'arithmétique* et qui consiste à définir un nombre irrationnel en disant quels » sont tous les nombres rationnels qui sont plus petits et tous ceux » qui sont plus grands que lui; c'est de cette façon que les nombres » irrationnels s'introduisent le plus naturellement quand on traite de » la mesure des grandeurs incommensurables avec l'unité. » (Préface, p. ix, 1^{re} édition, 1886.) Ce mode de définition des nombres irrationnels, désigné aujourd'hui sous le nom de *méthode de la coupure*,

(¹) Ces remarques ont été communiquées, en janvier 1905, à M. Molk.

a réalisé un grand progrès en arithmétique et est adopté maintenant dans les meilleurs ouvrages.

Cette notion de la coupure semble devoir être attribuée à A. de Morgan, qui l'a donnée dans son ouvrage *The differential and integral Calculus* (Londres, 1836-1842).

De Morgan considère (p. 320 et 321) deux fonctions, $\varphi(x)$ et $\psi(x)$, qui tendent vers zéro, quand x tend vers a . Il peut arriver que, quel que soit e , le rapport

$$\frac{\varphi(x)}{[\psi(x)]^e}$$

ait zéro pour limite, quand x tend vers a ; exemple : $\frac{\varepsilon^{-\frac{1}{x}}}{x^e}$ pour $x = 0$.

Il peut se faire aussi qu'il y ait une *valeur critique* de e telle que, pour toute valeur de e supérieure à cette valeur critique, $\frac{\varphi(x)}{[\psi(x)]^e}$ soit infini pour $x = a$, et que, pour toute valeur de e inférieure à la valeur critique, $\frac{\varphi(x)}{[\psi(x)]^e}$ soit nul pour $x = a$; et quand e a la valeur critique,

$\frac{\varphi(x)}{[\psi(x)]^e}$ peut, pour $x = a$, être soit nul, soit fini, soit infini. Par exemple, suivant que e est inférieur, égal ou supérieur à 1, $\frac{\log x}{(x-1)^e}$ est, pour $x = 1$, égal à 0, à 1 ou à l'infini; suivant que e est inférieur, égal ou supérieur à 0, $\frac{x^{-1}}{(\varepsilon^{-x})^e}$ est, pour $x = \infty$, égal à 0, à 0 ou à l'infini.

La *valeur critique* d'A. de Morgan est donc un nombre plus petit que les nombres e tels que le rapport $\frac{\varphi(x)}{[\psi(x)]^e}$ grandisse indéfiniment, quand x tend vers a , et plus grand que les nombres e tels que le rapport tende vers zéro, quand x tend vers a . Elle est ainsi définie par une coupure de l'ensemble des nombres.

Ce qui ajoute à l'intérêt de cette remarque, c'est qu'il n'y a aucun doute que Joseph Bertrand n'ait eu une très exacte connaissance de ce passage de l'ouvrage d'A. de Morgan. Ce passage se rapporte, en effet, justement à la formation des échelles de séries de plus en plus convergentes ou de moins en moins divergentes qu'il signale expressément dans son célèbre Mémoire sur les séries, paru dans le *Journal de Liouville* (VII, 1842, p. 36).

II. Une seconde notion extrêmement intéressante, qui se rencontre aussi dans le même ouvrage d'A. de Morgan, est celle de la convergence ou de la divergence plus ou moins accentuée d'une série.

De Morgan dit (p. 234), de deux séries $P_1 + P_2 + \dots$, $Q_1 + Q_2 + \dots$, qu'elles sont *comparables*, lorsque le rapport $\frac{P_n}{Q_n}$ tend, quand n grandit indéfiniment, vers une limite finie et différente de zéro; et, dans le cas où ceci n'a pas lieu, qu'elles sont *incomparables*.

Lorsque $\frac{P_n}{Q_n}$ grandit indéfiniment avec n , il dit que la série (P) est *incomparablement plus élevée* que la série (Q); si le rapport tend vers zéro, la série (P) est *incomparablement plus basse* (incomparably higher, lower) que la série (Q).

On ne manquera pas de rapprocher ces définitions si naturelles et si précises de celles adoptées bien plus tard par Cesàro, M. Pringsheim, etc.

Sur la siliciuration de l'argent et du cuivre;

Par M. EM. VIGOUROUX.

Antérieurement⁽¹⁾ l'auteur du présent Mémoire a publié les résultats de quelques-unes de ses recherches susceptibles de faire connaître les conditions dans lesquelles s'effectue la siliciuration des métaux sous l'action du chlorure de silicium. Aujourd'hui seront exposés les résultats obtenus en opérant sur l'argent et le cuivre.

CAS DE L'ARGENT. — Ce métal est utilisé à l'état de poudre assez fine et provient de l'action de l'aluminium sur le chlorure d'argent, action qui fournit un mode de préparation simple et rapide, conformément aux indications fournies ici même⁽²⁾. Le chlorure de silicium chimiquement pur résulte de l'action du chlore sur le silicium cristallisé

(1) E. VIGOUROUX, Sur un nouveau mode de préparation d'un siliciure de cobalt (*Procès-verbaux*, 22 février 1906); d'un siliciure de nickel (*Id.*, 10 janvier 1907); d'un siliciure de chrome (*Id.*, 10 janvier 1907).

(2) E. VIGOUROUX, Sur le cuivre et l'argent; variante dans leur préparation (*Procès-verbaux*, 8 février 1906).

purifié. Par distillation fractionnée, après digestion avec de l'aluminium en poudre, il a pu être débarrassé des dernières particules de chlorure ferrique qu'il contenait et de très petites quantités de chlore libre.

Le métal en poudre est contenu dans une nacelle en porcelaine que l'on place à l'intérieur d'un tube de même substance chauffé par un four Mermet. Dans son orifice d'entrée s'engage une cornue tubulée à l'intérieur de laquelle pénètrent, à l'aide d'un bouchon, un tube à brome et un tube à gaz, ce dernier étant en communication avec une source d'hydrogène pur et sec. A son extrémité de sortie est relié un récipient sphérique en verre exposé à l'air, suivi d'un tube condenseur en verre autour duquel circule de l'eau froide, puis de deux flacons entourés de glace, ces deux derniers ne communiquant avec l'atmosphère que par l'intermédiaire d'une colonne desséchante au chlorure de calcium.

Dans une *première action*, 30 grammes d'argent sont mis en attaque dans la vapeur de chlorure de silicium, l'air contenu dans l'ensemble de l'appareil ayant été balayé par un courant d'hydrogène et le tube se trouvant porté à une température au moins égale au point d'ébullition de ce chlorure. On laisse la température s'élever peu à peu pendant trois heures environ, tout en évitant que le métal ne passe à l'état liquide. Ce n'est qu'au bout de ce laps de temps qu'on donne tout le gaz de façon à amener le culot à fusion. Finalement, on laisse refroidir dans la vapeur du chlorure de silicium et, dès le refroidissement complet, on balaie ce dernier à l'aide d'un courant rapide d'hydrogène pur et sec.

On trouve, dans la nacelle, un lingot parfaitement fondu recouvert d'une couche de chlorure d'argent que l'on détache à l'aide de l'ammoniaque, son poids est de 27 gr. 5; d'où perte de 2 gr. 5 soit de 8,33 p. 100.

Dans une *seconde action*, 26 gr. 5 sont prélevés sur le lingot précédent, fragmenté, puis soumis à une nouvelle attaque pendant un temps à peu près égal. Après refroidissement, on trouve un produit également fondu pesant 26 grammes, mais non recouvert de chlorure d'argent d'une façon appréciable. Il est vraisemblable que, dès le début de la chauffe, le métal avait rapidement atteint son point de fusion par suite d'une trop forte élévation de température et le chlorure de silicium ne pouvait guère glisser à la surface de ce liquide.


Mais les expériences rapportées par Percy⁽¹⁾ et surtout les beaux résultats de H. Moissan d'abord, de Moissan et Siemens⁽²⁾ ensuite, ayant péremptoirement démontré l'absence de combinaison entre le silicium et l'argent, il n'y avait pas lieu d'insister.

Nos *analyses* sont, du reste, conformes à ces résultats. Nous avons pris 0 gr. 4936 du lingot provenant de la première action et les avons attaqués par l'acide azotique étendu : tout se dissolvait sans laisser de résidu appréciable. Après insolubilisation et reprise par le même liquide étendu, le peu qui restait dans la capsule, transvasé dans un creuset et pesé, n'augmentait le poids de ce dernier que d'une quantité négligeable. Quant à la liqueur azotique, précipitée par l'acide chlorhydrique, elle révélait dans le lingot 99,60 p. 100 d'argent et la liqueur filtrée, provenant de la précipitation du chlorure, ne décelait aucun résidu insoluble dans les acides, après évaporation à siccité en présence de l'acide chlorhydrique.

L'analyse d'un fragment du lingot résultant de la seconde action conduisait aux mêmes résultats.

Enfin la majeure partie du lingot résultant du double passage du chlorure de silicium, soit 20 grammes, était attaquée par l'acide azotique ; après séparation de l'argent à l'état de chlorure, évaporation et insolubilisation de la totalité de la liqueur, on obtenait un très faible résidu auquel l'acide fluorhydrique n'enlevait que 0 gr. 0026. Ce dernier compté comme silicium combiné n'en représentait que 0,006 p. 100, dans cet argent, et encore ce chiffre comprendrait le poids de la silice provenant des cendres du filtre.

Le tétrachlorure de silicium, qui a subi l'action de ce métal, ne passe pas en totalité autour de 60° ; la distillation se ralentit un moment pour reprendre quelques instants vers 90° et c'est surtout entre 120 et 130° qu'elle redevient active ; elle ne cesse finalement qu'au-dessus de cette température. Or le point d'ébullition de l'hexachlorure est voisin de 146°. La formation de ce dernier est expliquée par la formule suivante :



réaction analogue à celle indiquée par Friedel et Ladenburg⁽³⁾

(¹) PERCY, *Silver and Gold*, t. I, p. 131.

(²) H. MOISSAN et SIEMENS, *C. R.*, t. CXXXVIII, p. 657 et 1299.

(³) FRIEDEL et LADENBURG, *C. R.*, t. LXVIII, p. 922, 1869.

dans l'action de l'argent à 300° sur le tétraiodure du même corps.

En résumé, on peut dire que le chlorure de silicium ne forme pas de siliciure d'argent lorsqu'il passe sur ce métal porté à des températures croissantes et susceptibles d'atteindre son point de fusion⁽¹⁾.

CAS DU CUIVRE. — Dans une *première série d'expériences* les vapeurs de chlorure de silicium ont été dirigées sur 100 grammes de cuivre chauffé à l'aide d'un four susceptible de donner 1200°, dans une nacelle en porcelaine contenue dans un tube de même nature. Au bout de plusieurs heures de chauffe on obtenait, outre le chlorure cuivreux, un lingot fondu, assez malléable, à surface sillonnée de nombreuses stries, qui ne pesait plus guère que 80 grammes. La même action par le chlorure de silicium, répétée un certain nombre de fois sur le même alliage déjà traité et préalablement concassé, ne lui faisait perdre que très peu de matière, et lorsque, après deux derniers passages, le poids du culot restait sensiblement constant, on mettait fin aux opérations. Le cuivre silicié conservait sa malléabilité, son aspect rougeâtre, s'attaquait aisément par l'acide azotique même étendu et par l'eau régale, mais bien difficilement par les autres acides, l'acide fluorhydrique compris, ainsi que par les liqueurs alcalines. Le dosage de ce corps a fourni les chiffres donnés par I et II, le cuivre étant déterminé par électrolyse.

Une *seconde série d'expériences* effectuée au four Mermet, dans les mêmes conditions que pour l'argent, a amené un produit comparable au précédent dont la composition, déterminée comme dans le premier cas, est indiquée par III et IV.

Une *troisième série d'expériences* a été tentée au four Mermet, les produits précédents renfermant des traces de fer provenant du cuivre utilisé auquel nous avons substitué un métal préparé par nous. Nous avons obtenu, en insolubilisant en présence de l'acide chlorhydrique et en dosant encore le cuivre par électrolyse, les résultats V et VI.

⁽¹⁾ En opérant sur de l'argent vierge, fourni par le commerce, nous avons obtenu même vers 1200° un résidu non fondu très chargé en chlorure d'argent dans lequel se trouvaient de nombreuses particules de carbone. C'était la présence de ce dernier qui maintenait le métal à l'état de division, facilitait les contacts et partant l'action des deux corps réagissants. Le carbone pouvait être le résultat de la préparation de l'argent à l'aide de substances organiques.

RÉSULTATS

	I	II	III	IV	V	VI
	—	—	—	—	—	—
Cuivre p. 100.	97,04	96,80	96,80	96,72	97,45	97,40
Silicium combiné p. 100.	2,37	2,33	2,34	2,39	2,40	2,48
	<u>99,41</u>	<u>99,13</u>	<u>99,14</u>	<u>99,11</u>	<u>99,85</u>	<u>99,88</u>

Si l'on considère : 1° que, dans le cas où dans nos expériences le métal a absorbé du silicium à l'état combiné (cas du fer, nickel, chrome, etc.), la limite atteinte par sa siliciuration correspondait toujours à la formule d'un composé défini ; 2° que l'alliage cuivre-silicium considéré comme saturé est susceptible de renfermer un peu de cuivre libre, c'est-à-dire de donner un chiffre de silicium combiné inférieur à la limite vraie de siliciuration et cela en raison de ce que, dès que la quantité de silicium combiné atteint la proportion correspondante à l'eutectique cuivre et siliciure présumé l'alliage passe à l'état liquide et la surface de contact se trouve considérablement réduite, le chlorure siliciurant ne faisant que glisser sur la nappe fluide ; 3° que malgré cette cause d'erreur mettant le silicium en défaut, les chiffres indiquant la quantité maxima de silicium réellement entrée en combinaison dans ces circonstances ne sont guère inférieurs à 2,7 p. 100 ; nous admettons que la limite de siliciuration du cuivre par le chlorure de silicium en excès tend vers la teneur centésimale 2,7, chiffre qui correspond au corps Cu^{14}Si . Telle est la formule que nous proposons comme limite inférieure de siliciuration du cuivre.

M. Manville continue l'exposé des origines de la théorie électronique de la matière :

2° Partie : Décharge à travers les gaz.
Ions cathodiques. Ions de Lénard. Conséquences
de leur existence sur l'état gazeux.

Séance du 30 mai 1907.

PRÉSIDENCE DE M. BARTHE

**Le fluor dans les coquilles des mollusques
non marins;**

Par M. le Dr P. CARLES.

Il y a quelques mois ⁽¹⁾, nous avons démontré que l'eau de mer contenait 0 gr. 012 de fluorures par litre et qu'on en trouvait dix fois plus dans les écailles d'huîtres et de moules prises dans cette eau.

Il nous a paru qu'il serait intéressant de savoir, à la suite, si les coquilles des mollusques d'eau douce courante, d'eau douce des marais et des mollusques vivant à l'air libre n'en contiendraient pas aussi.

Comme type des premières, nous avons pris les tests des moules du Tarn; des secondes, ceux des lymnées et planorbes des marais de Bordeaux; et enfin des derniers, ceux des escargots des vignes de Gironde et de Bourgogne (*Helix aspersa et pomatia*).

Le traitement de toutes ces coquilles est plus délicat que celui des mêmes organes des mollusques marins. Les escargots, en effet, libèrent sous l'action des acides une matière visqueuse qui gêne les filtrations et les dépôts. Les lymnées et planorbes s'enroulent si profondément dans leur cor de chasse, qu'on ne peut les en retirer. Les moules ont leur coquille si étroitement recouverte d'une pellicule noire silico-ferrugineuse qu'on ne peut en dégager les grains de sable microscopiques qui sont au-dessous dans les rainures.

Mais on a eu raison de toutes ces causes de gêne, en faisant bouillir les coquilles dans de l'eau de lessive caustique. Tout ce qui était de nature animale tendre a seul été dissous, tandis que le reste a été détruit par la calcination. Le calcaire seul a été respecté.

Le traitement subi à la suite par cette matière minérale est le même que celui qui a été décrit à propos des écailles d'huîtres et de moules.

(¹) *Compt. rend. Acad. Sc.*, t. CXLIV, p. 437, 1907.

Finalement, le fluor s'est révélé dans les trois cas, avec les proportions suivantes :

	FLUORURES par 100 grammes
Moules du Tarn.	3 à 4 milligr.
Lymnées et planorbes.	2 à 3 —
Escargots de Gironde et de Bourgogne.	2 à 3 —

Ces résultats nous montrent :

- 1° Que les fluorures terreux font partie des écailles des mollusques non marins, mais en quantité notablement moindre que dans les marins ;
- 2° Que le fluor est répandu plus qu'on ne le suppose dans les eaux de rivière et de marais ;
- 3° Qu'il existe aussi dans les feuilles dont se nourrissent les escargots ;
- 4° Que les fluorures terreux paraissent être un élément général de formation et de consolidation du squelette de tous les animaux qui en sont pourvus.

Étude des bronzes à base de nickel

IV

Par M. EMILE VIGOUROUX

Dans des communications antérieures (1), nous avons fait connaître un certain nombre de résultats de nos recherches touchant l'action réciproque du nickel et de l'étain. Cet exposé résumera ce qui a trait aux alliages des deux mêmes corps pour des teneurs comprises entre 40 et 57 p. 100 d'étain.

Un *premier essai* obtenu en chauffant ces deux métaux purs, dans les mêmes conditions de température et de milieu indiquées précédemment, a fourni un culot titrant :

Nickel	53,76 p. 100
Étain.	45,34 —
TOTAL.	99,10

(1) Voir dans ces *Procès-Verbaux* les deux articles du 7 mars 1907 et celui du 25 avril.

Ce culot, bien fondu, présente des reflets légèrement bronzés, dus vraisemblablement à la présence du composé déjà décrit Ni^3Sn . A l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique à 25 p. 100, après avoir broyé le lingot au mortier d'Abich, on attaque ce culot assez aisément; l'action est vive en commençant et dans la liqueur il passe de l'étain et une grande quantité de nickel.

Le résidu ainsi abandonné, après nouvelle porphyrisation, est encore repris par la solution chlorhydrique à 25 p. 100 à l'état bouillant. L'analyse de la substance non attaquée révèle les chiffres suivants :

	I	II
Nickel p. 100	52,15	53,05
Étain —	48,77	47,89
TOTAUX.	100,92	100,94

Enfin, trois attaques successives, opérées dans les mêmes conditions et avec de l'acide chlorhydrique au même degré de concentration, fournissent respectivement les chiffres I après la première, II après la seconde, III après la troisième.

	I	II	III
Nickel p. 100.	45,80	44,30	42,73
Étain —	55,68	55,70 (diff.)	57,20
TOTAUX.	101,48	100,00	99,93

Après la troisième attaque, on n'avait qu'un résidu de 0,195 grammes.

Un *deuxième essai*, préparé avec du nickel en poudre et de l'étain grenailé, a fourni un culot titrant :

Nickel	47,96 p. 100
Étain.	52,71 —
TOTAL.	100,67

Ce lingot est sonore, cassant, très dur, difficilement rayé par l'acier, se brise en tombant sur le ciment et ne présente pas de cristaux facilement discernables; sa nuance est très légèrement bronzée, peut-être encore en raison de la présence de Ni^3Sn .

Les attaques à l'aide de l'acide azotique ne modifient pas sensiblement sa composition. Sous l'action de l'acide chlorhydrique en solution aqueuse en renfermant 5 p. 100, le résidu contient, après une première attaque, les résultats fournis par I; après une seconde, très prolongée, qui ne laisse que très peu de matière, ceux exprimés par II.

	I	II
Nickel p. 100.	44,78	42,55
Étain —	56,00	57,28
TOTAUX.	100,78	99,83

Un *troisième essai* est également tenté au four Schloësing avec des proportions telles de nickel et d'étain que le culot fondu renferme environ 56 p. 100 de ce dernier.

La cassure de cet alliage est métallique, brillante, grenue; privée du reflet bronzé remarqué dans les deux culots précédents. Lingot très fragile, cassant entre les doigts et tombant en poussière lorsqu'on fait agir le mortier d'Abich.

Une attaque, effectuée encore à l'aide d'une solution aqueuse renfermant 25 p. 100 d'acide chlorhydrique du commerce, attaque assez vive, abandonne un résidu encore très faible dont la teneur en nickel et en étain est très voisine de celle des corps isolés précédemment.

Bref, pour des teneurs en étain comprises entre 40 et 57 p. 100, les bronzes à base de nickel nous ont abandonné, par des traitements appropriés, des corps de composition identique répondant assez exactement à la formule Ni^3Sn^2 qui exige :

Nickel	42,35 p. 100
Étain.	57,65 —
TOTAL.	100,00

Nous nous proposons de vérifier, par des essais physiques, si cette formule répond réellement à celle d'un composé défini.

Rôle de l'anatomie comparée dans la distinction des espèces de Cistes;

Par M. GARD.

Voir *Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences*,
t. CXLIV, 3 juin 1907.

Sur une formule remarquable du calcul intégral;

Par M. H. PADÉ.

Cette formule, qui a été donnée par Laguerre (*Journal de Liouville*, 1885), est la suivante :

$$e^x x^{-\alpha} \int_x^\infty e^{-z} z^{\alpha-1} dz = \frac{\varphi_n}{f_n} + \frac{(1-\alpha) \dots (n-\alpha)}{x^{n+1} f_n} \int_0^\infty \frac{e^{-t} t^\alpha dt}{\left(1 + \frac{t}{x}\right)^{n+1-\alpha}};$$

n y désigne un nombre entier positif, x un nombre réel positif, φ_n et f_n des polynômes en x de degrés respectivement égaux à $n-1$ et n ; les variables d'intégration z et t sont supposées réelles.

Son importance vient de ce qu'elle fournit l'exemple d'une fonction, celle qui est dans le premier membre, à laquelle correspond, d'une part, un développement en série entière en $\frac{1}{x}$ qui est divergent, et, d'autre part, un développement en fraction continue canonique, dont la $n^{\text{ième}}$ réduite est $\frac{\varphi_n}{f_n}$, qui est convergent.

Cette formule peut être établie par une méthode infiniment plus directe et plus simple que celle suivie par Laguerre, et déjà indiquée par M. Padé, dans son Mémoire pour le grand prix des sciences mathématiques en 1904, et dans une note des *Comptes rendus* du 11 décembre 1905. On en peut ensuite déduire tous les résultats relatifs à la convergence, l'équation aux différences finies ou infiniment petites auxquelles satisfait f_n , etc.

M. Ch. Pérez présente à la Société le résumé d'une brochure de M. le Dr Ballion, ayant pour titre :

Recherches sur les cercles mycéliens.

M. Manville continue l'exposé des origines de la théorie électronique de la matière :

**3^e Partie : l'ionisation des gaz et les expériences
qui ont conduit à la notion d'électron.**

Séance du 13 juin 1907.

PRÉSIDENTE DE M. BOULOUGH

**La lumière ultraviolette rend-elle
les gaz conducteurs ?**

Par M^{me} BAUDEUF.

Dans la dernière séance de la Société, M. Manville a exposé avec beaucoup de talent les diverses hypothèses au moyen desquelles les ionistes cherchent à expliquer le phénomène de l'ionisation des gaz par diverses causes au nombre desquelles a été rangée la lumière ultraviolette.

C'est là un sujet nouveau et délicat, et je crois être l'interprète de tous ceux qui l'ont entendu en disant tout de suite combien il s'acquitte brillamment de cette tâche ingrate, et combien doit être grand l'effort qu'il a dû faire pour y arriver.

Pour avoir une idée exacte de cet effort, il faut en effet s'être trouvé en présence de l'amas considérable des mémoires qui ont été publiés sur ce sujet; l'assimilation de tant d'expériences diverses et souvent contradictoires constitue un labeur effrayant; et pour arriver à grouper même un petit nombre de ces faits de manière à en faire un ensemble cohérent, ou seulement compréhensible, il fallait certainement beaucoup de dextérité.

M. Manville a donc été certainement obligé de choisir et d'éliminer tout ce qui pouvait nuire à l'idée générale qu'il voulait mettre en lumière.

Les expériences que l'on peut invoquer en faveur de l'ionisation des gaz par les rayons ultraviolets ne sont pas à l'abri de toute critique, et, en les étudiant avec un peu de soin, on pourrait y découvrir d'importantes causes d'erreurs.

Mais une telle discussion serait trop longue ici, et nous allons nous contenter de montrer que des mémoires mêmes de M. Lenard il résulte que ce point n'est pas encore élucidé.

Le mémoire publié dans les *Ann. der Physik und Chemie* (t. I, p. 486, 1900) est consacré surtout à l'expérience sur laquelle notre attention a été appelée dans la dernière séance : un courant d'air passe dans un cylindre de verre où il est soumis à l'action d'étincelles de 3 millimètres éclatant entre deux pointes d'aluminium, action qui s'exerce au travers d'une fenêtre de quartz, puis ce courant d'air passe entre deux cylindres de laiton coaxiaux dont l'extérieur est au sol, l'intérieur chargé et relié à un électroscope.

Dans ces conditions M. Lenard observe une diminution notable de la charge de l'électroscope, quel que soit le sens de cette charge.

Mais il y a un point qui paraît digne de remarque : en lisant ce mémoire intitulé pourtant « Effets produits par la lumière ultraviolette sur les corps gazeux », on est frappé de ce que l'auteur paraît éviter le mot *lumière ultraviolette* ; dans la suite du mémoire il emploie constamment le mot plus vague *wirkung* après avoir spécifié qu'il emploie comme source l'étincelle entre fils de zinc ou d'aluminium, produite par une bobine de grande dimension et condensée par des bouteilles de Leyde.

Et M. Lenard, loin d'affirmer que le phénomène est dû à la lumière ultraviolette, dit textuellement page 488, en remarquant que l'étincelle doit éclater à moins de 2 centimètres de la fenêtre de quartz : « Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'une action de la *lumière ultraviolette ordinaire*. »

Donc, même d'après M. Lenard, l'action qu'il étudie dans ses expériences sur l'ionisation de l'air n'est pas l'action de l'ultraviolet ordinaire.

Cette idée se trouve encore précisée dans le mémoire suivant, (*Ann. der Physik*, t. II, p. 359, mai 1900). Ce mémoire, intitulé : « Rayons

cathodiques produits par la lumière ultraviolette, » commence par cette phrase : « L'effet de la lumière ultraviolette, d'expulser l'électricité *négative* des corps, est maintenant connu dans beaucoup de ses particularités. »

Plus loin, page 360, il admet le *caractère rigoureusement unipolaire de l'effet photoélectrique* mis, dit-il, hors de doute par MM. Elster et Geitel. »

C'est par le terme « *Lichtelektrischen Wirkung* » qu'il désigne toujours l'effet bien connu de déperdition négative.

M. Lenard admet donc que l'effet de la lumière ultraviolette est rigoureusement unipolaire. Mais on ne peut pas dire alors que cet effet soit de rendre l'air *conducteur*, car nous ne connaissons pas, jusqu'ici, de *conducteur* ne conduisant qu'une seule espèce d'électricité.

De plus, dans le mémoire précédent, M. Lenard avait montré que l'*effet* qu'il étudie décharge aussi bien les conducteurs chargés positivement, que ceux qui ont une charge négative ; or, ici, il admet sans difficulté que les rayons ultraviolets déchargent seulement ces derniers.

On ne peut accorder ces deux opinions qu'en remarquant que l'*effet* que M. Lenard étudie dans son mémoire de janvier, n'est pas, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, un effet de la lumière ultraviolette.

Il dit encore page 362, en relatant une expérience de déperdition négative faite dans le vide extrême : « Cette expérience me semble démontrer que l'effet photoélectrique n'a rien à voir avec l'air. »

Si l'effet de la lumière ultraviolette sur les métaux n'a rien à voir avec l'air, il semble difficile d'admettre que l'ionisation de l'air puisse expliquer ce phénomène.

Enfin dans un mémoire plus récent (*Ann. der Physik.*, t. III, 1900), M. Lenard reprend ses expériences relatives à l'effet des étincelles d'induction sur la décharge des conducteurs, effet qui consiste en une décharge de ces conducteurs quel que soit le sens de leur électrisation et l'état de leur surface (on sait que l'état de la surface est au contraire très important dans le cas de l'action des rayons ultraviolets).

M. Lenard est si loin de comparer l'action qu'il étudie à ce qu'il appelle *Lichtelektrischen Wirkung* qu'il explique (page 302) que l'on doit prendre des précautions pour éviter les perturbations produites par la lumière ultraviolette, et fait remarquer qu'il recouvrait la fenêtre de quartz et les conducteurs d'une mousseline mouillée d'eau de savon qui arrête les rayons ultraviolets.

Contre l'opinion qui attribue à la lumière ultraviolette le pouvoir de rendre les gaz conducteurs, on peut encore citer les nombreux travaux de deux éminents physiciens MM. Elster et Geitel qui ont réfuté victorieusement M. Bichat lorsqu'il avait annoncé que la lumière ultraviolette déchargeait aussi les corps électrisés positivement.

Enfin, pour avoir une idée de l'opinion de MM. Rutherford et Zeleny, il suffit de citer un passage de chacun d'eux.

M. Zeleny dans un mémoire publié en juin 1901 dans la *Physical Review* (t. XII, p. 321), et qui a pour titre : « Influence de la température sur l'effet photoélectrique », constate une fois de plus que, même aux températures élevées, « l'action de la lumière ultraviolette est sans effet appréciable sur les conducteurs chargés positivement » et ajoute textuellement, à la fin de ce mémoire (p. 339) comme conclusion que « les effets qu'il a observés sont dus à des altérations se produisant à la surface du métal, et non dans le gaz entre les électrodes. »

D'autre part, M. Rutherford, dans un mémoire publié en 1898 dans les *Proceedings de Cambridge* (p. 401) est absolument d'accord avec Henry qui a cherché à mettre en évidence l'ionisation des gaz par la lumière ultraviolette et n'a obtenu que des résultats négatifs, même avec les vapeurs d'iode et d'iodure de méthyle, vapeurs qui deviennent très conductrices sous l'action des rayons de Röntgen.

En 1898, deux ans avant M. Lénard, M. Rutherford avait observé comme lui que si l'on fait passer sur un conducteur éclairé et chargé négativement un courant d'air animé d'une assez grande vitesse, cet air prend une charge négative, mais il ne paraît pas confondre ce phénomène d'électrisation de l'air avec la conductibilité.

Il dit, en effet, dans le même mémoire : « Pour obtenir la décharge » l'aide des rayons ultraviolets, la lumière doit tomber sur une surface » chargée négativement ; on n'obtient aucune décharge si l'on fait » arriver le faisceau de lumière entre les deux plateaux sans qu'il » tombe sur aucun d'eux. Sous ce rapport l'action de la lumière ultraviolette est TRÈS DIFFÉRENTE de celle des rayons de Röntgen ou de » ceux de l'uranium... ».

On ne peut pas dire plus nettement que l'action de la lumière ultraviolette ne doit pas être confondue avec celle des corps qui rendent l'air conducteur.

Je sais bien que M. Manville n'ignore pas toutes ces opinions, et que s'il ne les a pas citées, c'est que pour exposer tout ce qui a été

fait sur le sujet seul de l'action de la lumière ultraviolette, il lui eût fallu une année entière s'il eût résolu d'entrer dans la critique des expériences.

Mais je tenais à rectifier l'idée qui paraissait se dégager de sa dernière conférence et d'après laquelle on aurait pu croire, tant elle était magistralement faite, que le sujet était clos sur ce point et la science fixée.

Je me fais presque un scrupule de rejeter dans le doute ceux d'entre vous qui avaient emporté de notre dernière réunion une idée qui, nettement et clairement exposée, pouvait paraître nette et claire. Mais malheureusement les schémas simples et commodes sont rarement d'un long usage, et une notion physique n'est en général simple que si elle est fausse, ou tout au moins insuffisante.

Il est cependant consolant de penser qu'il reste quelque chose à faire dans le domaine des ions et que les chercheurs ne peuvent pas encore se plaindre d'être venus trop tard dans un monde trop vieux.

Sur la solubilité réciproque de l'essence de térébenthine et de l'alcool aqueux.

III. Courbes de séparation;

Par MM. M. VÈZES et R. BRÉDON.

I. Dans des notes antérieures⁽¹⁾, nous avons étudié les phénomènes de séparation en deux couches auxquels donnent lieu les mélanges d'essence de térébenthine et d'alcool aqueux, en nous bornant au cas où l'alcool aqueux titre au moins 92,5 degrés volumétriques. Cette étude nous a permis de préciser les limites de composition entre lesquelles peuvent varier ces mélanges sans risquer de se troubler par refroidissement, tant que celui-ci ne dépasse pas quelques degrés au-dessous de zéro.

La même méthode peut servir à élucider le problème inverse qui paraît également susceptible d'applications : étant donné un mélange d'essence de térébenthine et d'alcool, tels que ceux qui constituent le résidu de certaines opérations industrielles, dans quelles conditions

⁽¹⁾ *Procès-verbaux de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux*, séances du 16 juin 1904 et du 28 juin 1906.

faut-il se placer pour en récupérer les constituants par addition d'eau ?

La solution de ce problème exige, tout d'abord, l'extension de nos recherches antérieures à des mélanges plus riches en eau. Nous avons, dans ce but, étudié, par la méthode déjà décrite, trois séries nouvelles de mélanges constitués au moyen de l'essence de térébenthine landaise, triplement rectifiée, dont nous avons déjà donné⁽¹⁾ les constantes physiques, et d'alcool à bas titre. Nous nous sommes bornés à l'étude des mélanges riches en alcool aqueux, les seuls qui eussent de l'intérêt au point de vue du problème que nous nous proposons de résoudre, les seuls aussi dont les températures de séparation fussent assez basses pour pouvoir être déterminées sans danger. Voici les résultats obtenus, figurés au moyen des notations déjà indiquées⁽²⁾ :

VIII. ALCOOL à $v = 86^{\circ},4$	
$y = 0,812$	
POIDS D'ALCOOL A $86^{\circ},4$ dans l'unité de poids du mélange	TEMPÉRATURE de séparation
$z = 0,510$	$T = + 99,7 \pm 0,3$
0,669	$+ 85,3 \pm 0,3$
0,738	$+ 74,8 \pm 0,3$
0,784	$+ 64,6 \pm 0,4$
0,868	$+ 36,1 \pm 0,4$
0,924	$+ 0,9 \pm 0,4$
0,976	$- 72,3 \pm 0,7$

IX. ALCOOL à $v = 82^{\circ},8$	
$y = 0,768$	
POIDS D'ALCOOL A $82^{\circ},8$ dans l'unité de poids du mélange	TEMPÉRATURE de séparation
$z = 0,731$	$T = + 102,0 \pm 0,3$
0,816	$+ 84,4 \pm 0,6$
0,916	$+ 40,0 \pm 0,5$
0,945	$+ 11,5 \pm 0,5$
0,963	$- 14,8 \pm 0,8$

⁽¹⁾ *Loc. cit.*, 28 juin 1906.


⁽²⁾ Nous désignons par v le titre volumétrique ou degré alcoolique de l'alcool

X. ALCOOL à $v = 72^{\circ},6$	
$y = 0,654$	
POIDS D'ALCOOL A $72^{\circ},6$ dans l'unité de poids du mélange	TEMPÉRATURE de séparation
$z = 0,859$	T supérieur à $+ 130^{\circ}$
0,883	$+ 118,7 \pm 1,2$
0,928	$+ 94,5 \pm 0,5$
0,942	$+ 81,5 \pm 1,5$
0,980	$+ 22,9 \pm 0,6$
0,986	$- 2^{\circ},0 \pm 1,0$

La représentation graphique des nombres contenus dans chacun de ces tableaux fournit des courbes de séparation, analogues à celles que nous avons données antérieurement et présentant les mêmes caractères : plus l'alcool est aqueux, et plus est grande la proportion d'essence que l'on essaie d'y dissoudre (cette proportion ne dépassant pas 50 p. 100), plus il faut élever la température pour obtenir une solution homogène. Le graphique ci-contre reproduit l'ensemble de nos courbes antérieures et des courbes actuelles.

II. Les résultats ci-dessus, et le graphique qui les résume, permettent de compléter ainsi qu'il suit le tableau des isothermes de la surface de séparation des mélanges essence-alcool-eau, que nous avons antérieurement donné.

aqueux; y , le titre pondéral de cet alcool; z , le poids d'alcool aqueux contenu dans l'unité de poids du mélange; T , la température de séparation, avec l'indication de son écart par rapport aux deux températures lues t_1 , t_2 , dont elle est la moyenne.



TITRE DE L'ALCOOL AQUEUX		PROPORTION D'ALCOOL AQUEUX DANS LE MÉLANGE						
VOLUMÉTRIQUE	PONDÉRAL	Isotherme - 20°	Isotherme 0°	Isotherme + 20°	Isotherme + 40°	Isotherme + 60°	Isotherme + 80°	Isotherme + 100°
$v = 92,7$	$y = 0,893$	$z = \text{valeurs}$	Valeurs	Valeurs	très	faibles	0,009	0,014
94,2	0,914	—	—	0,001	0,002	0,003	0,025	»
95,0	0,924	très	très	0,023	0,034	»	»	»
95,7	0,934	—	—	0,024	0,035	»	»	»
96,5	0,946	faibles	faibles	»	»	»	»	»
97,3	0,958	—	0,084	»	»	»	»	»
98,0	0,968	0,090	»	»	»	»	»	»
...
98,0	0,968	0,302	»	»	»	»	»	»
97,3	0,958	0,534	0,084	»	»	»	»	»
96,5	0,946	0,650	0,508	»	»	»	»	»
95,7	0,934	0,726	0,602	0,358	0,092	»	»	»
95,0	0,924	0,794	0,710	0,580	0,258	»	»	»
94,2	0,914	0,833	0,770	0,682	0,530	0,235	0,117	»
92,7	0,893	0,882	0,835	0,764	0,675	0,475	0,235	0,125
86,4	0,812	0,948	0,924	0,897	0,861	0,801	0,700	0,508
82,8	0,768	0,965	0,955	0,938	0,916	0,880	0,831	0,745
72,6	0,654	0,988	0,986	0,981	0,971	0,958	0,942	0,917

**Sur la solubilité réciproque
de l'essence de térébenthine et de l'alcool aqueux.**

IV. Mesures réfractométriques;

Par MM. M. VÈZES et R. BRÉDON.

I. On sait que lorsqu'on connaît la courbe de séparation d'un mélange binaire, la composition des deux couches capables de coexister en équilibre à une température donnée est fournie par les ordonnées des deux points de la courbe qui correspondent à cette température. Dans le cas d'un mélange ternaire, donnant lieu, non plus à une courbe, mais à une surface de séparation, la composition de ces couches correspond à deux points de l'isotherme de cette surface relative à la température considérée; mais la position de ces deux points sur l'isotherme n'est pas connue *a priori*; elle varie d'ailleurs

avec la composition brute du mélange ternaire employé : il y a donc lieu de la déterminer dans chaque cas par la mesure d'une donnée nouvelle.

Dans ce but, nous avons déterminé l'indice de réfraction, à la température de 25° et pour la raie D, d'un certain nombre de mélanges homogènes d'essence et d'alcool aqueux, préparés synthétiquement et par conséquent de composition connue. Voici les résultats obtenus, la composition de ces mélanges étant définie au moyen des mêmes notations que plus haut.

I. ALCOOL à $v = 99^{\circ},6$ $y = 0,993$	
POIDS D'ALCOOL A $99^{\circ},6$ dans l'unité de poids du mélange	INDICE de réfraction à 25°
$z = 1,000$	$n_D = 1,3596$
0,786	1,3803
0,580	1,4026
0,480	1,4138
0,380	1,4246
0,186	1,4456
0,095	1,4573
0,023	1,4650
0,000	1,4665

II. ALCOOL à $v = 96^{\circ},7$ $y = 0,951$	
POIDS D'ALCOOL A $96^{\circ},7$ dans l'unité de poids du mélange	INDICE de réfraction à 25°
$z = 1,000$	$n_D = 1,3612$
0,957	1,3651
0,894	1,3709
0,788	1,3807
0,580	1,4020
0,384	1,4246

III. ALCOOL à $v = 94^{\circ},7$ $y = 0,921$	
POIDS D'ALCOOL A $94^{\circ},7$ dans l'unité de poids du mélange	INDICE de réfraction à 25°
$z = 1,000$	$n_D = 1,3616$
0,956	1,3653
0,895	1,3711
0,785	1,3817
0,710	1,3896
0,680	1,3922

IV. ALCOOL à $v = 90^{\circ},6$ $y = 0,861$	
POIDS D'ALCOOL A $90^{\circ},6$ dans l'unité de poids du mélange	INDICE de réfraction à 25°
$z = 1,000$	$n_D = 1,3626$
0,979	1,3644
0,958	1,3662
0,895	1,3720
0,856	1,3755

II. Construisons pour chaque valeur du titre alcoolique v , la courbe reliant l'indice n_D à la composition z du mélange. A chacun des

tableaux ci-dessus correspondra ainsi, dans le plan défini par les deux axes rectangulaires ON, OZ, une courbe; il est aisé de voir que les courbes ainsi tracées diffèrent assez peu de lignes droites, et, de plus, qu'elles sont très voisines les unes des autres. Dans les limites où ont été effectuées nos mesures, c'est-à-dire tant que le titre de l'alcool ne s'abaisse pas au-dessous de 90° volumétriques, ce titre n'influe donc qu'assez peu sur l'indice des mélanges d'essence de térébenthine et d'alcool aqueux; de sorte que l'on peut considérer, d'une façon approximative, l'indice d'un tel mélange comme ne dépendant que de sa teneur z en alcool aqueux.

Cette constatation ne doit point nous surprendre; il résulte en effet des recherches de Van der Willigen (*Arch. du Musée Teyler*, t. II, p. 199; 1869) que l'indice de réfraction des mélanges d'eau et d'alcool varie peu lorsque leur teneur en eau varie de 0 à 40 p. 100; la courbe qui figure sa variation se trouve, dans cette région, au voisinage d'un maximum, comme le montrent les nombres suivants, relatifs à la raie D et à la température de 25° :

TITRE DE L'ALCOOL AQUEUX		INDICE DE RÉFRACTION
volumétrique	pondéral	à 25°
$v = 0,0$	$\gamma = 0,000$	$n_D = 1,3328$
46,0	0,388	1,3563
61,7	0,539	1,3605
90,9	0,868	1,3626
99,4	0,989	1,3598

On voit par ces nombres que la loi approximative que nous venons d'énoncer, comme conséquence de mesures portant sur des alcools aqueux titrant au moins 90° volumétriques, reste encore vraie lorsque le titre de l'alcool aqueux s'abaisse jusqu'à 60° environ.

Il est possible, du reste, de ne pas tenir compte de cette loi approchée, et d'utiliser tels quels les nombres contenus dans les tableaux ci-dessus. Relevons, en effet, sur les courbes tracées dans le plan NOZ les valeurs de la concentration z qui correspondent à une même valeur n_D de l'indice; avec les valeurs correspondantes v du titre alcoolique, ces nombres définiront des mélanges d'essence, d'alcool et d'eau possédant le même indice de réfraction : dans le plan défini par les deux axes rectangulaires OV, OZ, ils nous permettront de construire des

courbes symbolisant la composition des mélanges d'égal indice. D'après ce que nous venons de voir, ces courbes sont très voisines de droites parallèles à l'axe OV. Voici, en effet, les nombres définissant les lignes d'égal indice correspondant aux indices 1,3600, 1,3700, 1,3800, 1,3900, 1,4000, 1,4100 et 1,4200 :

TITRE de L'ALCOOL AQUEUX		PROPORTION D'ALCOOL AQUEUX DANS LE MÉLANGE						
Volumétrique	PONDÉRAL	INDICE 1.3600	INDICE 1.3700	INDICE 1.3800	INDICE 1.3900	INDICE 1,4000	INDICE 1.4100	INDICE 1.4200
$v = 99,6$	$y = 0,993$	$z = 0,996$	0,993	0,790	0,696	0,604	0,513	0,423
96,7	0,951	»	0,903	0,794	0,696	0,598	0,510	0,424
94,7	0,921	»	0,906	0,802	0,702	»	»	»
90,6	0,861	»	0,917	»	»	»	»	»

III. Ces courbes étant connues, il devient facile de déterminer, par la mesure de leur indice de réfraction (à 25° et pour la raie D), la composition des deux couches en équilibre formées par un mélange donné à une température donnée. Il suffit en effet de construire, dans un même graphique défini par les deux axes rectangulaires OV, OZ, l'isotherme de la surface de séparation relative à la température donnée, et les deux courbes d'égal indice correspondant aux deux indices mesurés. Les points de rencontre de ces deux courbes avec l'isotherme fourniront la composition des deux couches en question.

Donnons un exemple de ce mode de détermination. Nous mélangeons, à la température de 11°75, 47 gr. 505 d'essence de térébenthine et 36 gr. 635 d'alcool à 94°7 volumétriques. Après agitation et repos à cette température, le mélange reste divisé en deux couches : on prend des échantillons de ces deux couches, et l'on en mesure les indices n_D , après avoir laissé leur température s'élever à 25°. On trouve ainsi :

Indice à 25° de la couche supérieure. . .	1,3926
— — — inférieure . . .	1,4575

Avec la température (11°75) à laquelle les deux couches se trouvaient en équilibre au moment du prélèvement des échantillons, ces données suffisent pour déterminer la composition des 2 couches.

Dans ce but, on construira dans le plan VOZ l'isotherme de 11° 75. Cette courbe est définie par les nombres suivants, relevés sur les courbes de séparation que nous avons antérieurement publiées :

$v = 96,5$	$96,5$	$95,7$	$95,0$	$94,2$	$92,7$	$86,4$	$82,8$	$72,6$
$z = 0,006$	$0,280$	$0,487$	$0,647$	$0,722$	$0,795$	$0,909$	$0,945$	$0,985$

En outre, le point de cette courbe correspondant au maximum de v est défini par les nombres suivants, obtenus par interpolation entre les courbes de séparation relatives à $v = 96,5$ et $v = 97,3$:

$$\begin{aligned} v &= 96,8 \\ z &= 0,071 \end{aligned}$$

Construisons d'autre part, dans le même plan VOZ, la courbe d'égal indice correspondant à l'indice 1,3926 de la couche supérieure. Cette courbe, qui est sensiblement rectiligne, est définie par les nombres suivants, relevés sur les courbes tracées dans le plan NOZ comme il a été dit plus haut :

$$\begin{aligned} v &= 99,6 & 96,7 \\ z &= 0,671 & 0,673 \end{aligned}$$

Cette courbe rencontre l'isotherme de 11°, 75 au point

$$\begin{aligned} v &= 94,8 \\ z &= 0,674 \end{aligned}$$

qui définit la composition de la couche supérieure. Celle-ci est donc formée de 32,6 p. 100 d'essence et de 67,4 p. 100 d'alcool à 94°, 8 volumétriques.

Construisons de même, dans le plan VOZ, la courbe d'égal indice correspondant à l'indice 1,4575 de la couche inférieure. Celle-ci n'est définie que par le point

$$\begin{aligned} v &= 99,6 \\ z &= 0,083 \end{aligned}$$

mais nous pouvons admettre ici qu'elle est rectiligne en parallèle à l'axe OV. Elle rencontre l'isotherme de 11°, 75 au point

$$\begin{aligned} v &= 96,8 \\ z &= 0,083 \end{aligned}$$

qui définit la composition de la couche inférieure comme formée de 91,7 p. 100 d'essence et de 8,3 p. 100 d'alcool à 96°,8 volumétriques.

IV. Comme contrôle de ces résultats, et en vue de nous rendre compte du degré d'exactitude dont ce mode de détermination est susceptible, nous avons déterminé le volume et la densité de chacune des deux couches, de manière à pouvoir calculer son poids :

	COUCHE SUPÉRIEURE	COUCHE INFÉRIEURE
Volume (à 11°,75)	59,5 ^{cc}	40,5 ^{cc}
Densité (à 11°,75)(1) . . .	0,8326	0,8613
Poids	49,54 ^{gr}	34,88 ^{gr}

De ces poids se déduisent les poids d'essence, d'alcool et d'eau contenus dans chaque couche, connaissant les proportions d'alcool aqueux contenues dans chacune d'elles

$$z = 0,674 \quad \text{et } z = 0,083$$

et la teneur en alcool de cet alcool aqueux, fournie par la transformation des titres volumétriques

$$v = 94,8 \quad \text{et } v = 96,8$$

en titres pondéraux :

$$\gamma = 0,922 \quad \text{et } \gamma = 0,950$$

On trouve ainsi :

	COUCHE SUPÉRIEURE	COUCHE INFÉRIEURE
Essence.	16,15 ^{gr}	31,98 ^{gr}
Alcool	30,78	2,75
Eau	2,61	0,15
	<u>49,54</u>	<u>34,88</u>

(1) Ces densités ont été mesurées à 15°, puis ramenées par le calcul à 11°, 75, en admettant que la couche supérieure se dilate comme l'alcool aqueux à 95° (variation de densité de 0,00086 par degré), et que la couche inférieure se dilate comme l'essence (variation de densité de 0,00080 par degré) : double hypothèse que justifient, dans le cas actuel, le faible écart de ces deux coefficients de dilatation et la faible différence des températures envisagées.

quantités dont la somme doit donner la composition initiale du mélange brut (celle-ci se calcule de même au moyen des données initiales sachant que le titre volumétrique $v = 94,7$ équivaut au titre pondéral 0,921). On trouve ainsi :

	Mélange initial	Somme des 2 couches	Différence
Essence	47,505 ^{gr}	48,13 ^{gr}	+ 0,63 ^{gr}
Alcool.	33,750	33,53	— 0,22
Eau	2,885	2,76	— 0,12
	<u>84,140</u>	<u>84,42</u>	<u>+ 0,28</u>

Comme on le voit, les différences sont assez faibles pour que l'on puisse envisager la méthode ci-dessus indiquée comme donnant, au moins d'une façon approximative, la composition des deux couches en équilibre.

Rôle physiologique de la matière grasse dans les végétaux;

Par M. DUBAQUIÉ.

On a depuis longtemps signalé la présence de la matière grasse dans les végétaux supérieurs et admis qu'elle en est l'un des constituants normaux (1).

Plus récemment, on l'a dosée dans quelques végétaux inférieurs.

Mais sur le rôle physiologique de cette même matière grasse, « matière de réserve ou produit d'élimination, de dégénérescence, » nous n'avons encore que des données très incomplètes.

(1) On possède de très nombreux dosages de matière grasse relatifs aux plantes industrielles et alimentaires.

Dumas, Payen et Boussingault (*C. R.*, 1843) concluaient, à la suite d'une étude très étendue, que « la matière grasse ne se produit que dans les végétaux, où les animaux la puisent toute formée, pour l'utiliser eux-mêmes.

Müntz (1) établit que les graines, au moment de leur germination, consomment leur matière grasse, qui se présente ainsi comme matière de réserve.

Duclaux (2), trouvant jusqu'à 30 p. 100 de matière grasse dans la levure vieille, parle de dégénérescence grasseuse.

M. Laborde (3) admet que « la proportion exagérée de matière grasse (30 p. 100 dans l'*Eurotiosis Gayoni* vieilli sur milieu alcoolisé) pouvait bien être due simplement à une accumulation d'un produit normal de la nutrition intracellulaire au lieu d'être un produit pathologique ».

Plus récemment, M. Perrier (4), à la suite de quelques expériences sur des espèces peu nombreuses, mais dont les conclusions lui paraissent pouvoir être facilement généralisées, considère les matières grasses « comme des matières de réserve, dont la formation n'est pas en relation directe avec la nature de l'aliment ternaire offert à la plante elles se maintiennent à peu près constantes en présence d'un excès d'aliment; elles disparaissent au contraire dès que celui-ci vient à manquer dans le milieu ».

C'est relativement à ce rôle de la matière grasse que j'ai pu recueillir quelques observations, au cours de recherches qui avaient pour but de déterminer le processus physiologique et chimique de sa formation et de sa destruction.

Relativement au *manuel opératoire*, il y a lieu d'observer que le traitement préalable par l'acide chlorhydrique des matières à épuiser (5) diminue la quantité de graisse recueillie et en altère les propriétés chimiques.

La quantité de graisse recueillie après traitement chlorhydrique est toujours inférieure de 1/2 à 1 p. 100 à celle que donne l'éther par l'épuisement direct.

(1) MÜNTZ, Études sur la maturation des graines (*Annales des Sc. nat.*, t. III, p. 68 1886).

(2) DUCLAUX, Nutrition intracellulaire, 3^{me} mémoire (*Annales de l'Institut Pasteur*, t. III, p. 1889).

(3) LABORDE, Thèse, Paris, 1896.

(4) PERRIER, *C. R.*, 10 avril 1905.

(5) DUCLAUX (*loc. cit.*) emploie ce procédé indiqué par Nægeli.

On retrouve cette méthode parmi celles indiquées pour l'analyse des matières agricoles par la Conférence internationale (10 et 11 juillet 1909).

La graisse obtenue par le traitement ordinaire est plus fluide, moins colorée, plus odorante; son indice de saponification est moins élevé (5 et 6 p. 100).

La déperdition était à prévoir, car l'acide chlorhydrique hydrolyse partiellement la graisse, et la glycérine mise en liberté passe dans les lavages.

Plusieurs séries de cultures sur l'*Aspergillus* et l'*Eurotiosis Gayoni* conduisent à la conclusion même de M. Perrier que la matière grasse est matière de réserve.

Les résultats suivants sont relatifs à l'*Aspergillus niger* végétant sur du liquide Raulin ordinaire.

AGE DE LA CULTURE (Jours)	RENDEMENT Moisissure sèche %/ d'aliment consommé	MATIÈRE GRASSE % de moisissure sèche
1	9	12,1
1 1/2	22	12,6
2	52	12
2 1/2	56	10
3	54	7,5
4	35	4
5	22	2,4
7	14	0,6
10	13	0,6
12	11	0,6

Ils sont représentés graphiquement par les courbes de la planche I, construites en prenant comme abscisses l'âge de la culture, et en ordonnées le rendement p. 100 de l'aliment en moisissure sèche et la matière grasse p. 100 de moisissure sèche.

On y remarquera: 1° que le maximum de matière grasse p. 100 est atteint avant celui du rendement;

2° Que le maximum de matière grasse correspond à la période (deuxième jour) où l'augmentation en poids de la moisissure est le plus rapide.




PLANCHE I.

La teneur en matière grasse est donc liée non à la richesse du milieu en aliment ternaire, mais à l'âge de la plante, à la phase où elle se trouve de son cycle germinatif; les conditions physiques exercent également une grande influence.

Si l'on renouvelle l'aliment, la teneur en graisse n'en continue pas moins de décroître, et même, en tenant compte de la moisissure jeune formée, toujours riche en graisse, la réserve grasse diminue plus vite sur le milieu ainsi renouvelé.

Un *Aspergillus* cultivé en grande surface est partagé en 3 fractions (au bout de trois jours).

1 est desséché et épuisé.

2 est placé dans une cuvette de dimension convenable sur le liquide déjà épuisé provenant de la première culture.

3 est placé sur du liquide neuf riche en sucre.

Au bout de trois jours, 2 et 3 sont moins riches en graisse que 1. La teneur en matière grasse (2,9 p. 100 et 3,2 est) légèrement plus faible dans 3 que dans 2.

De plus si l'on fait végéter l'*Aspergillus* pendant un mois dans de grands matras bouchés au coton, la matière grasse n'atteint plus que 1 p. 100 du poids de moisissure sèche, alors qu'il reste encore 1 gr. 5 de sucre par litre, tandis que la même moisissure, en cuvette, renferme 9 et 10 p. 100 de matière grasse au moment où elle achève de faire disparaître le sucre.

Si donc la matière grasse est matière de réserve, on ne peut affirmer, du moins pour la moisissure étudiée, que la matière grasse ne soit attaquée qu'après la disparition de l'aliment ternaire.

Il est à remarquer que l'addition de nouvelles quantités de sucre retarde la sporulation de quelque douze heures environ.

D'autre part, la sporulation correspond à une consommation rapide de matière grasse. Une culture de grande surface (*Aspergillus niger* sur cuvette 30 X 40), ayant été placée sur un plan légèrement incliné, la sporulation se déclare d'abord sur la région de la moisissure correspondant à la moindre épaisseur de liquide nutritif. Si l'on recueille alors, on trouve, par exemple, 4,9 p. 100 de graisse dans la partie sporulée, 6,5 dans la partie non sporulée.

La différence ne peut être attribuée qu'à l'état de végétation plus ou moins avancé, le liquide nutritif étant le même.

M. Manville continue l'exposé des origines de la théorie électronique de la matière :

4^e Partie : Introduction à la théorie électronique de la matière.

Les substances radio-actives et la radio-activité de la matière.

Séance du 27 juin 1907.

PRÉSIDENCE DE M. CARLES

Deuxième étude sur les alliages de cobalt et d'étain;

Par M. F. DUCELLIEZ.

Dans une précédente communication (1), j'ai indiqué que le cobalt et l'étain sont susceptibles de s'unir dans le rapport de 2 d'étain pour 1 de cobalt en donnant la combinaison CoSn . Cet alliage a été retiré de lingots titrant plus de 66 p. 100 d'étain. Comme suite à ce travail, j'ai étudié des culots de teneur en étain inférieure à 57 p. 100 et j'ai pu en séparer un alliage dans lequel les deux métaux se rencontrent dans la proportion de 4 d'étain pour 3 de cobalt, ce qui conduit à la formule Co^3Sn^4 .

Les lingots ont été obtenus comme précédemment à l'aide du four Schlœsing, la matière étant isolée du tube par une nacelle en magnésie. La facile oxydation du cobalt en poudre oblige à opérer dans l'hydrogène. Pour avoir des culots à forte teneur en cobalt bien homogènes, ce métal en poudre a été mélangé à de l'étain grenailé aussi fin que possible; ce dernier métal a été amené à cet état en le brassant fortement pendant son refroidissement.

La chauffe a été effectuée de façon à dépasser la température de fusion et à maintenir un certain temps le culot à l'état liquide. Le four Schlœsing donne une température suffisante pour que les tubes cassés pendant la chauffe se ressoudent. (D'après des déterminations faites au laboratoire, on atteint environ 1450 degrés.) Le refroidissement a été lent et a eu lieu dans l'hydrogène.

Les analyses ont été conduites comme précédemment, l'étain étant pesé à l'état de sulfure, le cobalt à l'état de sulfate. Les chiffres trouvés pour le cobalt ont été fréquemment contrôlés par l'électrolyse du sulfate additionné d'ammoniaque.

(1) F. DUCELLIEZ, *Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux*, 21 mars 1907, et *C. R.*, 24 juin 1907, t. CXLIV, p. 1432.

CULOT A. — Ce culot a une faible teneur en étain. La composition est :

CULOT A.	
Cobalt	90,62 p. 100.
Étain	8,76 —
	<hr/> 99,38

Il est plus dur et plus cassant que le cobalt. Il s'aplatit cependant au mortier d'Abich avant de se briser. Les fragments provenant de cette opération, tamisés et attaqués par l'acide azotique à 15 p. 100, donnent lieu à une attaque très vive à chaud, commençant à froid. Le résidu, débarrassé de l'acide métastannique par la potasse et par des lavages, est très faible : après quatre heures d'attaque, 10 grammes d'alliage n'en laissent que 3 décigrammes.

L'analyse assigne au résidu la composition suivante :

UNE ATTAQUE	
Cobalt	40,22 p. 100.
Étain	59,36 —
	<hr/> 99,58

Dans une autre opération analogue, 10 grammes de ce même culot ont fourni 5 décigrammes d'un résidu ayant pour composition :

UNE ATTAQUE	
Cobalt.	39,52 p. 100.
Étain	60,26 —
	<hr/> 99,78

Ces deux analyses, faites avec des poids trop faibles d'une matière terne, ne présentant guère l'aspect des résidus ordinaires, ne peuvent servir que d'indication

CULOT B. — La moyenne de deux dosages à résultats très voisins faits sur ce corps donne :

CULOT B	
Cobalt	83,96 p. 100.
Étain	16,28 —
	<hr/> 100,24

Il est cassant, se brise au mortier d'Abich. Les fragments tamisés ont été soumis à l'action de l'acide azotique à 15 p. 100. L'attaque est vive, le résidu, après traitement par la potasse, est faible : 6 décigrammes pour 10 grammes de matière, l'opération ayant duré six heures.

Le résidu se présente sous forme d'une poudre fine grise qui a pour composition :

	1 ^{re} ANALYSE		2 ^e ANALYSE
	—		—
Cobalt.	42,34 p. 100		42,39 p. 100.
Étain	57,12 —		57,75 —
	<u>99,46</u>		<u>100,14</u>

CULOT C. — Pour ce lingot, la teneur en étain a été augmentée. Il est plus fragile que le précédent, son analyse donne :

	CULOT C
	—
Cobalt	70,04 p. 100.
Étain.	29,25 —
	<u>99,29</u>

Un poids de 10 grammes de cette matière, cassé au mortier d'Abich et tamisé, a été soumis à l'attaque de l'acide azotique à 10 p. 100. L'attaque est vive, la liqueur se colore rapidement en rouge ; on observe ensuite la formation d'acide métastannique. Cette opération donne un produit noirâtre qui, après porphyrisation, a été soumis à l'action de la potasse fondue, elle se colore fortement en bleu. Après lavages pour éliminer la potasse et certaines matières grises légères, j'ai obtenu une matière brillante cristalline. A l'air, ce résidu se ternit légèrement et donne une poudre fine grisâtre.

Le poids du résidu provenant de cette attaque d'une durée de dix heures est de 2,5 grammes. L'analyse donne :

	1 ^{re} ANALYSE		2 ^e ANALYSE
	—		—
Cobalt.	42,80 p. 100		42,42 p. 100.
Étain	57,18 —		57,30 —
	<u>99,98</u>		<u>99,72</u>

J'ai aussi attaqué ce culot par l'acide chorhydrique faible. L'attaque a été vive et le résidu moindre que celui obtenu par l'acide azotique; j'ai donc abandonné ces attaques à l'acide chlorhydrique.

CULOT D. — Les deux métaux ont été avant fusion mélangés dans la proportion répondant à la formule Co^3Sn , soit 40,22 p. 100 d'étain. Après une première fusion, le culot a été broyé et fondu de nouveau; cette deuxième chauffe faite à température aussi élevée que possible a été suivie d'un refroidissement très lent. Le lingot présente dans le sens de sa longueur une cavité intérieure dont les parois sont tapissées par une matière brillante cristalline entourée d'une couche moins brillante. Une partie grise extérieure aux précédentes forme la masse du culot.

L'alliage très fragile a été broyé au mortier d'Abich et les fragments ont été tamisés; la poussière obtenue donne à l'analyse :

CULOT D	
Cobalt	60,01 p. 100.
Étain	39,88 —
	<u>99,89</u>

L'acide azotique à 15 p. 100 attaque vivement ce corps au début; au bout de 10 heures le résidu nettoyé pèse 2 grammes et provient de 10 grammes de matière. Il donne à l'analyse :

1 ^{re} ATTAQUE	
Cobalt	47,80 p. 100.
Étain.	51,36 —
	<u>99,16</u>

Une nouvelle opération identique réduit au quart le poids du résidu précédent. On obtient alors :

2 ^{re} ATTAQUE			
	1 ^{re} analyse		2 ^e analyse
Cobalt.	42,20 p. 100	41,42 p. 100.	
Étain	57,48 —	57,75 —	
	<u>99,68</u>	<u>99,17</u>	

CULOT E. — Très fragile, il se casse en tombant sur la brique ; il est de couleur gris clair.

Il a pour composition :

CULOT E	
—	
Cobalt	48,72 p. 100.
Étain.	51,96 —
	<hr/>
	100,68

J'ai fait subir à ce culot les mêmes opérations qu'aux précédents ; cependant il n'a pas été nécessaire de traiter le résidu par la potasse. Pour enlever l'acide métastannique, j'ai porphyrisé le résidu humide et je l'ai lavé plusieurs fois en décantant ; j'ai obtenu ainsi un résidu brillant très propre. Dans ces conditions, 10 grammes de matière m'ont donné 6 gr. 8 de résidu.

ANALYSES	
1 ^{re} analyse	2 ^e analyse
—	—
Cobalt.	41,31 p. 100
Étain	57,84 —
	<hr/>
	99,15
	42,57 p. 100.
	57,06 —
	<hr/>
	99,63

CULOT F. — Les résidus des culots étudiés jusqu'ici ont à peu près la même composition ; le culot F a été obtenu en fondant de l'étain et du cobalt mélangés dans cette proportion ; son dosage donne :

CULOT F	
—	
Cobalt.	41,83 p. 100.
Étain	57,25 —
	<hr/>
	99,08

Il est particulièrement cassant, brillant ; sa surface cristalline est composée de lamelles juxtaposées ; l'intérieur est homogène. Au mortier d'Abich, il se brise avec la plus grande facilité, en donnant une poussière brillante ressemblant aux résidus obtenus après attaque. Cette poussière, mise au contact de l'acide azotique à 15 p. 100, ne donne pas l'attaque vive constatée au début des attaques précédentes.

Il entre un peu de cobalt en solution. Le résidu est formé de grains légèrement plus gros que ceux des résidus précédents; il n'a pas été attaqué par la potasse fondue, car l'acide métastannique en petite quantité s'élimine dès les premiers lavages. Le poids de matière soumise à l'attaque étant 10 grammes, j'ai obtenu un résidu de 8 gr. 8 donnant à l'analyse :

		1 ^{re} ATTAQUE	
		1 ^{re} analyse	2 ^e analyse
Cobalt.	41,48 p. 100	42,86 p. 100.	
Étain	57,85 —	57,18 —	
	99,33	100,04	

La composition est restée sensiblement constante. Après porphyrisation et nouvelle attaque de longue durée, le résidu réduit à 7 gr. 05 donne à l'analyse :

		2 ^e ATTAQUE
Cobalt.	42,86 p. 100.	
Étain	57,58 —	
	100,44	

Comme vérification, les différents résidus mis ensemble ont été porphyrisés et attaqués d'abord par l'acide azotique à 25 p. 100, puis par la potasse : de 16 grammes leur poids est passé à 12. L'analyse a donné :

		3 ^e ATTAQUE
Cobalt.	42,65 p. 100.	
Étain.	57,95 —	
	100,60	

C'est sur ce produit que j'ai déterminé les propriétés physiques et chimiques du résidu.

Composé Co^2Sn^2 . — Les culots de teneur en étain variant de 0 à 57 p. 100, attaqués par l'acide azotique et la potasse, s'il y a lieu,

donnent donc des résidus de composition peu variable correspondant à la formule Co^3Sn^2 dont le pour cent calculé est :

FORMULE CALCULÉE	
Cobalt.	42,35 p. 100.
Étain	57,65 —
	<hr/> 100,00

Le poids de Co^3Sn^2 obtenu après attaque augmente avec la proportion d'étain, la fragilité des culots également; cette propriété physique semble liée à la quantité d'alliage contenu dans le lingot. Les culots de teneur en étain variant de 66 à 85 p. 100 et contenant CoSn , y compris ceux très voisins de ce composé, sont bien moins cassants.

La teneur 40 p. 100 d'étain, étudiée spécialement avec le culot D, ne m'a rien donné de particulier; un composé correspondant à Ni^3Sn isolé par M. E. Vigouroux n'est donc pas probable. Cependant, après attaque à l'acide azotique, j'ai eu plus d'acide métastannique avec les alliages de teneur en étain inférieure à 40 p. 100 que pour ceux compris entre 40 et 57 p. 100. Cela tendrait à faire supposer que au-dessous de 40 p. 100, les culots sont formés d'un mélange de Co^3Sn très attaquable, et de Co^3Sn^2 . Mais j'ai constaté, au début des attaques, que le cobalt passait seul en solution. Il faudrait donc admettre dans ces alliages trois corps en équilibre : Co , Co^3Sn^2 , Co^3Sn . La quantité d'acide métastannique mise en liberté dans l'attaque des culots contenant moins de 40 p. 100 d'étain provient donc vraisemblablement de Co^3Sn^2 , très divisé dans la masse du cobalt et par suite facilement attaquable. Lorsque ce composé forme une partie considérable du culot, ce qui arrive dans les alliages titrant de 40 à 57 p. 100 d'étain, il résiste mieux; du reste, je l'obtiens alors en grains plus gros.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. — L'alliage se présente sous forme d'une poudre brillante qui, vue au microscope, n'a pas un aspect cristallin bien caractérisé.

Tous ces culots donnant Co^3Sn^2 sont attirables à l'aimant. La propriété magnétique disparaît entre 57 et 59 p. 100 d'étain, le composé marquant probablement la limite. Ces alliages ne se comportent donc pas, à ce point de vue, comme ceux de nickel, pour lesquels

M. E. Vigouroux (1) a trouvé une limite bien différente : 40 p. 100 d'étain.

La densité calculée : 7,794 est plus faible que la densité trouvée : 8,862 (moyenne de trois déterminations faites à 0°).

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. — Le chlore transforme rapidement l'alliage porté au rouge en chlorures ; il y a légère incandescence.

L'acide chlorhydrique concentré le dissout complètement, l'attaque commençant à froid ; avec l'acide étendu l'action est très lente.

L'acide sulfurique le dissout mieux que l'acide chlorhydrique.

L'acide azotique, même chaud et concentré, n'a qu'une action faible.

L'eau régale le met rapidement en solution ; l'attaque commence à froid.

Dans l'oxygène, l'alliage porté au rouge sombre brûle avec incandescence.

La potasse fondue n'agit que très modérément.

Ces propriétés sont voisines de celles du composé CoSn qui paraît cependant être plus sensible à l'action de l'acide chlorhydrique, mais résister mieux à l'acide azotique que Co^3Sn^2 .

CONCLUSIONS. — 1. Les culots titrant moins de 57 p. 100 d'étain ne contiennent pas le composé CoSn ; j'ai pu en isoler des résidus de teneur en étain variant de 57 à 60 p. 100, ces limites n'ayant été atteintes que rarement. La plupart des résidus se rapprochent beaucoup de la formule Co^3Sn^2 .

2. La teneur 57 p. 100 d'étain est une limite pour la propriété magnétique de ces alliages.

3. Le résidu Co^3Sn^2 n'a pas un aspect cristallin bien caractérisé ; cet alliage se présente un peu moins nettement que CoSn et de nouvelles expériences sont nécessaires pour voir si la teneur 57 à 60 p. 100 correspond à la combinaison indiquée ou à une solution solide.

4. Le cobalt ne donne pas comme le nickel un alliage à allure définie contenant 40 p. 100 d'étain.

Les alliages de cobalt et d'étain à teneur en étain inférieure à 57 p. 100 sont donc vraisemblablement constitués par un mélange de

(1) E. Vigouroux, *Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux*, 25 avril 1907.

cobalt et de Co^3Sn^2 , la proportion de cet alliage défini augmentant avec la teneur en étain.

M. Manville termine l'exposé des origines de la théorie électronique de la matière :

5^e Partie : La théorie électronique de la matière.

Séance du 11 juillet 1907.

PRÉSIDENCE DE M. SARRAN

Étude sur les bronzes à base de nickel;

V

Par M. E. VIGOUROUX.

Dans quatre études précédentes, nous avons exposé les résultats de nos premiers travaux sur les bronzes à forte teneur en étain (1) et sur ceux riches en nickel (2). Seuls, les alliages de teneur en étain variant de 57,65 à 66,76 p. 100 n'avaient pas été soumis à ces recherches; ils font le sujet du présent mémoire.

Aucune modification n'a été apportée à la préparation des lingots ni à la méthode d'analyse. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec les alliages le plus lentement refroidis; à cet effet, le four était complètement entouré de briques.

Les culots broyés, ou porphyrisés dans le cas d'une attaque antérieure, ont été soumis :

a) à l'action de l'acide chlorhydrique dans le but d'en séparer Ni^2Sn^2 présumé.

b) à l'action de l'acide azotique pour avoir NiSn . Dans ce cas il est préférable d'enlever l'acide métastannique par lévigation afin d'éviter l'emploi de la potasse.

(1) E. VIGOUROUX, *Sur les bronzes à base de nickel (Procès-verbaux des séances de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 7 mars 1907) et Première Étude sur un corps contenu dans certains bronzes à base de nickel (Ibid.)*.

(2) E. VIGOUROUX, *Les bronzes à base de nickel III (Ibid., 25 avril 1907), et Étude sur les bronzes à base de nickel IV (Ibid., 30 mai 1907)*.

Les propriétés physiques de ces culots sont voisines : ils sont fragiles, brillants et non magnétiques.

CULOT. I. — Brillant et exempt de reflets brunâtres ; très dur et se casse facilement en présentant une section grenue ; tombe en poussière au mortier d'Abich. Son analyse fournit :

Nickel p. 100	40,25
Étain —	59,66
	<hr/>
	99,91

a) Fragmenté, puis traité par l'acide chlorhydrique à 25 p. 100, il diminue rapidement de poids : au bout de six heures, il est réduit au tiers. Le résidu obtenu contient :

Nickel p. 100	40,23
Étain —	59,58
	<hr/>
	99,81

Ce dernier porphyrisé et soumis à une nouvelle attaque semblable ne laisse que la quantité de matière nécessaire à un dosage qui donne :

Nickel p. 100	40,14
Étain —	59,25
	<hr/>
	99,39

L'acide chlorhydrique ne modifie donc pas sensiblement la composition de l'alliage précédent.

b) L'acide azotique concentré attaque très vivement le culot, mais seulement au début. Des opérations successives font monter la teneur en étain. Les analyses faites après chaque traitement donnent :

	APRÈS LE 1 ^{er}	APRÈS LE 2 ^e
	<hr/>	<hr/>
Nickel p. 100.	38,61	38,09
Étain —	60,45	61,18
	<hr/>	<hr/>
	99,06	99,27

La faiblesse du dernier résidu empêche d'aller plus loin.

CULOT II. — CONSTITUÉ PAR NICKEL : 40,30 p. 100; ÉTAÏN : 60,25 p. 100.

— Ses propriétés physiques sont celles du précédent. Cependant sa cassure n'a pas le même aspect : elle est presque lisse.

a) L'acide chlorhydrique étendu agit énergiquement; deux attaques successives effectuées, la première sur le culot broyé, la seconde sur le premier résidu porphyrisé, donnent :

	1 ^{re} ATTAQUE	2 ^e ATTAQUE
Nickel p. 100.	40,37	41,25
Étain —	58,90	57,80
	<u>99,27</u>	<u>99,05</u>

De nouvelles opérations ne modifient pas cette dernière composition, qui correspond presque exactement à la formule Ni^3Sn^2 .

b) Le culot broyé a été traité par l'acide azotique à 25 p. 100. Cette première attaque n'a pas modifié sensiblement sa composition; le dosage de la partie laissée donne en effet :

	1 ^{re} ATTAQUE
Nickel p. 100	40,35
Étain —	60,11
	<u>100,46</u>

Les différences sont imputables aux erreurs d'analyses.

De nouvelles attaques faites à l'aide de l'acide azotique concentré donnent successivement :

	2 ^e ATTAQUE	3 ^e ATTAQUE
Nickel p. 100.	38,97	37,42
Étain —	61,30	62,51
	<u>100,27</u>	<u>99,93</u>

La teneur en étain va donc en progressant, mais la faiblesse du dernier résidu nous empêche de continuer.

CULOT III. — Sa composition est la suivante :

Nickel p. 100	37,86
Étain —	61,74
	<u>99,60</u>

a) L'acide chlorhydrique à 25 p. 100 agissant sur ce culot broyé fait apparaître des résidus faibles titrant :

	1 ^{re} ATTAQUE	2 ^e ATTAQUE
Nickel p. 100	38,86	41,23
Étain —	60,22	58,75
	<u>99,08</u>	<u>99,98</u>

La première opération avait réduit à la moitié le poids de la matière ; le second dosage a été réalisé sur tout le résidu restant pesant moins de 5 décigrammes. Il fournit approximativement Ni^2Sn^2 .

b) L'acide azotique à 25 p. 100 nous a donné pour 10 grammes de matière successivement : 5,5, 3,5, 0,3 grammes. La 3^e attaque a été très longue. Ces résidus ont pour composition :

	1 ^{re} ATTAQUE	2 ^e ATTAQUE	3 ^e ATTAQUE
Nickel p. 100	37,20	36,99	35,31
Étain —	62,58	62,96	64,32
	<u>99,78</u>	<u>99,95</u>	<u>99,63</u>

Nous nous approchons de NiSn .

CULOT IV. — Cet alliage a pour composition :

Nickel p. 100	36,00
Étain —	63,03
	<u>99,03</u>

a) L'acide chlorhydrique diminue la teneur en étain ; le dernier résidu, ne représentant que le huitième du corps soumis à l'attaque, abandonne à l'analyse :

Nickel p. 100	37,48
Étain —	61,95
	<u>99,43</u>

b) L'acide azotique concentré, employé comme précédemment,

donne successivement : 7 grammes et environ 1 gramme. La composition des résidus est :

	1 ^{re} ATTAQUE	2 ^e ATTAQUE
Nickel p. 100	35,97	33,53
Étain —	63,73	65,50
	<u>99,70</u>	<u>99,03</u>

Cette dernière composition est voisine de NiSn.

CULOT V. — Son dosage lui assigne :

Nickel p. 100	33,51
Étain —	65,92
	<u>99,43</u>

a) L'acide chlorhydrique ne change pas notablement sa composition.

b) L'acide azotique pur met en solution du nickel ; il y a formation d'un peu d'acide métastannique. Nous obtenons un résidu égal aux $\frac{1}{3}$ du poids de la matière soumise à l'attaque et qui fournit à l'analyse

	1 ^{re} ANALYSE	2 ^e ANALYSE
Nickel p. 100	33,05	33,72
Étain —	66,31	66,63
	<u>99,36</u>	<u>100,35</u>

composition constante malgré de nouvelles attaques et répondant au composé NiSn.

Cette étude montre :

a) Que l'action de l'acide chlorhydrique sur ces alliages vient diminuer leur teneur en étain. Les culots I, II, III, donnent des résidus contenant de 57 à 60 p. 100 d'étain. La formule Ni^2Sn^3 , presque exactement retrouvée dans le résidu du culot II, se trouve déterminée dans ces expériences à peu près avec la même approximation que dans l'étude antérieure ;

b) Que l'acide azotique a un effet contraire et tend à faire retomber sur le composé NiSn qui apparaît nettement dans les culots à partir d'une teneur égale ou supérieure à 62 p. 100 d'étain.

Les analyses nous donnent rarement bien exactement les limites Ni^*Sn^* et NiSn , mais on peut s'en approcher de plus en plus. Les attaques par l'acide azotique sont fort longues : plusieurs jours pour chaque opération.

Il paraît donc vraisemblable d'admettre que, dans cet intervalle, c'est-à-dire de 57,65 à 66,76 p. 100 d'étain, les alliages sont constitués par un mélange de NiSn et d'un corps qui pourrait bien être Ni^*Sn^* .

TABLEAU résumant les principaux résultats de ces premières études :

TENEUR EN ÉTAI N	COMPOSITION PROBABLE	ALLIAGES RÉPON DANT à des formules simples	QUELQUES CARACTÈRES PHYSIQUES
0			
»	Ni et Ni^*Sn	Ni—50,78 Ni^*Sn Sn—40,22 100,00	La fragilité va en augmentant } Magnétiques
40,22			
»			
»	Ni^*Sn^* (1) et Ni^*Sn^*	Ni—42,35 Ni^*Sn^* Sn—57,65 100,00	D = 8,98 } Limite du magnétisme
57,65			
»			
»	Ni^*Sn^* et NiSn	Ni—33,24 NiSn Sn—66,76 100,00	Très fragiles } Non magnétiques
66,76			
»			
»	NiSn et Sn		D = 8,44 } Sonores La fragilité diminue Fin de la Sonorité Malléables
85			
100			

(1) Dans l'intervalle compris entre 40,22 et 57,65 nous avons indiqué Ni^*Sn^* qui n'a pas été réellement isolé.

Effets du siliciure cuivreux sur les métaux.

Effets inverses;

Par M. EM. VIGOUROUX.

De précédentes communications ont fait connaître un certain nombre de résultats relatifs aux propriétés du siliciure cuivreux (formé par l'action du cuivre sur le silicium en excès et élimination

de ce dernier par la potasse étendue). Le travail a été continué d'abord par l'étude des effets produits par ce corps sur des métaux et ensuite par celle de l'action inverse du cuivre sur quelques dérivés également persiliciurés susceptibles d'être engendrés de façon analogue, c'est-à-dire au sein du silicium en excès.

ACTION DU FER. — Un certain nombre d'essais ont été effectués qui ont eu pour résultat de fournir du siliciure de fer de composition variable suivant les proportions relatives des deux corps utilisés.

Premier essai. — On mélange 38 gr. 6 de Cu^4Si avec 1 gr. 4 de fer. Après chauffe sur une nacelle en magnésie, dans un milieu d'hydrogène, on trouve un culot très cassant qui, traité par l'acide azotique très étendu, abandonne un résidu répondant à la formule FeSi .

Deuxième essai. — On chauffe : Cu^4Si , 40 grammes ; fer, 10 grammes et l'on forme un alliage gris terne, grenu, s'écrasant au mortier d'Abich sans casser. Traité par une solution d'acide azotique à 10 p. 100, il abandonne un résidu cristallin présentant la composition Fe^3Si .

Troisième essai. — La réaction est réalisée entre : siliciure cuivreux, 36 grammes ; fer, 28 grammes. D'une partie du culot obtenu, l'acide azotique encore à 10 p. 100 isole le corps Fe^3Si .

Quatrième essai. — Les proportions mises en réaction sont de 26 grammes pour le siliciure cuivreux et de 25 grammes pour le fer. Le culot, moins homogène que les deux premiers, se présente constitué par une partie cassante et une partie malléable. Après leurs traitements respectifs par l'acide azotique étendu, on constate dans l'une la présence d'un corps approchant de la formule Fe^2Si^2 et dans l'autre celle de l'alliage défini Fe^3Si .

ACTION DU MANGANÈSE. — Plusieurs essais effectués dans des conditions comparables ont fourni des résultats également comparables.

Premier essai. — On chauffe, toujours dans la magnésie, et dans un courant d'hydrogène, 38 gr. 4 de Cu^4Si avec 1 gr. 6 de manganèse en poudre. On forme un culot fondu, très cassant, sillonné de stries

cristallines duquel l'acide azotique toujours étendu élimine le corps MnSi.

Deuxième essai. — On prépare un culot avec Cu⁴Si, 31 gr. 85; manganèse, 3 gr. 13; on l'obtient également fondu, cassant bien qu'assez dur, à cassure grenue gris jaune. La composition du résidu abandonné par l'acide azotique étendu est encore très voisine de MnSi.

Troisième essai. — Les quantités mises en réaction sont : Cu⁴Si, 26 gr. 4; manganèse, 3 gr. 6. La chauffe fournit un culot fortement aggloméré, dans lequel on discerne un corps de nature spéciale qui, isolé à l'aide de l'acide azotique étendu, répond à la formule Mn³Si².

Quatrième essai. — Il porte sur les proportions suivantes : siliciure cuivreux, 16 grammes; manganèse, 14 grammes. Le culot est dur, difficile à pulvériser. La liqueur acide précédemment utilisée en sépare le corps Mn³Si qui, d'un culot synthétique titrant environ 14 p. 100, a pu être également isolé sous forme de poudre fine.

ACTION DU COBALT. — 38 grammes de Cu⁴Si et 12 grammes de cobalt sont mis en réaction. Le culot très dur se fragmente difficilement. Une attaque à l'aide de l'acide azotique à 5 p. 100 laisse un résidu gris, légèrement bronzé et très brillant. Sa formule est voisine de Co³Si.

ACTION DE L'ALUMINIUM. — On mélange 30 grammes de Cu⁴Si avec 30 grammes d'aluminium en grosse limaille et l'on fond le tout dans une nacelle en magnésie, au sein de l'hydrogène. Le culot cassant ainsi formé, très attaquant par l'acide chlorhydrique à 10 p. 100 qui enlève l'aluminium, abandonne un résidu renfermant environ 90 p. 100 de cuivre et plus de 7 p. 100 de silicium libre cristallisé.

ACTION DU PLATINE. — Il est obtenu un culot gris blanc, assez dur, en chauffant un mélange de Cu⁴Si et de platine renfermant environ 25 p. 100 de ce dernier. En attaquant le culot par l'acide azotique à 5 p. 100, on trouve, au sein du résidu formé, une substance gris clair, entièrement soluble dans l'eau régale, répondant assez exactement à la formule Cu⁴PtSi.

ACTION DU MERCURE. — On a chauffé, dans un ballon, Cu⁴Si grossièrement pulvérisé avec du mercure jusqu'au voisinage de son point

d'ébullition, pendant plus d'un jour. Après refroidissement, la substance pulvérulente était soigneusement séparée d'avec la partie du mercure restée liquide. En épuisant cette dernière par l'acide azotique tant qu'elle abandonnait du cuivre, on trouvait dans la liqueur bleue, par insolubilisation, une certaine quantité de silice; ce qui prouve que le mercure s'amalgame avec le siliciure cuivreux.

Cas de l'azotate mercureux. — Une solution de ce sel, saturée à froid puis filtrée, agitée avec du siliciure cuivreux en petits fragments, bleuit rapidement, tandis que les grains de siliciure se recouvrent d'un enduit qui paraît être encore du siliciure amalgamé.

EXPÉRIENCES INVERSES : ACTION DU CUIVRE SUR CERTAINS SILICIURES. — La réalisation de réactions inverses effectuées en réduisant, par le cuivre, un certain nombre de siliciures formés avec excès de silicium a été d'une grande utilité pour permettre une vérification simple des résultats obtenus. Nous en indiquerons un certain nombre.

ACTION SUR MnSi^2 (*obtenu par l'action du manganèse sur le silicium en excès et élimination de ce dernier par la potasse étendue*). *Premier essai.* — En chauffant de ce siliciure 5 gr. 40 avec cuivre 34 gr. 60, on obtient un seul bloc, très dur, résistant au choc du mortier d'Abich et qui, après attaque à l'acide azotique à 5 p. 100, abandonne un résidu cristallin, brillant, très fin, de formule Mn^2Si^2 .

Deuxième essai. — Une chauffe effectuée en prenant : MnSi^2 , 3 grammes; cuivre, 47 grammes, fournit un corps fondu en un bloc unique, très dur, ne cassant pas au mortier d'Abich, qu'il a fallu fragmenter à l'aide de la lime. Le résidu de l'attaque de sa limaille par l'acide azotique étendu répond à la formule Mn^2Si^2 .

ACTION SUR CoSi^2 (*résultant de l'action du cobalt sur le silicium en excès et élimination de ce dernier par la potasse étendue*). — Un mélange est effectué dans les proportions suivantes : CoSi^2 , 7 grammes; cuivre, 43 grammes. Après chauffe, toujours dans la magnésie, le culot bien fondu, homogène en apparence, est attaqué par le même liquide acide. Le résidu a pour formule Co^2Si^2 .

ACTION SUR PtSi (*formé par l'action du platine sur le silicium en excès et élimination de ce dernier par la potasse étendue*). — Ce com-

posé PtSi, chauffé avec 10 fois environ son poids de cuivre, forme un culot bien fondu, présentant l'aspect de ce dernier métal. L'acide azotique étendu l'attaque vivement et en sépare un résidu brun, peu brillant, qui renferme 99,48 p. 100 de platine et 0,36 p. 100 de silicium combiné.

Enfin, ce même siliciure PtSi, amené à fusion avec environ 12 fois son poids du composé cuivreux Cu^4Si , forme un culot gris clair et très cassant. Un traitement par une solution d'acide azotique à 10 p. 100, entraîne d'abord un peu de cuivre, exempt de platine; puis l'attaque s'arrête presque de suite et ne reprend plus, même sous l'action de l'acide azotique concentré. Une analyse effectuée à l'aide de l'eau régale fluorhydrique, l'eau régale ordinaire n'agissant que faiblement, y donne comme teneurs centésimales : platine, 20,60; cuivre, 67,20; silicium, 12,20 (par différence).

Bref, ce premier travail d'approche montre que : 1° le jeu des équilibres dans les alliages renfermant les trois éléments (le silicium y existant toujours à l'état combiné) permet de réaliser les formules de quatre corps : FeSi , Fe^2Si^2 , Fe^3Si , Fe^4Si (auxquels viendrait s'ajouter FeSi^2 si ces alliages renfermaient du silicium à l'état libre); tous les résultats amenés par le manganèse et le cobalt sont jusqu'ici analogues; 2° dans l'aluminium, le siliciure cuivreux se dissocie; 3° avec le mercure, le même corps s'amalgame; 4° avec le platine, il pourrait se former un siliciure double. Nous poursuivons ces recherches.

Troisième étude sur les alliages de cobalt et d'étain;

Par M. F. DUCELLIEZ.

J'ai déjà pu isoler de ces alliages deux résidus de formule définie : CoSn et Co^3Sn^2 , le premier des culots de teneur en étain supérieure à 66 p. 100 (1) le second en étudiant ceux titrant moins de 57 p. 100 de ce métal (2). Les alliages de teneur intermédiaire, c'est-à-dire de

(1) *Procès verbaux des séances de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux*, 21 mars 1907.

(2) *Ibid.*, 27 juin 1907.

composition variant de 57 à 66 p. 100 d'étain, font le sujet du présent travail. J'ai essayé de retirer de ces corps : 1^o le composé Co^3Sn^2 par attaque à l'acide chlorhydrique; 2^o CoSn par action de l'acide azotique. Il a en effet été remarqué dans le précédent travail que ces réactifs n'avaient pas une action semblable sur ces alliages.

Les culots ont été préparés dans les mêmes conditions que précédemment en employant des métaux purifiés au laboratoire.

CULOT I. — Il est très fragile et se casse à la main. Il contient des soufflures; il est de couleur gris terne avec des points brillants. Il n'est pas magnétique. Son dosage donne :

CULOT I	
—	
Cobalt	39,43 p. 100
Étain	<u>59,72</u> —
	99,15

ATTAQUE PAR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. — Le culot broyé a été soumis à l'action de l'acide chlorhydrique à 15 p. 100; puis porphyrisé avant une nouvelle attaque. L'analyse des résidus a donné :

	1 ^{re} ATTAQUE	2 ^e ATTAQUE
	—	—
Cobalt	39,84 p. 100	40,38 p. 100
Étain	<u>59,26</u> —	<u>58,73</u> —
	99,07	99,11

Puis, après une dernière opération semblable, réduisant au dixième le poids de matière attaquée, j'ai obtenu :

3 ^e ATTAQUE	
—	
Cobalt	41,38 p. 100
Étain	<u>58,03</u> —
	99,41

Ce dernier résidu, qui a une composition voisine de Co^3Sn^2 , n'est pas magnétique.

ATTAQUE A L'ACIDE AZOTIQUE. — Les résidus, provenant d'attaques successives par l'acide azotique concentré, ont après chaque opération

une teneur plus élevée en étain. Entre chaque opération la matière a été porphyrisée; j'ai cru devoir éviter l'emploi de la potasse, l'acide métastannique a été enlevé par lévigation. Voici les résultats des analyses après les deux premières attaques :

	1 ^{re} ATTAQUE	2 ^{re} ATTAQUE
	—	—
Cobalt	38,03	37,48 p. 100
Étain.	61,76	62,22
	<u>99,79</u>	<u>99,70</u>

composition qui reste longtemps constante. Enfin, une dernière attaque identique, mais très longue, a donné un très faible résidu de composition voisine de :

	3 ^e ATTAQUE
	—
Cobalt	35,56 p. 100
Étain.	64,10 —
	<u>99,66</u>

La composition se rapproche donc de CoSn .

CULOT II. — Les propriétés physiques sont les mêmes que celles du précédent; son dosage donne :

	CULOT II
	—
Cobalt	38,54
Étain.	61,15
	<u>99,69</u>

ATTAQUE A L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. — Le culot broyé et tamisé, attaqué par l'acide chlorhydrique à 15 p. 100, donne lieu à une attaque vive. Les analyses fournissent :

	1 ^{re} ATTAQUE	2 ^{re} ATTAQUE
	—	—
Cobalt	40,00	41,12 p. 100
Étain	59,37	58,58 —
	<u>99,37</u>	<u>99,70</u>

Le poids du résidu après la seconde opération était juste suffisant pour une analyse et provenait de 10 grammes de culot environ. Sa composition est voisine de $\text{Co}^{\text{II}}\text{Sn}^{\text{II}}$.

ATTAQUE A L'ACIDE AZOTIQUE. — Le culot fragmenté a été attaqué par l'acide azotique concentré; il a fort bien résisté à ce réactif. L'acide métastannique a pu être enlevé par lévigation. Après la première attaque, le résidu représente les $\frac{2}{3}$ du poids de la matière attaquée. L'analyse lui assigne la composition :

1 ^{re} ATTAQUE	
—	
Cobalt	36,08 p. 100
Étain	63,30 —
	<hr/>
	99,38

Des attaques ultérieures donnent :

	2 ^e ATTAQUE	3 ^e ATTAQUE
	—	—
Cobalt	35,08	34,60 p. 100
Étain	63,96	64,40
	<hr/>	<hr/>
	99,04	99,00

La dernière opération réduisant le poids du résidu à la quantité juste nécessaire pour l'analyse, le rapproche sensiblement de CoSn . Comme dans le cas précédent (culot II), l'analyse faite après la 3^e attaque ne présente pas un grand degré de certitude, la quantité de matière étant faible et, malgré les soins pris, les impuretés pouvant s'y accumuler. Du reste, les conclusions ne sont pas modifiées en se tenant aux dosages faits après la 2^e attaque.

CULOT III. — Assez cassant pour être rompu entre les doigts, il a une texture cristalline, il n'est pas magnétique. Son dosage donne :

CULOT III	
—	
Cobalt	34,53 p. 100
Étain	64,83 —
	<hr/>
	99,36

ATTAQUE PAR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. — Après broyage au mortier d'Abich, la matière tamisée a été soumise à l'action de l'acide chlorhydrique à 15 p. 100. Le corps a perdu par l'attaque environ les $\frac{2}{3}$ de son poids. Au lieu de diminuer, la teneur en étain a augmenté légèrement. Les analyses m'ont donné en effet :

	1 ^{re} ANALYSE	2 ^e ANALYSE
Cobalt.	34,36 p. 100	34,45 p. 100
Étain	65,41 —	65,42 —
	<u>99,77</u>	<u>99,87</u>

Une nouvelle attaque plus longue, ne laissant que le poids de matière nécessaire à l'analyse, fournit un résultat analogue.

Il est vraisemblable qu'une quantité de Co^3Sn^2 trop faible pour être mise en liberté a entravé l'isolement de CoSn .

ATTAQUE PAR L'ACIDE AZOTIQUE. — Cette attaque a été faite avec de l'acide azotique pur sur l'alliage broyé. J'ai enlevé l'acide métastannique par lévigation. Le rendement en résidu a été des $\frac{2}{3}$. L'analyse a donné :

	1 ^{re} ATTAQUE
Cobalt	33,40 p. 100
Étain.	66,37 —
	<u>99,77</u>

composition que l'acide azotique ne modifie plus sensiblement; elle se rapporte à CoSn .

CONCLUSIONS. — Cette nouvelle étude montre :

1^o Que les alliages de cobalt et d'étain de teneur en étain comprise entre 57 et 66 p. 100 sont probablement formés d'un mélange de CoSn et de Co^3Sn^2 , la quantité de ce dernier composé étant très faible au-dessus de 64 p. 100 d'étain; de même que celle de CoSn au-dessous de 62 p. 100. Les culots de teneur en étain supérieure à 62 p. 100 ont en tous cas seuls permis d'isoler complètement l'alliage CoSn .

2^o Que les attaques par l'acide chlorhydrique sont susceptibles de faire descendre la teneur en étain de 60 à 58 p. 100, ce qui fait retomber sur Co^3Sn^2 . Ceci a une importance particulière, certains culots

riches en cobalt étant montés par attaques à l'acide azotique jusqu'à 60 p. 100 d'étain.

3° Que les résidus des attaques de ces alliages à l'acide azotique se rapprochent de CoSn . On ne peut toutefois affirmer l'existence de ce composé dans les culots I et II.

4° Que les alliages de cobalt et d'étain de teneur en étain variant de 57 à 66 p. 100 ne sont pas magnétiques ; les alliages de formule définie CoSn et Co^3Sn^2 sont également privés de cette propriété.

RÉSUMÉ


L'étude chimique des alliages de cobalt et d'étain a donné les résultats contenus dans le tableau suivant :

TENEUR EN ÉTAİN	COMPOSITION DES ALLIAGES	ALLIAGES DÉFINIS ISOLÉS	PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	
100			Alliages malléables	
85	Sn et CoSn		Deviennent durs et cassants	Alliages non magnétiques
66,76		CoSn { Sn 66,76 Co 33,24 100,00	D = 8,95	
	CoSn et Co^3Sn^2		Très fragiles	
57,65		Co^3Sn^2 { Sn 57,65 Co 42,35 100,00	D = 8,862	Limite du magnétisme Fragilité maxima
	Co^3Sn^2 et Co		De moins en moins fragiles	Alliages magnétiques
0				


Action des acétones chlorées et bromées sur quelques amines aromatiques;

Par M. A. RICHARD.

Dans un mémoire publié en 1891 dans le *Bulletin de la Société Chimique de Paris* (1), Demètre-Vladesco étudiant l'action de la *Méthyl-éthylcétone α chlorée* (3 chlore 2 butanone, $\text{CH}^3\text{-CO-CHCl-CH}^3$) sur le gaz ammoniac, indique que la réaction obtenue à froid peut être représentée :




Mais cette amido-cétone, peu stable à cause de la proximité des groupements CO et NH³, se décomposerait en donnant naissance au composé $\text{C}^6\text{H}^{12}\text{N}^4$ (tétraméthylparadiazine). Ce corps résulterait de la réunion de 2 molécules de l'amido-cétone avec perte de 2 molécules d'eau ; mais ce composé serait lui-même instable et perdrait 2 hydrogènes. De là résulterait la formule admise par l'auteur :



Voulant ensuite mieux fixer les idées, Demètre-Vladesco étudie l'action de cette même acétone chlorée sur l'aniline. Trouvant qu'à froid la réaction était peu sensible, il chauffe le mélange au bain-marie. La réaction ne tarde pas à se produire ; puis, après refroidissement de la masse, dissolvant le tout dans l'acide chlorhydrique concentré, il projette dans un grand excès d'eau. Une matière jaune sale se précipite, et si on la reprend par l'eau bouillante, on obtient

(1) DEMÈTRE-VLADESCO, *Bulletin de la Société Chimique de Paris*, 3^e série, t. III, 1891, p. 820-826.

par refroidissement de petites lamelles nacrées qui ne sont autre que le *Pr. 2. 3. Diméthylindol* de formule :



En présence de ce résultat, Demètre Vladesco conclut en disant qu'il est probable que la condensation se passe différemment dans les deux cas, à cause du noyau benzénique. En outre, avec les amines aromatiques et la méthyléthylcétone α chlorée, on aurait le moyen de réaliser la synthèse de toute une série de dérivés de l'indol.

C'est dans le but de résoudre ce problème que j'ai entrepris les expériences que je vais présenter à la Société. Mais pour faire un travail d'ensemble, je ne me contenterai pas d'étudier l'action de la méthyléthylcétone chlorée, je me propose de passer en revue l'action des différentes acétone chlorées ou bromées sur les principales amines aromatiques. Je n'insisterai d'ailleurs que sur les particularités que je pourrai rencontrer au cours de ces recherches.


Admettant les résultats précédents, je me suis tout d'abord adressé à la monochloracétone ordinaire ($\text{CH}_3\text{-CO-CH}_2\text{Cl}$) et je l'ai fait réagir sur l'aniline et les toluidines.

ANILINE ET MONOCHLORACÉTONE. — Si dans l'aniline pure on fait tomber un peu de diméthylcétone monochlorée, l'expérience montre que, à la température ordinaire, il y a tout d'abord production de quelques fumées blanches dans le ballon qui contient les deux liquides, puis, après agitation, le liquide prend un aspect homogène et presque incolore surtout si l'aniline a été récemment distillée. La coloration du liquide augmente alors d'une façon progressive et lente, et, au bout d'un temps plus ou moins long, le liquide s'est épaissi, en même temps que des cristaux apparaissent au sein de cette masse visqueuse qui a de beaux reflets rouge mordoré.


Deux corps semblent ainsi avoir pris naissance et, afin de mieux les séparer, j'ai modifié les conditions de l'expérience. Mais avant d'entrer

dans le détail expérimental, je ferai remarquer qu'il est possible, *a priori*, de concevoir deux modes particuliers de réaction et, par suite, la formation de deux composés différents.

On peut en effet penser que le groupement monovalent $\text{C}^6\text{H}^5\text{-NH}$ se substitue purement et simplement au chlore de l'acétone chlorée en donnant de l'acide chlorhydrique qui se combine à une seconde molécule d'aniline et forme du chlorhydrate d'aniline. La réaction peut alors être formulée ainsi :



Mais, par analogie avec les expériences de Vladesco, on peut aussi supposer que la réaction est plus profonde, que non seulement le chlore de l'acétone chlorée a formé de l'acide chlorhydrique, mais que l'oxygène du groupe CO a disparu pour donner de l'eau. Dans ces conditions, la réaction doit être formulée de la façon suivante :



De ces deux réactions, quelle est celle qui répond à la réalité des faits, c'est ce qui va nous occuper maintenant.

Quelle que soit l'interprétation que j'aie à adopter plus tard, un fait apparaît tout d'abord, c'est que, pour réaliser cette combinaison, il faut employer pour une molécule de monochloracétone deux molécules d'aniline. Or cela revient, sensiblement du moins, à prendre un volume d'aniline double du volume de monochloracétone. Ce sont ces proportions relatives des deux corps que j'ai toujours mises en présence.

Cela étant et la réaction terminée, un traitement par l'eau distillée à la température ordinaire m'a permis d'enlever par simple dissolution le corps cristallisé. Si, en effet, on prend cette eau et si on la fait évaporer lentement, il reste dans le récipient un corps solide plus

ou moins pur qui se volatilise assez facilement et dans lequel un dosage d'azote m'a montré que le corps cristallisé devait être le chlorhydrate d'aniline $C^6H^5NH^2HCl$.

J'aurai d'ailleurs un peu plus loin à indiquer un mode opératoire qui donne directement du chlorhydrate d'aniline pur, et c'est à ce sujet que je donnerai les résultats analytiques trouvés pour ce corps.

Le traitement par l'eau que j'ai ainsi fait subir au produit de la réaction, laissa au fond du récipient un corps rouge brun très foncé extrêmement épais et visqueux, soluble dans l'alcool et dans l'éther, La solution dans l'alcool, mise à évaporer à l'étuve, abandonne un solide brun marron très foncé dont la composition est indiquée plus loin.

Dans l'expérience précédente je m'étais astreint à opérer à la température ordinaire; j'ai alors voulu voir si en traitant le mélange des deux substances par la chaleur comme l'avait fait Vladesco avec la méthyléthylcétone chlorée, j'obtiendrais les mêmes résultats. J'ai alors chauffé au bain-marie dans un petit ballon muni d'un réfrigérant ascendant le mélange des deux liquides réagissants. Dès le début, la masse se colore, s'épaissit, et lorsque la température du bain-marie atteint 80° , le mélange entre en ébullition; des vapeurs mixtes viennent se condenser dans le réfrigérant et retombent dans le ballon. J'avoue qu'il ne m'est pas possible d'affirmer, comme le fait Vladesco, que, dans ces vapeurs, il y a de la vapeur d'eau. Sous l'action de la chaleur, l'aniline, la monochloracétone ont émis des vapeurs qui sont venues se condenser sur les parois du réfrigérant, mais je crois bien difficile de discerner en même temps la vapeur d'eau.

Quoi qu'il en soit, l'ébullition ne tarde pas à s'arrêter. Je cesse alors de chauffer et je laisse refroidir le ballon. La matière brune qui reste a sensiblement le même aspect que celle obtenue à froid. Je l'ai ensuite traitée par l'acide chlorhydrique concentré et chaud, et j'ai projeté le tout dans un excès d'eau froide. Il s'est aussitôt précipité une matière marron clair très légère, lorsqu'on a la précaution de la laisser lentement se dessécher à froid sur une plaque poreuse. Cette matière est amorphe et, avec l'interprétation de Vladesco, doit correspondre au composé indolique de formule globale (C^6H^5Nz) . Il faut toutefois ne pas négliger de voir si le traitement à l'acide chlorhydrique concentré et chaud ne donne pas un chlorhydrate de la base considérée : c'est là une nouvelle complication.

Aussi, laissant de côté les divers succès que j'ai obtenus soit en versant trop rapidement la matière dans l'eau, soit en desséchant à température trop élevée, je dirai que cette manière d'opérer ne m'ayant pas donné de résultats aussi bons que celle que je vais maintenant indiquer, j'y ai par la suite complètement renoncé.

Le procédé expérimental le plus simple qui m'a donné les meilleurs résultats est le suivant.

Je dissous les substances réagissantes dans de l'éther ordinaire et je mélange ces deux dissolutions que j'abandonne à la température ordinaire dans un récipient fermé. Au bout de vingt-quatre heures, je trouve dans le vase un abondant précipité cristallisé qu'il est facile d'avoir complètement pur au moyen de un ou deux lavages à l'éther.

Le liquide, séparé des cristaux par filtration, peut être encore abandonné à lui-même et il se produit une nouvelle cristallisation. Il n'y a plus alors qu'à produire l'évaporation de l'éther, qui donne un résidu noir à reflets mordorés, analogue à celui qui a été précédemment obtenu.

L'étude des deux corps, ainsi obtenus, va nous permettre de résoudre le problème considéré.

α. CORPS CRISTALLISÉ. — Les cristaux obtenus se présentent sous forme de lamelles plates, très légères, agissant sur la lumière polarisée, insolubles ou peu solubles dans l'éther, beaucoup plus solubles dans l'eau et dans l'alcool. Ils ont tous les caractères physiques du chlorhydrate d'aniline.

Les dosages du chlore et de l'azote dans cette substance ne sauraient, d'autre part, laisser aucun doute sur leur véritable composition :

		gr.
I.	Matière employée	0,3450
	Chlorure d'argent	0,3811
II.	Matière employée	0,3724
	Azote recueilli.	0,0405

Soit en centièmes :

	OBSERVÉ	CALCULÉ pour $C^9H^9NH^2HCl$
Cl.	27,31	27,41
N	10,88	10,81

La substance cristallisée obtenue dans ces dernières expériences est donc bien le chlorhydrate d'aniline.

β. CORPS NOIR. — Le corps noir a, de son côté, été lavé soit à l'eau pure pour lui enlever le chlorhydrate d'aniline qui pouvait rester, soit à l'eau légèrement additionnée d'acide chlorhydrique pour enlever l'aniline qui pouvait n'avoir pas été attaquée. Après ces lavages, j'ai desséché à l'étuve à une très douce chaleur et dosé l'azote.

Trois dosages faits avec des produits différents ont donné les résultats suivants :

		gr.
I. {	Matière employée	0,4301
	Azote recueilli.	0,0408
II. {	Matière employée	0,0734
	Azote recueilli.	0,0356
III. {	Matière employée	0,3707
	Azote recueilli.	0,0351

Soit en centièmes :

	N p. 100 OBSERVÉ	N p. 100 CALCULÉ	
		pour C^9H^9N	pour $C^9H^{11}NO$
I.	9,49	10,68	9,39
II.	9,55		
III.	9,48		

Ces premiers résultats très concordants semblent bien montrer que l'on a affaire au composé $C^9H^{11}NzO$ et non pas au méthylindol C^9H^9Nz . Je n'ai pas néanmoins voulu conclure immédiatement et j'ai imaginé d'autres expériences.

J'ai tout d'abord utilisé la solubilité du corps noir dans l'alcool et son insolubilité dans l'eau pour essayer de le purifier. J'ai, à cet effet, pris une dissolution étendue et froide de ce corps dans l'alcool et je l'ai versée doucement dans un grand excès d'eau. Il se forme aussitôt un précipité brun marron extrêmement ténu qui reste en suspension dans le liquide, mais qui se précipite immédiatement dès que l'on ajoute une solution étendue d'acide picrique dans l'eau. Ce précipité est alors lavé et desséché sur une plaque poreuse à la température ordinaire.

Si l'on dose l'azote dans ce produit marron, on trouve des résultats différents de ceux qui précèdent. C'est ce que montrent les trois dosages suivants :

		gr.
I. {	Matière employée	0,2994
	Azote recueilli.	0,0248
II. {	Matière employée	0,3558
	Azote recueilli.	0,0300
III. {	Matière employée	0,4764
	Azote recueilli.	0,0404

Soit en centièmes :

	I	II	III
	—	—	—
N p. 100	8,28	8,44	8,48

Ces derniers résultats montrent que le produit marron, obtenu dans la précipitation par l'eau de la solution alcoolique du produit noir, diffère nettement de ce dernier composé. Comme il était à présumer que j'avais affaire à un hydrate de ce composé, il n'a pas été difficile de voir que l'on avait le corps de formule $C^9H^{11}NO + H^2O$ pour lequel la proportion centésimale d'azote calculée est :

N p. 100 calculé pour $C^9H^{11}NO + H^2O$ 8,38

Ce composé marron ainsi obtenu est insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool, et si l'on évapore à l'éther cette solution, on retrouve après dessiccation complète le corps noir d'où l'on était parti.

De même si l'on chauffe au bain-marie ce même composé marron, on le voit brunir, prendre l'aspect pâteux au voisinage de 80° et si l'on pulvérise le résidu après refroidissement, on trouve encore le corps noir primitif.

Les analyses qui suivent, permettent d'ailleurs de lever complètement tous les doutes que l'on pourrait concevoir sur la nature de ce corps.

Voici, en effet, quelques-uns des résultats obtenus :

		gr.
I. {	Poids de la matière.	0,3000
	Gaz carbonique	0,7937
	Eau	0,1981

		gr.
II.	Poids de la matière.	0,3144
	Gaz carbonique	0,8334
	Eau	0,2124
III.	Poids de la matière	0,3313
	Azote recueilli.	0,0310

Soit en centièmes :

	I	II	III
C	72,18	72,20	» »
H	7,34	7,52	» »
N	»	»	9,38 »
O (par différence) .	»	»	» 10,95

Ces nombres, comparés aux deux groupes suivants, calculés dans les deux hypothèses faites, ne laissent plus aucune doute :

	C ⁶ H ¹¹ NO (th)	C ⁶ H ⁹ N (th)
C	72,48	82,44
H	7,38	6,87
N	9,39	10,68
O	10,73	»
	99,98	99,99

Ma conclusion sera donc la suivante :

On ne saurait généraliser la réaction indiquée par Vladesco dans l'action de la méthyléthylcétone α chlorée sur l'aniline; il faut étudier à part chaque amine aromatique et chaque dérivé halogéné des diverses acétone.

ANILINE ET MONOBROMACÉTONE. — L'action de la monobromacétone sur l'aniline est de tous points semblable à celle de la monochloracétone; elle semble toutefois plus active, car si l'on mélange directement ces deux corps, il y a un notable échauffement de la masse, qui est accompagné de boursoufflement et de projection à l'extérieur du tube. Si, au contraire, on a la précaution de dissoudre ces deux corps dans l'éther, la réaction se produit d'une façon plus calme; on voit le liquide prendre une teinte rougeâtre de plus en plus

foncée, en même temps que, dans la masse, se forment des cristaux incolores qu'il est possible de séparer et de purifier par des lavages à l'éther. On laisse achever la réaction en permettant à l'éther de s'évaporer. On trouve un résidu visqueux rouge brun au milieu duquel sont encore des cristaux qu'un lavage à l'eau peut enlever.

Il est facile de voir que l'on peut écrire une équation de la réaction identique à celle trouvée dans le cas de la monochloracétone :



En effet l'analyse du corps cristallisé a donné :

		gr.
I. {	Poids de matière	0,2217
	Bromure d'argent	0,2382
II. {	Poids de matière.	0,3458
	Bromure d'argent	0,3714
III. {	Poids de matière.	0,2580
	Azote	0,0210

Soit en centièmes :

	OBSERVÉ	CALCULÉ pour $\text{C}^6\text{H}^5\text{NH}^2\text{HBr}$
	—	—
Br	{ 45,72 p. 100	45,97
	{ 45,61 —	»
N.	8,19 —	8,04

Quant au corps non cristallisé que l'on obtient comme avec la monochloracétone, il a la même composition et correspond bien à la formule donnée ($\text{C}^6\text{H}^{11}\text{NO}$).

TOLUIDINES ET MONOCHLORACÉTONE. — L'étude de l'action de la monochloracétone sur les trois toluidines a été faite simultanément et m'a conduit à des résultats identiques. Dans ces trois réactions, en effet, j'ai trouvé que le chlore de la monochloracétone est remplacé par le radical monovalent ($\text{C}^6\text{H}^4\text{-CH}^3$) en même temps que se forme du chlorhydrate de la toluidine employée. Il n'y a de différences que dans la rapidité de la réaction et dans la constitution du composé formé. C'est ainsi, par exemple, que si l'on mélange des solutions étherées de monochloracétone et des trois toluidines, la réaction

semble se produire plus rapidement avec la P. Toluidine qu'avec ses deux isomères. En effet, au bout de quelques heures, avec la P. Toluidine on voit se former un abondant dépôt de cristaux au sein d'un liquide dont la coloration va en augmentant avec le temps, tandis qu'avec la O. Toluidine et la M. Toluidine, il faut attendre beaucoup plus longtemps, et même quelquefois est-on obligé de faire évaporer une partie de l'éther, si l'on veut voir apparaître les cristaux.

Une simple décantation suivie d'un lavage à l'éther permet d'avoir des cristaux parfaitement purs, que l'on peut de suite soumettre à l'analyse.

Le liquide éthéré qui a été séparé des cristaux est alors mis à évaporer. Il reste un magma visqueux très coloré au sein duquel se trouvent encore quelques cristaux qu'un lavage à l'eau peut facilement faire disparaître. Si l'on reprend le résidu par l'alcool, la dissolution est complète. Projetant alors ce liquide rouge foncé à reflets mordorés dans l'eau pure, il se dépose un précipité marron très léger qu'il faut dessécher sur une plaque poreuse à basse température. C'est cette substance qui a été soumise à l'analyse et qui nous a donné les résultats indiqués plus loin.

Remarquons, en outre, que cette substance marron se dissout facilement dans l'alcool et donne par évaporation de ce liquide un corps presque noir ayant même odeur que lui, mais qui en diffère par une molécule d'eau.

On obtient d'ailleurs des résultats de même nature en cherchant à voir soit l'action de la chaleur sur ce corps, soit l'action de l'eau bouillante. Le corps marron noircit, devient plus dense en subissant une sorte de fusion pâteuse, mais garde la même composition.

Voici les résultats des analyses faites soit sur le corps cristallisé, soit sur le corps non cristallisé :

1° Corps cristallisé.

I.	{	Matière employée	0,3125
		Chlorure d'argent	0,3113
II.	{	Matière employée	0,3403
		Chlorure d'argent	0,3342
		Matière employée	0,2175
III.	{	Azote recueilli	0,0218
		Matière employée	0,2966
		Azote recueilli	0,0290

Soit, en centièmes :

	OBSERVÉ	CALCULÉ pour $C^7H^7NH^2HCl$
	—	—
Cl.	24,65 — 24,64	24,75
N.	10,03 — 9,78	9,75


Le corps cristallisé est donc bien le chlorhydrate de P. Toluidine.

2° Corps marron.

	Matière employée	0,3345
I. {	Eau	0,2321
	Gaz carbonique	0,9005
	Matière employée	0,3034
II. {	Eau	0,2144
	Gaz carbonique	0,8209
III. {	Matière employée	0,3132
	Azote recueilli.	0,0269
IV. {	Matière employée	0,4116
	Azote recueilli.	0,0350

	OBSERVÉ	CALCULÉ pour $C^{10}H^{12}NO$
	—	—
H	7,71 7,87	7,97
C	73,39 73,79	73,61
N	» » 8,58 8,52	8,58

Ces nombres parfaitement concordants permettent par suite d'écrire la réaction :



Donc, ici, pas plus que dans le cas de l'aniline je n'ai vu de dérivés indoliques.

MONOBROMACÉTONE ET TOLUIDINE. — La monobromacétone réagissant sur la P. Toluidine donnant des résultats identiques aux précédents, je n'y insisterai pas davantage.

Dans une prochaine communication, je donnerai les résultats obtenus avec la méthyléthylcétone α chlorée ou bromée sur l'aniline et les toluidines et je montrerai dans quelles conditions il faut se placer pour obtenir des dérivés indoliques prévus par la réaction de Demètré-Vladesco.

Sur les formations cystolithiques des Cistes;

Par M. GARD.

La plupart des Cistes offrent, dans leur limbe, des épaississements membraneux particuliers, d'un blanc nacré, fortement incrustés de silice. Leur disposition ne présente rien de régulier; ils sont disséminés çà et là en des points quelconques du limbe: cellules épidermiques, stomatiques, palissadiques ou du parenchyme lacuneux. Parfois, cependant, les éléments qui les contiennent sont plus grands que les autres et alors ils se rapprochent des vrais cystolithes, bien que dépourvus de pédicelle (*C. vaginatus* Ait; *C. Clusii* Dun.). L'épaississement peut être localisé en un point, au milieu d'une paroi, sans occuper toute son étendue. Sa forme et sa disposition peuvent être très irrégulières.

Ces formations, sur lesquelles aucun auteur n'a encore attiré l'attention chez les Cistinées, se présentent sur les parois externes ou latérales, ou à la fois sur les deux, des cellules épidermiques. Dans le mésophylle, elles peuvent intéresser une paroi quelconque de la cellule. Cependant, dans le parenchyme palissadique, elles se trouvent surtout sur les membranes verticales. On y observe des couches concentriques très apparentes, notamment après l'action de l'hypochlorite. Rarement, les éléments qui les possèdent sont isolés; le plus souvent, plusieurs cellules contiguës offrent des épaississements analogues qui se groupent autour d'un même centre, un peu à la façon des sphéro-cristaux d'inuline. L'ensemble peut former des amas considérables (*C. vaginatus* Ait; *C. heterophyllus* L.). Tantôt ils sont minces, tantôt très épais, remplissant la totalité ou la presque totalité de la cellule. Ils existent souvent dans celles qui entourent un stomate ou la base d'un poil.

Des formations cystolithiques silicifiées analogues ont été décrites dans quelques groupes de plantes, notamment dans certaines *Oléacées*, *Santalacées*, *Loranthacées* et *Euphorbiacées*.

Elles ne peuvent pas être utilisées pour la distinction des espèces, si ce n'est d'une manière accessoire. On ne peut qu'indiquer leur abondance relative, leur disposition la plus fréquente. Néanmoins, il n'est pas inutile de les mentionner dans une description anatomique, car elles se montrent constantes chez des individus d'origine très différente. C'est ainsi que, chez divers échantillons de *C. monspeliensis* L., provenant les uns de l'herbier Thuret, les autres recueillis par M. Sauvageau, aux îles Canaries, ou par moi dans l'Aude et l'Hérault, elles sont particulièrement abondantes dans l'épiderme de la face ventrale du limbe ; chez *C. populifolius* L., dans les cellules stomatiques et celles qui les entourent à la face dorsale. Enfin, certaines espèces paraissent en être dépourvues, tels sont : *C. crispus* L., *C. sericeus* M.; *C. Pouzolzii* Del.; et *C. Osbeckiaefolius* Webb. Cependant, comme il est parfois nécessaire de passer en revue plusieurs séries de coupes transversales ou tangentielles pour les rencontrer, elles peuvent échapper à l'observation, surtout si elles sont isolées.

TABLE DES MATIÈRES DES PROCÈS-VERBAUX

ANNÉE 1906-1907

	Pages
M. VÈZES. — Sur les risques d'incendie des usines de résine	2
DE NABIAS. — Sur le mécanisme d'action des anesthésiques généraux.	3
P. CARLES. — Le fluor dans les eaux minérales	11
P. CARLES. — A propos du fluor dans les eaux minérales	18
Em. VIGOUROUX. — Sur un nouveau mode de préparation de siliciures de nickel	20
Em. VIGOUROUX. — Sur un nouveau mode de préparation du siliciure de chrome Cr^3Si^2	23
M ^{me} BAUDEUF. — Action de la lumière ultraviolette sur les faux équilibres électriques.	26
Em. VIGOUROUX. — Sur la réduction des oxydes par l'aluminium : réduction des oxydes de chrome.	31
Em. VIGOUROUX. — Nouveaux essais de préparation du cuivre pur	34
P. CARLES. — Le Fluor et les Huitres.	39
L. BARTHE. — Sur le dosage iodométrique de l'acide borique	41
M. VÈZES. — Théorie osmotique des Solutions.	43
Em. VIGOUROUX. — Sur les bronzes à base de nickel.	43
Em. VIGOUROUX. — Première étude d'un corps retiré de certains alliages riches de nickel et d'étain	47
M. VÈZES. — La détermination des poids moléculaires et ses anomalies.	51
F. DUCCELLIEZ. — Première étude sur les alliages de cobalt et d'étain.	51
M. VÈZES. — Les ions et la dissociation électrolytique.	55
Em. VIGOUROUX. — Les bronzes à base de nickel.	56
Em. VIGOUROUX. — Action du silicium en excès sur le cuivre en présence d'un autre élément.	60
MANVILLE. — Théorie des Électrons : 1 ^{re} Partie : Décharge à travers les liquides. Ions électrolytiques; charge électrique des ions. Vitesse des ions	66
H. PADÉ. — Sur deux passages du calcul différentiel et intégral d'A. de Morgan	66
Em. VIGOUROUX. — Sur la siliciuration de l'argent et du cuivre.	68
MANVILLE. — Théorie des Électrons : 2 ^e Partie : Décharge à travers les gaz. Ions cathodiques. Ions de Lénard. Conséquences de leur existence sur l'état gazeux	72
P. CARLES. — Le fluor dans les coquilles des mollusques non marins.	73
Em. VIGOUROUX. — Etude des bronzes à base de nickel	74

	Pages
GARD. — Rôle de l'anatomie comparée dans la distinction des espèces de Cistes	77
H. PADÉ. — Sur une formule remarquable du calcul intégral	77
CH. PÉREZ. — Recherches sur les cercles mycéliens.	78
MANVILLE. — 3 ^e Partie : L'ionisation des gaz et les expériences qui ont conduit à la notion d'électron.	78
M^{me} BAUDEUF. — La lumière ultraviolette rend-elle les gaz conducteurs?	78
M. VÈZES et R. BRÉDON. — Sur la solubilité réciproque de l'essence de térébenthine et de l'alcool aqueux. III. Courbes de séparation.	82
M. VÈZES et R. BRÉDON. — Sur la solubilité réciproque de l'essence de térébenthine et de l'alcool aqueux. IV. Mesures réfractométriques.	86
DUBAQUIÉ. — Rôle physiologique de la matière grasse dans les végétaux	92
MANVILLE. — 4 ^e Partie : Introduction à la théorie électronique de la matière. Les substances radio-actives et la radio-activité de la matière.	96
F. DUCELLIEZ. — Deuxième étude sur les alliages de cobalt et d'étain.	97
MANVILLE. — 5 ^e Partie : La théorie électronique de la matière. . . .	105
Em. VIGOUROUX. — Etude sur les bronzes à base de nickel	105
Em. VIGOUROUX. — Effets du siliciure cuivreux sur les métaux. Effets inverses.	110
F. DUCELLIEZ. — Troisième étude sur les alliages de cobalt et d'étain.	114
A. RICHARD. — Action des acétones chlorées et bromées sur quelques amines aromatiques	120
GARD. — Sur les formations cystolithiques des Cistes.	131



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
DE LA SOCIÉTÉ
DES SCIENCES
PHYSIQUES ET NATURELLES

DE BORDEAUX

Année 1907-1908

PARIS

GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES

Quai des Augustins, 55

A BORDEAUX

CHEZ FERET & FILS, LIBRAIRES

15, cours de l'Intendance, 15

1908

LISTE

DES

PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS DE LA SOCIÉTÉ

DE 1853 A 1908

ANNÉE	PRÉSIDENT	VICE-PRÉSIDENT
1853-1854	BAZIN	DELBOS
1854-1855	BAZIN	»
1855-1856	BAZIN	»
1856-1857	ORÉ	»
1857-1858	BAUDRIMONT	»
1858-1859	BAZIN	»
1859-1860	BAUDRIMONT	»
1860-1861	ABRIA	»
1861-1862	LESPIAULT	ORÉ
1862-1863	BAUDRIMONT	ROYER
1863-1864	ORÉ	AZAM
1864-1865	AZAM	ROYER
1865-1866	ROYER	H. GINTRAC
1866-1867	H. GINTRAC	O. DE LACOLONGE
1867-1868	O. DE LACOLONGE	GLOTIN
1868-1869	GLOTIN	JEANNEL
1869-1870	LINDER	DELFORTERIE
1870-1871	LINDER	DELFORTERIE
1871-1872	DELFORTERIE	ABRIA
1872-1873	ABRIA	RATHEAU
1873-1874	BAUDRIMONT	SERRÉ-GUINO
1874-1875	SERRÉ-GUINO	BAYSSELLANCE
1875-1876	BAYSSELLANCE	LOQUIN

ANNÉE	PRÉSIDENT	VICE-PRÉSIDENT
1876-1877	LOQUIN	HAUTREUX
1877-1878	HAUTREUX	E. BOUTAN
1878-1879	E. BOUTAN	MICÉ
1879-1880	DUPUY	MILLARDET
1880-1881	MILLARDET	DE LAGRANVAL
1881-1882	DE LAGRANVAL	G. RAYET
1882-1883	G. RAYET	FOURNET
1883-1884	G. RAYET	FOURNET
1884-1885	G. RAYET	FOURNET
1885-1886	G. RAYET	BOUCHARD
1886-1887	G. RAYET	BOUCHARD
1887-1888	G. RAYET	AZAM
1888-1889	G. RAYET	TANNERY
1889-1890	TANNERY	GAYON
1890-1891	AZAM	GAYON
1891-1892	DUPUY	GAYON
1892-1893	DROGUET	BLAREZ
1893-1894	BAYSSELLANCE	BLAREZ
1894-1895	BLAREZ	HAUTREUX
1895-1896	DE LAGRANVAL	HAUTREUX
1896-1897	DURÈGNE	BOULOUGH
1897-1898	BOULOUGH	STROHL
1898-1899	STROHL	RENOUS
1899-1900	RENOUS	SARRAN
1900-1901	SARRAN	BARTHE
1901-1902	BARTHE	CARLES
1902-1903	CARLES	CARMIGNAC-DESCOMBES
1903-1904	CARMIGNAC-DESCOMBES	BARBARIN
1904-1905	BARBARIN	DE NABIAS
1905-1906	DE NABIAS	LOISEAU
1906-1907	LOISEAU	CHADU
1907-1908	BOULOUGH	PRÉVOST

LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Pendant l'année 1907-1908.

COMPOSITION DU BUREAU POUR L'ANNÉE 1907-1908.

MM. BOULOUGH, <i>Président.</i>	
PRÉVOST, <i>Vice-Président.</i>	
PADÉ, <i>Secrétaire général.</i>	
RICHARD, {	<i>Secrétaires adjoints.</i>
HUGOT, }	
VÈZES, <i>Archiviste.</i>	
DE SAINT-MARTIN, <i>Archiviste adjoint.</i>	
CHEVALLIER, <i>Trésorier.</i>	
BARBARIN,	
BARTHE, *	} <i>Membres du Conseil.</i>
BLAREZ, *	
CARLES,	
DENIGÈS,	
DURÈGNE,	
CARMIGNAC-DESCOMBES,	
DE LAGRANDEVAL, *	
DE NABIAS, *	
PÉREZ, *	
RENOUS,	
SARRAN,	

MEMBRES TITULAIRES ⁽¹⁾.

- MM. ARRIVAUT, préparateur à la Faculté des Sciences.
AULNAY (D'), propriétaire à Mérignac.
BARBARIN, professeur au Lycée.
BARCKHAUSEN, O. *, professeur à la Faculté de Droit.
BARTHE, *, professeur à la Faculté de Médecine.
BAUDEUF (M^{me}), professeur au Lycée de jeunes filles.
BERGONIE, *, professeur à la Faculté de Médecine.
BLAREZ, professeur à la Faculté de Médecine.
BOULLAY, professeur au Lycée.
BOULOUGH, professeur au Lycée.
BOYER, préparateur à la Faculté des Sciences.
CARLES, agrégé à la Faculté de Médecine.
CARMIGNAC-DESCOMBES, *, ingénieur, percepteur à Bordeaux.
CAUBET, professeur à la Faculté des Sciences.

⁽¹⁾ Les membres dont le nom est précédé d'un astérisque sont membres à vie.

- MM. CAVALIÉ, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.
CHADU, professeur au Lycée.
CHAINE, professeur à la Faculté des Sciences.
*CHAPON, directeur des imprimeries de *La Gironde*.
CHATEAU, licencié ès sciences, pharmacien-major.
CHENEVIER, chimiste en chef au chemin de fer du Midi.
CHEVALLIER, docteur ès sciences, préparateur à la Faculté des Sciences.
COLOT, licencié ès sciences, professeur de Mathématiques.
COUSIN, professeur à la Faculté des Sciences.
DELVAL, ingénieur des Manufactures de l'État.
DENIGÈS, *, professeur à la Faculté de Médecine.
DESBROUSSES, ingénieur des Manufactures de l'État.
DEVAUX, professeur à la Faculté des Sciences.
DOUBLET, astronome à l'Observatoire.
DUBAQUIÉ (l'abbé), licencié ès sciences.
DUBOURG, professeur à la Faculté des Sciences.
DUCELLIEZ, préparateur à la Faculté des Sciences.
DUFFOUR, professeur au Lycée.
DUHEM, correspondant de l'Institut, professeur à la Faculté des Sciences.
DUPOUY, professeur à la Faculté de Médecine.
DURÈGNE, ingénieur en chef des Télégraphes.
ELLIE, ingénieur civil.
ESCLANGON, professeur à la Faculté des Sciences.
FALLOT, professeur à la Faculté des Sciences.
GADEN, négociant.
GARD, chef des travaux à la Faculté des Sciences
GAULNE (DE), propriétaire.
*GAYON, O. *, correspondant de l'Institut, doyen de la Faculté des Sciences, chimiste en chef à la Douane.
GOGUEL, professeur à la Faculté des Sciences.
GOSSART, professeur à la Faculté des Sciences.
HAUTREUX, *, lieutenant de vaisseau, directeur des mouvements du port en retraite.
HOCHART, propriétaire.
HUGOT, docteur ès sciences, chef de travaux à la Faculté des Sciences.
JOLYET, *, professeur à la Faculté de Médecine.
JOUET, propriétaire.
JOUGUET, ingénieur des Mines à Paris.
KOWALSKI, professeur de Mathématiques.
KOWALSKI (J^e), docteur ès sciences.
LABATUT, préparateur à la Faculté des Sciences.
LABORDE, docteur ès sciences, sous-directeur de la Station agronomique.
LAGACHE, ingénieur des Arts et Manufactures.
LAGRANDVAL (DE), *, professeur honoraire de Mathématiques spéciales au Lycée.
LAMY, architecte.
LANDE, O. *, ancien maire de Bordeaux, professeur à la Faculté de Médecine.
LASSERRE, chimiste des Douanes.
LENOBLE, maître de conférences à la Faculté libre des Sciences de Lille.
LOISEAU, *, ingénieur en chef des Poudres et Salpêtres.
LOISELEUR, professeur au Lycée.

- MM. MANVILLE**, docteur ès sciences, préparateur à la Faculté des Sciences.
MARCHIS, professeur à la Faculté des Sciences.
MAURICE, préparateur à la Faculté des Sciences.
MORISOT, préparateur à la Faculté des Sciences.
MOULINE, professeur au collège de Romorantin.
PADE, doyen de la Faculté des Sciences.
PALMADE, professeur au Lycée de Montpellier.
PELABON, professeur à la Faculté des Sciences de Lille.
PÉREZ (J.), *, professeur honoraire à la Faculté des Sciences.
PÉREZ (Ch.), professeur à la Faculté des Sciences.
PICART, professeur à la Faculté des Sciences, directeur de l'Observatoire.
PIETTRE, professeur au Lycée d'Oran.
PITARD, professeur à l'École de Médecine de Tours.
PRÉVOST, ingénieur civil des Mines.
RENOUS, ingénieur civil.
RICHARD, docteur ès sciences, chef des travaux chimiques à la Faculté des Sciences.
ROCH, chimiste.
ROCHOUX, industriel.
ROZIER, professeur de Mathématiques.
SANSON, professeur au Lycée.
***SARRAN**, professeur au Lycée.
SERRES, professeur au Lycée.
SIGALAS, professeur à la Faculté de Médecine.
SOULARD, industriel.
VALLANDÉ (DE), docteur-médecin au Porge (Gironde).
VEZES, professeur à la Faculté des Sciences.
VIAULT, *, professeur à la Faculté de Médecine.
VIGOUROUX, professeur à la Faculté des Sciences.

MEMBRES HONORAIRES

- MM. BERTIN**, membre de l'Institut, directeur du Génie maritime.
DARBOUX (G.), C. *, membre de l'Institut, doyen honoraire de la Faculté des Sciences de Paris.
LINDER, O. *, inspecteur général des Mines, à Paris.
PIONCHON, *, professeur à la Faculté des Sciences de Dijon.
ROUX, *, directeur de l'Institut Pasteur, à Paris.
VOLTERRA, membre de l'Université royale de Rome.

MEMBRES CORRESPONDANTS

- MM. ANDREEFF**, professeur à l'Université de Kharkof.
ARDISSONE, professeur de Botanique à l'École Royale d'Angloteerre de Milan.
ARIES, capitaine du Génie.
CERTZU (Max.), professeur au Gymnase de Thorn.
CHAVASTELON, professeur à la Faculté des Sciences de Clermont.

MM. DILLNER (G.), professeur à l'Université d'Upsal.

ÉLIE, professeur au collège d'Abbeville.

ERNST (A.), professeur d'Histoire naturelle à l'Université de Caracas.

GAUTHIER-VILLARS, *, libraire-éditeur, à Paris.

GOMES TEIXEIRA (F.), professeur de l'Academia polytechnica de Porto.

GUIMARAES, membre de l'Académie de Lisbonne.

GÜNTHER (Dr. Sig.), professeur au Gymnase d'Ansbach.

HADAMARD, professeur à la Sorbonne.

HAYDEN, géologue du Gouvernement des États-Unis.

LAISANT, *, ancien officier du Génie.

MUELLER (baron Ferd. von), membre de la Société Royale de Londres
directeur du Jardin Botanique de Melbourne (Australie).

PICART, professeur de Botanique en retraite, à Marmande (Lot-et-Garonne).

ROIG Y TORRES (D. Rafael), naturaliste à Barcelone, directeur de la
Crónica Científica.

WEYR (Éd.), professeur à l'Université de Prague.

ZAWODNY (D*), à Vienne.

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

DE LA SOCIÉTÉ

DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES

DE BORDEAUX

Séance du 24 octobre 1907.

PRÉSIDENCE DE M. CARMIGNAC-DESCOMBES

Le scrutin pour le renouvellement du Bureau de la Société pour l'année 1907-1908 donne les résultats suivants :

<i>Président</i>	M. BOULOUCH.
<i>Vice-Président</i>	M. PRÉVOST.
<i>Secrétaire général</i>	M. PADÉ.
<i>Archiviste</i>	M. VÈZES.
<i>Archiviste adjoint</i>	M. DE SAINT-MARTIN.
<i>Trésorier</i>	M. CHEVALLIER.
<i>Secrétaires adjoints</i>	MM. HUGOT et RICHARD.

Le scrutin pour l'élection des membres du Conseil renouvelables en 1907 ou décédés donne au Conseil la composition suivante :

Conseil d'administration (1907-1908):

1 ^{re} SÉRIE	2 ^{me} SÉRIE	3 ^{me} SÉRIE
Renouvelable en 1908	Renouvelable en 1909	Renouvelable en 1910
MM. BARBARIN. BARTHE. DE NABIAS. SARRAN.	MM. CARLES. DENIGÈS. PÉREZ. RENOUS.	MM. DURÈGNE. BLAREZ. CARMIGNAC-DESCOMBES. DE LAGRANVAL.

Sont ensuite élus membres de la Commission des finances et d'impression : MM. Carles, Carmignac-Descombes, de Lagrandval, Sarran.

La Commission de contrôle des comptes du Trésorier sera composée de MM. Desbrousses, Kowalski, Serres.

Sur quelques nouveaux dérivés bromés de la pyridine;

Par M. L. BARTHE.

L'hypobromite de soude est sans action sur la pyridine, quelle que soit la durée de l'action du réactif, à des températures inférieures à 100°. Ces deux liquides ne se mélangent même pas.

Si, dans volume égal de pyridine et d'hypobromite, on ajoute peu à peu, à froid et en agitant, de l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire si l'on produit du brome naissant, le mélange s'échauffe. Si, après avoir libéré tout le brome par des affusions successives d'acide chlorhydrique, on chauffe le mélange rendu acide au bain-marie et au réfrigérant ascendant, on obtient une liqueur d'un beau jaune d'or, répandant une odeur qui rappelle celle de la nitrobenzine. En évaporant cette solution au bain-marie, il reste un résidu cristallin formé de chlorure de sodium, de chlorate de soude, et d'un produit organique bromé. Le mélange de sels est lavé sur un filtre sans pli avec de l'alcool anhydre, qui ne dissout que le composé organique, si l'hypobromite était en excès par rapport à la pyridine, ou bien, dans le cas contraire, un mélange du composé organique et de pyridine.

La solution alcoolique du composé organique est d'autant plus longue à cristalliser qu'elle renferme un excès de pyridine qui lui communique son odeur. Pour enlever celle-ci, le mieux est de laver rapidement le composé organique sur filtre avec de l'alcool, bien que cette opération fasse perdre beaucoup de produit.

On peut encore préparer accessoirement ce produit comme nous le verrons plus loin.

Bromhydrate de pyridine, C^5H^5N, HBr . — L'évaporation de la solution alcoolique fournit des feuillets cristallins qui fondent vers 25°-28° en un liquide huileux qui demeure ensuite en surfusion; ils sont très déliquescents; abandonnés à l'air sur une plaque de porcelaine poreuse ou sur du papier buvard, ils fondent et disparaissent; sous cloche, au-dessus de l'acide sulfurique, ils se dissocient au bout de quelque

temps : le brome se sépare, et il reste de la pyridine qui distille vers l'acide sulfurique.

On conserve bien ces cristaux sous cloche au-dessus du chlorure de calcium. Ils sont solubles dans l'eau et l'alcool, insolubles dans l'éther sulfurique et le chloroforme. La solution aqueuse présente une réaction acide par suite de leur dissociation ; les alcalis déplacent facilement la pyridine au point qu'il est possible d'évaluer la pyridine dans la solution aqueuse de ces cristaux, à l'aide d'une solution alcaline titrée et d'un indicateur approprié. Leurs solutions ne fournissent pas de précipité avec le chlorure de platine ou le chlorure d'or.

Les propriétés de ces cristaux et leur analyse démontrent qu'ils sont formés de bromhydrate de pyridine, C^5H^5N, HBr .

DOSAGE DU BROME. — Ce dosage se fait facilement, à l'état de bromure d'argent, après calcination avec de la chaux.

CALCULÉ		
pour C^5H^5N, HBr		
—		
Substance.	0,5549	»
AgBr	0,6539	»
Br correspondant	0,2782	»
Br p. 100.	50,14	50,0

Le dosage de l'azote s'exécute à l'aide de la méthode de Dumas.

	I	II
	—	—
Substance.	0,445	0,481
Volume d'azote recueilli. .	33 ^{cc} 0	36 ^{cc} 2
(P = 760 t = 5°) (P = 768 t = 9°)		
Azote p. 100.	9,0	9,15 8,75

Enfin, pour le dosage du carbone, il nous a paru avantageux de retenir l'acide carbonique provenant de la combustion du carbone par l'oxyde de cuivre (le brome étant fixé par une colonne de ferrocyanure de potassium) dans une solution titrée et en excès d'eau de baryte contenue dans un tube à boules de Meyer.

Dans ce but on fait une solution d'eau de baryte saturée : on titre celle-ci en en prenant 100 cc. que l'on dilue à 250 cc. avec de l'eau distillée; 100 cc. de cette nouvelle solution sont titrés à l'aide de l'acide sulfurique N/4. On trouve que ces 100 cc. à $\frac{100}{250}$ exigent pour leur saturation N cc. d'acide sulfurique N/4; après absorption de CO² produit par la combustion de la substance (s), on trouve que pour 100 cc. étendus à 250 cc. il faut n cc. de SO⁴H² N/4, d'où :

Centimètres cubes de solution normale d'eau de baryte précipitée : $(N - n) \times 2,5 = V$ cc., et poids (p) de carbone correspondant $= \frac{V}{4} \times 0,006$; d'où C p. 100 $= \frac{p}{s}$.

	I	II	CALCULÉ pour C ⁶ H ⁵ N, HBr
Substance	0,243	0,266	»
Nombre de cc. d'acide normal. .	15,4	16,94	»
Carbone correspondant.	0,093	0,10164	»
Carbone p. 100	38,27	38,21	37,50

Tribromopyridine, C⁵H³NBr³. — Si, dans le mélange de pyridine et d'hypobromite en excès, chauffé au bain-marie, on fait dégager tout le brome par affusions successives d'acide chlorhydrique, ou si, dans la liqueur jaune dont il a été question plus haut, on ajoute directement du brome jusqu'à refus, on obtient par refroidissement du mélange de belles aiguilles rougeâtres renfermant quelquefois un excès de brome non fixé, qu'elles perdent par l'exposition à l'air, ou mieux sous cloche au-dessus de l'acide sulfurique. D'ailleurs, pour purifier ces cristaux, il suffit de les faire cristalliser dans l'alcool anhydre. La liqueur qui les a fournis abandonne encore par évaporation des cristaux moins rouges, mélangés de cristaux blancs, qu'on pourrait prendre pour un nouveau composé; mais des analyses nombreuses et non concordantes nous ont fait connaître que ces seconds cristaux étaient formés d'un mélange d'aiguilles rougeâtres, qui se déposent par refroidissement, et de cristaux de bromhydrate de pyridine dont nous avons déjà parlé.

Les cristaux rouges obtenus sont très stables. Ils fondent à 89°-90°. Ils distillent sans décomposition à 230° (H = 760), en fournissant un

liquide huileux qui cristallise sur les parois du verre par refroidissement.

Ils sont peu solubles dans le chloroforme et dans l'éther; projetés dans une solution hydro-alcoolique de sublimé, ils donnent immédiatement un précipité blanc jaunâtre, grâce à la dissociation qui se produit. L'alcool anhydre les dissout sans décomposition. Ils précipitent par les chlorures d'or et de platine.

Ces caractères chimiques les différencient nettement des cristaux blancs déjà analysés et en font très vraisemblablement une tribromopyridine = $C^5H^2NBr^3$. L'analyse montre d'ailleurs qu'ils répondent à cette formule.

Dosage du brome.

	I	II	CALCULÉ pour $C^5H^2NBr^3$
	—	—	—
Substance	0,5672	0,450	»
AgBr	1,0103	0,7971	»
Br	0,42988	0,33916	»
Br p. 100	75,79	75,37	75,70

Dosage de l'azote.

	I	II	
	—	—	
Substance	0,4299	0,9577	»
Volume d'azote recueilli.	18 ^{cc} 3	36 ^{cc} 4	»
(t=11° 5 H=769,5) (t=12° H=769,4)			
Azote p. 100	5,12	4,45	4,42

Dosage du carbone (a été exécuté comme plus haut).

	I	II	
	—	—	
Substance	0,2943	0,4172	»
Nombre de cc. d'acide normal	8 ^{cc} 94	12 ^{cc} 62	»
Carbone correspondant	0,05364	0,0756	»
Carbone p. 100.	18,23	18,12	18,92

Monobromopyridine = C^5H^4NBr . — Si, à de la pyridine, on ajoute du brome avec ménagement et si l'on évapore au bain-marie l'excès

de ce dernier, on obtient, après évaporation du liquide, un résidu gommeux. Si l'on traite ce résidu par de l'alcool anhydre, on a, après quelques mois, la solution ayant été laissée sous cloche, des cristaux incolores, déliquescents, se dissociant facilement, surtout en présence des alcalis, qui les décomposent immédiatement en brome et pyridine. Tant qu'ils ne sont pas dissociés, ils paraissent indifférents au tournesol bleu et rouge. Leur solution alcoolique précipite par les chlorures d'or et de platine. Ils fondent à 212° .

L'analyse leur assigne la formule d'une *monobromopyridine* $= C^5H^4NBr$.

Dosage du brome.

		CALCULÉ pour C^5H^4NBr
		—
Substance.	0,452	»
AgBr.	0,5391	»
Br correspondant	0,2294	50,63

Dosage de l'azote.

	I	II	
	—	—	
Substance.	0,4185	0,4090	»
Volume d'azote recueilli.	31 ^{cc} 4	31 ^{cc} 6	»
(H = 770 t = 11°)	(H = 770	t = 11°)	
Azote p. 100	9,06	9,29	8,86

Dosage du carbone.

	I	II	CALCULÉ pour C^5H^4NBr
	—	—	—
Substance	0,2250	0,1832	»
Nombre de cc. d'acide normal.	14 ^{cc} 6	15 ^{cc}	»
Carbone correspondant.	0,08436	0,069	»
Carbone p. 100	37,49	37,7	37,97

Le *bromhydrate de pyridine* C^5H^5N, HBr , de réaction acide, ne saurait être assimilé à la *monobromopyridine*, C^5H^4NBr , de réaction alcaline,

E. Grimaux⁽¹⁾ avait obtenu un bromhydrate de pyridine bibromé ($C^5H^5NBr^2$) \cdot HBr par l'action du brome sur la pyridine; ce composé fond à 126°, et E. Grimaux lui assigne cette formule par analogie avec le bromure de quinoléine qu'il avait préparé antérieurement.

Une *tribromopyridine* $C^5H^3Br^3N$ a été signalée par Willstätter⁽²⁾ qui l'a obtenue en chauffant la tétrabromotropine avec de l'acide nitrique; elle fond à 167°-168°, et de plus ses propriétés sont tout à fait différentes des magnifiques cristaux rougeâtres que nous avons préparés.

Enfin, la *monobromopyridine* C^5H^4NBr , obtenue par nous cristallisée, se différencie de la bromopyridine d'Hofmann⁽³⁾, produit accessoire de la préparation de la dibromopyridine; le produit d'Hofmann, préparé également par G. Ciamician et Deanstedt⁽⁴⁾, en faisant agir le bromoforme sur le pyrrol potassé, est une huile distillant à 169°5, à la pression ordinaire. Enfin la monobromopyridine de G. Ciamician et P. Silber⁽⁵⁾, résultat de l'action du brome sur le chlorhydrate de pyridine, est une huile distillant à 174°.

Les trois dérivés bromés de la pyridine que nous signalons dans ce travail ne paraissent donc pas avoir été préparés.

Sur la solubilité réciproque de l'essence de térébenthine et de l'alcool aqueux :

V. — Résultats;

Par MM. M. VÈZES et R. BRÉDON.

I. — L'application de la méthode précédemment indiquée (Procès-verbaux de la Société des Sciences de Bordeaux, séance du 13 juin 1907) à divers mélanges d'essence de térébenthine et d'alcool aqueux nous a conduits aux résultats que nous allons maintenant exposer. Des mélanges en diverses proportions d'essence de térébenthine et

(1) E. GRIMAUX, *Bull. Soc. Chim.*, t. XXXVIII, 1882, p. 124.

(2) WILLSTÄTTER, in *Beilstein Chim. Organ.*, t. IV, p. 106.

(3) HOFMANN, in *Beilstein Chim. Organ.*, t. IV, p. 106.

(4) CIAMICIAN et DEANSTEDT, *Berich. der d. ch. G.*, t. XV, 1882, p. 1172.

(5) G. CIAMICIAN et P. SILBER, *Berich. der d. ch. G.*, t. XVIII, 1886, p. 721.

d'alcool aqueux à divers titres (94,7, 85,6, 76,8, 65,4, 49,6 et 18,4 volumétriques) ont été soigneusement agités, puis maintenus en repos pendant un temps suffisant pour l'établissement de l'équilibre; le tout à une température de 19,84, maintenue constante à moins de 0,02 près par un thermostat électrique Marie et Marquis. Il a été pris ensuite des échantillons des deux couches en équilibre à cette température de 19,84, et l'on a mesuré les indices de réfraction (pour la raie D) de ces échantillons après avoir laissé leur température s'élever jusqu'à 25,0. Comme nous l'avons déjà dit, ces données suffisent pour déterminer la composition des deux couches.

PREMIÈRE SÉRIE. — Mélanges d'essence et d'alcool aqueux à 94,7 volumétriques : $v = 94,7$, $\gamma = 0,921$ (1).

L'isotherme 19,84 (pratiquement confondue, au degré d'approximation adopté, avec l'isotherme 20,0) rencontre, dans le plan ZOV, la verticale $v = 94,7$ en deux points ayant respectivement pour ordonnées $z = 0,010$ et $z = 0,640$. Si donc on fait des mélanges d'essence et d'alcool à 94,7, seront hétérogènes à 19,84 ceux de ces mélanges dont la teneur z en alcool aqueux sera comprise entre 0,010 et 0,640. C'est entre ces limites qu'ont été faits les mélanges ci-dessous :

MÉLANGE GLOBAL		COUCHE SUPÉRIEURE			COUCHE INFÉRIEURE		
z	v	n	z	v	n	z	v
0,004	94,7	1,3798	0,845	89,3	1,4651	0,020	95,0
0,190	94,7	1,3846	0,766	92,6	1,4636	0,035	95,8
0,288	94,7	1,3873	0,734	93,3	1,4581	0,066	96,2
0,387	94,7	1,3887	0,719	93,6	1,4625	0,045	95,9
0,486	94,7	1,3893	0,713	93,7	1,4634	0,037	95,8
0,586	94,7	1,3899	0,705	93,9	1,4577	0,091	96,2

On voit par ces nombres que la couche supérieure est constituée surtout par de l'alcool aqueux (plus de 70 p. 100), la couche inférieure

(1) Nous désignons toujours par v le titre volumétrique ou degré alcoolique de l'alcool aqueux; par γ son titre pondéral; par z le poids d'alcool aqueux contenu dans l'unité de poids du mélange; par n l'indice de réfraction, par rapport au vide, pour la raie D et à la température de 25°.

surtout par de l'essence (moins de 10 p. 100 d'alcool aqueux). A mesure que l'on fait croître la dose d'alcool aqueux contenue dans le mélange global, on voit s'élever, tout en restant inférieur à 94°7, le titre de l'alcool aqueux contenu dans la couche supérieure et, par suite, on voit croître aussi la dose d'essence qu'il tient en dissolution. Dans la couche inférieure, au contraire, le titre de l'alcool aqueux reste à peu près le même, sa valeur (96° environ) étant naturellement supérieure à 94°7 et sa proportion restant toujours inférieure à 10 p. 100.

DEUXIÈME SÉRIE. — Mélanges d'essence et d'alcool aqueux à 85°6 volumétriques : $v = 85,6$, $\gamma = 0,803$.

Sont hétérogènes à 19°84, dans ce cas, les mélanges contenant au moins une trace et au plus 90,6 p. 100 d'alcool aqueux.

MÉLANGE GLOBAL		COUCHE SUPÉRIEURE			COUCHE INFÉRIEURE		
x	v	n	x	v	n	x	v
0,097	85,6	»	»	»	1,4655	0,016	95,0
0,195	85,6	1,3730	0,895	85,4	1,4645	0,027	95,6
0,295	85,6	1,3732	0,891	85,5	1,4641	0,030	95,7
0,394	85,6	1,3731	0,893	85,5	1,4650	0,021	95,0
0,493	85,6	1,3729	0,897	85,3	1,4645	0,027	95,6
0,594	85,6	1,3728	8,899	85,3	1,4645	0,027	95,6
0,694	85,6	1,3725	0,904	85,2	1,4654	0,017	95,0
0,796	85,6	1,3722	0,910	85,1	1,4653	0,018	95,0
0,898	85,6	1,3720	0,914	85,0	1,4650	0,021	95,0

On voit que la séparation de l'essence et de l'alcool est ici beaucoup plus complète que dans le cas précédent. La couche supérieure est encore formée d'alcool aqueux, de titre peu inférieur à 85°6, tenant en dissolution un peu d'essence (10 p. 100 environ); la couche inférieure est formée d'essence contenant au plus 3 p. 100 d'alcool fort (à 95° environ).

TROISIÈME SÉRIE. — Mélanges d'essence et d'alcool aqueux à 76°8 volumétriques : $v = 76,8$, $\gamma = 0,699$.

Sont hétérogènes à 19°84 les mélanges contenant au moins une trace et au plus 96,5 p. 100 d'alcool aqueux.

MÉLANGE GLOBAL		COUCHE SUPÉRIEURE			COUCHE INFÉRIEURE		
<i>x</i>	<i>v</i>	<i>n</i>	<i>x</i>	<i>v</i>	<i>n</i>	<i>x</i>	<i>v</i>
0,099	76,8	1,4651	0,020	95,0	1,3661	0,971	74,7
0,200	76,8	1,4647	0,025	95,7	1,3666	0,966	76,5
0,301	76,8	1,4643	0,028	95,7	1,3664	0,968	75,8
0,401	76,8	1,4641	0,030	95,8	1,3665	0,967	76,1
0,501	76,8	1,4640	0,031	95,8	1,3664	0,968	75,8
0,600	76,8	1,4641	0,030	95,8	1,3661	0,971	74,7
0,701	76,8	1,4641	0,030	95,8	1,3658	0,974	73,7
0,801	76,8	1,4641	0,030	95,8	1,3656	0,976	73,0
0,900	76,8	1,4641	0,030	95,8	1,3656	0,976	73,0

Tandis que l'alcool à 94°7 et l'alcool à 85°6 sont plus légers que l'essence (leurs densités à 15° sont 0,8166 et 0,8470, celle de l'essence étant 0,8660 à cette même température), l'alcool à 76°8 est plus lourd (densité 0,8720 à 15°), et il en est de même *a fortiori* des alcools aqueux à plus bas titre⁽¹⁾. De là résulte une intervention de l'ordre des deux couches. La couche supérieure est maintenant la couche riche en essence : elle ne contient plus que 2 à 3 p. 100 d'alcool fort (à 95° environ). La couche inférieure est la couche alcoolique, formée d'alcool aqueux de titre peu inférieur à 76°8, avec environ 3 p. 100 d'essence.

QUATRIÈME SÉRIE. — Mélanges d'essence et d'alcool aqueux à 65°4 volumétriques : $v = 65,4$, $\gamma = 0,576$.

Sont hétérogènes à 19°84 les mélanges contenant au moins une trace et au plus 99,3 p. 100 d'alcool aqueux.

MÉLANGE GLOBAL		COUCHE SUPÉRIEURE			COUCHE INFÉRIEURE		
<i>x</i>	<i>v</i>	<i>n</i>	<i>x</i>	<i>v</i>	<i>n</i>	<i>x</i>	<i>v</i>
0,103	65,4	1,4651	0,020	95,0	1,3621	0,997	62,0
0,205	65,4	1,4651	0,017	94,7	1,3626	0,995	63,4
0,307	65,4	1,4650	0,021	95,0	1,3627	0,995	64,1
0,409	65,4	1,4655	0,016	94,7	1,3629	0,993	65,1
0,509	65,4	1,4654	0,017	94,7	1,3627	0,995	64,1
0,609	65,4	1,4655	0,016	94,7	1,3628	0,994	64,8
0,707	65,4	1,4655	0,016	94,7	1,3626	0,995	63,4
0,806	65,4	1,4657	0,014	94,6	1,3626	0,995	63,4
0,903	65,4	1,4655	0,016	94,7	1,3626	0,995	63,4

⁽¹⁾ L'alcool à 79°0 ayant sensiblement même densité que l'essence, c'est pour cette valeur du titre alcoolique que l'intervention des couches commencera à se produire.

Comme dans le cas précédent, la couche supérieure est formée d'essence, retenant encore de 1,5 à 2 p. 100 d'alcool fort (à 95° environ). La couche inférieure est formée d'alcool aqueux, de titre peu inférieur à 65°4, et retenant encore environ 0,5 p. 100 d'essence.

CINQUIÈME SÉRIE. — Mélanges d'essence et d'alcool aqueux à 49°6 volumétriques : $v = 49,6$, $\gamma = 0,421$.

Sont hétérogènes à 19°84 tous les mélanges possibles, sauf ceux constitués par l'un des deux liquides associé à une trace de l'autre.

Dans ce cas, comme dans celui qui va suivre, nous ne donnons, en ce qui concerne la couche inférieure, que les indices mesurés; le calcul de z et de v par la méthode employée dans les cas qui précèdent exigerait en effet ici une extrapolation excessive.

MÉLANGE GLOBAL		COUCHE SUPÉRIEURE			COUCHE INFÉRIEURE
x	v	n	z	v	n
0,106	49,6	1,4657	0,014	94,6	1,3568
0,303	49,6	1,4658	0,012	94,5	1,3576
0,316	49,6	1,4658	0,012	94,5	1,3578
0,419	49,6	1,4657	0,014	94,6	1,3578
0,518	49,6	1,4659	0,010	94,5	1,3578
0,617	49,6	1,4657	0,014	94,6	1,3578
0,714	49,6	1,4659	0,010	94,5	1,3578
0,812	49,6	1,4657	0,014	94,6	1,3578
0,906	49,6	1,4658	0,012	94,5	1,3578

Ici la séparation est devenue à peu près complète. La couche d'essence (couche supérieure) contient encore un peu d'alcool fort (1 à 1,4 p. 100 d'alcool à près de 95°); mais la couche inférieure est formée d'alcool aqueux (à un titre vraisemblablement peu inférieur à 49° volumétriques) ne retenant que des traces d'essence, comme le montre le faible écart de ses indices avec celui (1,3573) de l'alcool à 49°6 employé.

SIXIÈME SÉRIE. — Mélanges d'essence et d'alcool aqueux à 18°4 volumétriques : $v = 18,4$, $\gamma = 0,150$.

Sont hétérogènes à 19°84 tous les mélanges possibles de ces deux liquides,

MÉLANGE GLOBAL		COUCHE SUPÉRIEURE		COUCHE INFÉRIEURE
x	v	n	x	n
0,110	18,4	1,4668	0	1,3433
0,219	18,4	1,4668	0	1,3434
0,328	18,4	1,4668	0	1,3433
0,429	18,4	1,4668	0	1,3433
0,530	18,4	1,4668	0	1,3433
0,627	18,4	1,4668	0	1,3432
0,725	18,4	1,4668	0	1,3430
0,820	18,4	1,4668	0	1,3432
0,910	18,4	1,4668	0	1,3433

L'essence employée dans cette dernière série d'expériences diffère un peu de celle qui a servi aux autres séries : ses caractéristiques physiques sont :

Densité à 25° 0,8590

Indice de réfraction à 25° (raie D). . . 1,4668

Rotation (tube de 100^{mm}, raie D). . . . — 33°0

On voit que la couche supérieure est formée d'essence pure. La couche inférieure est formée d'alcool aqueux à 18°4 volumétriques, ne retenant que d'infimes traces d'essence, comme le montre le très faible écart de ses indices avec celui (1,3430) de l'alcool aqueux employé. La séparation peut donc être considérée ici comme complète.

Il est à noter dans ce dernier cas — et aussi, à un moindre degré, dans le précédent — que l'émulsion provoquée par l'agitation du mélange est très longue à se résoudre, à la température constante de 19°34, en deux couches nettement distinctes : il faut attendre plusieurs jours pour pouvoir procéder à la prise des échantillons et à la mesure des indices, tandis qu'il suffisait d'une vingtaine d'heures dans les expériences des premières séries. Ce phénomène est d'autant plus marqué qu'il s'agit de mélanges plus riches en alcool aqueux.

II. — Les résultats qui précèdent permettent de nous rendre compte de l'effet produit par une addition progressive d'eau à un mélange donné d'essence et d'alcool.

Soit par exemple, un mélange d'essence et d'alcool à 95° volumétriques ($\gamma = 0,924$), contenant au plus 42 p. 100 d'essence ($z \geq 0,580$), et par conséquent homogène à 20° ou aux températures supérieures. Supposons, pour fixer les idées, que sa teneur en essence soit de 20 p. 100 ($z = 0,800$). La composition pondérale de ce mélange sera alors :

Essence.	0,200	. . . = 0,200	
Alcool.	$0,800 \times 0,924$	$= 0,739$	} 0,800
Eau.	$0,800 \times 0,076$	$= 0,061$	
		<u>1,000</u>	

La température étant constamment égale à 20°, ajoutons progressivement de l'eau, en agitant fortement après chaque addition nouvelle, et laissant ensuite reposer. Nous ferons ainsi décrire au point figuratif du système, dans le plan ZOV, une ligne différant peu d'une parallèle à OV dirigée vers les V décroissants. Après addition de 1 p. 100 d'eau, par exemple, le mélange, primitivement défini par les nombres $z = 0,800$, $v = 95,0$, aura acquis la composition suivante :

Essence.	0,200	
Alcool.	0,739	} 0,810
Eau.	0,071	
	<u>1,010</u>	

d'où

$$z_1 = \frac{0,810}{1,010} = 0,802$$

et

$$\gamma_1 = \frac{0,739}{0,810} = 0,912$$

d'où

$$v_1 = 94,0$$

Après addition de 2 p. 100 d'eau, on aurait de même :

Essence.	0,200	
Alcool.	0,739	} 0,820
Eau.	0,081	
	<u>1,020</u>	

d'où

$$\begin{aligned} z_1 &= 0,804 \\ \gamma_1 &= 0,901 \\ v_1 &= 93,3 \end{aligned}$$

et après addition de 10 p. 100 d'eau :

Essence	0,200	} 0,900
Alcool.	0,739	
Eau.	0,161	
	<hr/> 1,100	

d'où

$$\begin{aligned} z_{10} &= 0,816 \\ \gamma_{10} &= 0,821 \\ v_{10} &= 87,1 \end{aligned}$$

Mais la ligne ainsi décrite

$$\begin{bmatrix} z = 0,800 \\ v = 95,0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} z_1 = 0,802 \\ v_1 = 94,0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} z_2 = 0,804 \\ v_2 = 93,3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} z_{10} = 0,816 \\ v_{10} = 87,1 \end{bmatrix}$$

coupe l'isotherme 20° au point

$$\begin{bmatrix} z = 0,808 \\ v = 91,2 \end{bmatrix}$$

qui correspond à une addition d'un peu plus de 4 p. 100 d'eau. Donc, après addition d'un peu plus de 4 p. 100 d'eau, on verra le mélange, jusque-là homogène après agitation et repos, se séparer en deux couches, par suite de l'apparition d'une couche inférieure riche en essence.

Lorsque, par addition d'environ 12 p. 100 d'eau, la composition brute du mélange global aura atteint la valeur

$$\begin{bmatrix} z = 0,821 \\ v = 85,6 \end{bmatrix}$$

la composition des deux couches sera la suivante, comme on le voit

en interpolant les nombres contenus dans le second des tableaux ci-dessus :

$$\begin{aligned} \text{Couche supérieure : } & \begin{cases} z = 0,911 \\ v = 85,1 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{Alcool à } 85^{\circ}1, \text{ contenant environ} \\ 9 \text{ p. } 100 \text{ d'essence.} \end{array} \right. \\ \text{Couche inférieure : } & \begin{cases} z = 0,019 \\ v = 95,0 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{Essence contenant environ } 2 \text{ p. } 100 \\ \text{d'alcool à } 95^{\circ}. \end{array} \right. \end{aligned}$$

L'addition d'eau continuant, on verra se produire l'intervention des deux couches lorsque la composition du mélange global sera voisine de

$$\begin{cases} z = 0,836 \\ v = 79,0 \end{cases}$$

c'est-à-dire lorsqu'il aura été ajouté environ 22 p. 100 d'eau.

Lorsque, après addition de 25,5 p. 100 d'eau environ, la composition brute du mélange global aura atteint la valeur

$$\begin{cases} z = 0,841 \\ v = 76,8 \end{cases}$$

la composition des deux couches sera la suivante (tableau de la 3^e série) :

$$\begin{aligned} \text{Couche supérieure : } & \begin{cases} z = 0,030 \\ v = 95,8 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{Essence contenant environ } 3 \text{ p. } 100 \\ \text{d'alcool à } 95^{\circ}8. \end{array} \right. \\ \text{Couche inférieure : } & \begin{cases} z = 0,976 \\ v = 73,0 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{Alcool à } 73^{\circ} \text{ contenant environ} \\ 2,5 \text{ p. } 100 \text{ d'essence.} \end{array} \right. \end{aligned}$$

Lorsque, après addition d'un peu plus de 48 p. 100 d'eau, la composition brute du mélange aura atteint la valeur

$$\begin{cases} z = 0,865 \\ v = 65,4 \end{cases}$$

la composition des deux couches sera la suivante (tableau de la 4^e série) :

$$\begin{aligned} \text{Couche supérieure : } & \begin{cases} z = 0,015 \\ v = 94,6 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{Essence contenant environ } 1,5 \text{ p. } 100 \\ \text{d'alcool à } 94^{\circ}6. \end{array} \right. \\ \text{Couche inférieure : } & \begin{cases} z = 0,995 \\ v = 63,4 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{Alcool à } 63^{\circ}4, \text{ contenant environ} \\ 0,5 \text{ p. } 100 \text{ d'essence.} \end{array} \right. \end{aligned}$$

Lorsque, après addition d'un peu plus de 95 p. 100 d'eau, la composition brute du mélange aura atteint la valeur

$$\begin{cases} z = 0,898 \\ v = 49,6 \end{cases}$$

la composition des deux couches sera la suivante (tableau de la 5^e série) :

Couche supérieure :	$\begin{cases} z = 0,012 \\ v = 94,5 \end{cases}$	{	Essence contenant environ 1,2 p. 100 d'alcool à 94,5.
Couche inférieure		{	Alcool à près de 49°, contenant des traces d'essence.

Enfin, lorsque, après addition de 413 p. 100 d'eau, la composition brute du mélange aura atteint la valeur

$$\begin{cases} z = 0,961 \\ v = 18,4 \end{cases}$$

la composition des deux couches sera la suivante (tableau de la 6^e série) :

Couche supérieure	Essence pure.
Couche inférieure	{ Alcool à 18° 4, ne retenant que des traces infimes d'essence.

On voit par ces nombres que, étant donné un mélange d'essence de térébenthine et d'alcool, il n'est pas possible d'en séparer intégralement les constituants sans abaisser en même temps d'une façon très sensible le titre de l'alcool que l'on en retire.

De l'Imprégnation, par la Méthode à l'argent réduit de Cajal, des Neurofibrilles du Lumbricus, consécutivement à l'action du froid;

Par M. J. KOWALSKI.

(Note préliminaire.)

Par une « singularité chimique » des cellules nerveuses ganglionnaires du Lumbric, la Méthode de Cajal au nitrate d'argent (après

fixation au formol ammoniacal) n'a jamais donné aucune imprégnation des neurofibrilles.

On sait cependant quels beaux résultats cette méthode a donnés entre les mains du savant histologiste de Madrid, entre celles de ses élèves et de bien d'autres histologistes; mais appliquée par Cajal lui-même au ver de terre, elle ne lui a jamais manifesté les neurofibrilles des cellules ganglionnaires de la chaîne ventrale du *Lumbricus*. S'il a réussi à les manifester, c'est par la méthode à l'or réduit.

Pour nous faire la main à la méthode de l'argent, ignorant encore les essais infructueux de Cajal, nous choisîmes le *Lombric* comme objet de nos essais.

Dès nos premières tentatives, en suivant scrupuleusement le procédé de Cajal, nous obtînmes l'imprégnation des neurofibrilles.

D'autres essais postérieurs ne nous donnèrent plus de résultat jusqu'au jour où nous voulûmes essayer l'influence du froid sur les neurofibrilles.

Ayant soumis des vers à une température de -5° environ, pendant un quart d'heure, nous les sacrifiâmes et les soumîmes au même traitement que dans nos essais précédents. Dès ce premier essai de refroidissement, les neurofibrilles refirent leur apparition. L'imprégnation était excellente.

Étonné de cette réapparition de l'imprégnation, que le froid semblait avoir aidée, nous eûmes l'idée de rechercher si nos premiers essais tentés le 21 janvier 1907 n'avaient pas été faits avec une température très refroidie et si, par suite, sans que nous l'ayons voulu, le froid avait fait sentir son influence sur les animaux traités et avait créé un état physiologique particulier avec un état chimique spécial qui avait favorisé l'imprégnation.

Or, en effet, la moyenne de la température du 21 janvier avait été de $1^{\circ}2$, le minimum $-2^{\circ}9$. La température moyenne de la semaine où les animaux furent conservés dans une pièce non chauffée, fut enfin de $-0^{\circ}5$. Elle fut inférieure à la température normale : $2^{\circ}1$ de $2^{\circ}6$.

Les conditions de température étaient donc, dans les deux essais, sinon identiques, du moins analogues.

D'autres expériences nous diront si effectivement c'est bien à une action du froid qu'est due chez le *Lombric* l'imprégnation des neurofibrilles, qui à l'état normal se montrent réfractaires à l'argent. Il

nous le semble déjà, car les neurofibrilles de nos préparations présentent les caractères d'hypertrophie et d'épaississement qui ont été signalés par divers auteurs, Cajal, Marmisco, Dustin, Telbo, etc., soit chez des animaux (Vertébrés et Invertébrés) soumis à un froid artificiel, soit chez des animaux soumis au froid naturel et en état d'hibernation.

Cette hypertrophie des neurofibrilles est surtout prononcée dans la zone de la cellule où aboutissent les prolongements afférents ou dendritiques. Il semblerait que la perturbation première, due au froid, se manifeste d'abord dans cette zone. Cela est surtout visible dans les cellules bipolaires, en chapeau de gendarme, comme les a désignés M. de Nabias, dans ses recherches histologiques sur les centres nerveux des Gastéropodes... Nous signalerons aussi dans ces cellules l'excentricité du noyau. Elle y est excessivement frappante... C'est toujours dans le cône d'émergence de l'axone que le noyau se trouve placé.

En terminant, nous voulons noter aussi l'imprégnation des cellules nerveuses intestinales du Lombric. Le réseau intra-cellulaire y apparaît nettement à mailles très larges... Le froid ne semble pas y avoir fait sentir son action, car les neurofibrilles sont fines, sans épaississement ni grumeaux dans la trame qu'elles forment. Ce sont des cellules multipolaires, logées en nombre considérable dans le tissu conjonctif situé à la base des replis longitudinaux du tube digestif. Elles semblent analogues, sauf les deux réseaux périphérique et périnucléaire, à celles qu'Azonlay a décrites dans le tissu conjonctif autour du tube digestif de la sangsue.

Le fluor et les produits œnologiques;

Par M. P. CARLES.

Les fluorures sont des antiferments pour boissons dont la loi française des fraudes interdit l'usage. Bien qu'ils soient, au contraire, tolérés dans d'autres pays viticoles, cette interdiction nous paraît légitime. Ce n'est pas parce que les doses que l'on ajoute ordinairement soient susceptibles de nuire à la santé, mais parce qu'on serait

amené inconsciemment à élever si bien ces doses qu'elles finiraient par devenir nuisibles⁽¹⁾. L'exemple suivant va nous le faire pressentir.

Il y a quelques mois, une honorable maison du Midi avait vendu des vins blancs, dits de liqueur, à une maison de Bordeaux des plus scrupuleuses dans ses achats. Les vins, agréés à destination, sauf analyse défavorable, furent refusés. La chimie les trouvait incontestablement fluorurés. L'expéditeur fut décontenancé. De bonne foi réelle, il confirma que le vin avait été fait sous sa surveillance directe avec des moûts de raisins rouges vinifiés en blanc et concentrés; mais que jamais on ne les avait traités par des agents fluorurés. S'ils contiennent du fluor, dit-il, c'est que la nature l'y a mis ou que mes fournisseurs en ont glissé dans le noir animal, le tannin ou les clarifiants dont je me suis servi.

Il nous a paru d'intérêt général de discuter ces réserves.

NATURE. — Emprisons-nous de reconnaître que des traces de fluorures doivent exister dans la sève de la vigne, puisqu'on en retrouve dans les cendres de sarment. Cependant nous n'avons pu en relever dans celles des marcs de vendange. Il semble que ce soit à cause de la nature acide du vin, suffisante pour les entraîner en dissolution. Ce qui donne crédit à cette hypothèse, c'est qu'on en retrouve des traces dans quelques vins. Toutefois elles n'apparaissent guère alors qu'en alcalinisant le vin, sans quoi le fluor n'y est insolubilisé ni par la chaux ni par la baryte⁽²⁾.

NOIR ANIMAL. — Lorsqu'on recherche le fluor dans les noirs décolorants destinés à l'œnologie, il n'est pas rare de l'y rencontrer de façon des plus nettes. Ce fait mérite d'en dévoiler les origines.

Le noir animal, chacun le sait, provient de la calcination en vase

(1) Les fluorures comme les phosphates sont utiles à la formation du système osseux et spécialement du système dentaire. Mais c'est toujours à dose très faible, sans quoi l'organisme de certains sujets les éliminerait difficilement et ils en souffriraient. Pareille chose arrive avec le sel marin qu'on considère d'action indifférente; lui aussi est utile, inutile ou nuisible selon la dose ingérée.

(2) Quand on traite les vins par l'acétate de chaux ou mieux celui de baryte pour insolubiliser les fluorures, une notable partie reste en dissolution. La proportion paraît être en rapport avec le degré d'acidité du liquide. Pour en avoir la preuve, il suffit d'alcaliniser légèrement par l'ammoniaque le liquide filtré contenant un excès de sel de baryte. Souvent ce deuxième précipité est plus riche en fluor que le premier.

clos des os des grands mammifères domestiques. Or, il n'existe nulle part et dans aucune espèce animale des os sans fluorures terreux. La nature les y a placés à dessein à côté des carbonates et des phosphates calcaires.

Lorsque ce noir est destiné à la décoloration des vins, il est utile qu'il soit lavé à l'eau chlorhydrique. Cet acide enlève non seulement les carbonates et la majeure partie des phosphates dont la nature basique affadirait les vins, mais il rend aussi le carbone restant plus poreux et plus actif.

Or, l'acide dissout d'abord les carbonates, les phosphates ensuite, tandis que les fluorures ne viennent que les derniers; de telle sorte que si on ménage trop l'acide, les fluorures ont une tendance à s'accumuler pour ainsi dire dans les dernières parties, dans celles qu'on garde précisément pour l'emploi œnologique.

Voyons un autre point :

Tous les sels calcaires solubilisés par l'eau chlorhydrique ne se séparent pas brusquement du noir très poreux. Pour les enlever, il faut soumettre le noir déposé à une série de lavages à l'eau. Mais ces lavages ne sont pas des lessivages ou déplacements. S'ils entraînent ces sels, c'est par diffusion et dilutions successives. Voilà pourquoi, après avoir décalcifié 100 grammes de noir par autant d'acide chlorhydrique dilué dans un litre d'eau et procédé ensuite à huit lavages, chacun avec un litre d'eau, nous avons encore retrouvé nettement du fluor dans les eaux de ce dernier.

Disons même que quelques grammes de ce noir *essoré*, traités par de l'eau tartriquée à 8 grammes par litre, ont fourni encore assez de fluor pour graver le verre.

Tous ces faits nous disent qu'il n'est pas aussi aisé qu'on se l' imagine de priver les noirs lavés à l'acide de leur fluor naturel. On conçoit donc qu'après tous les lavages à l'eau nécessaires, ils soient encore susceptibles de céder du fluor aux vins très acides et plus aisément encore à leurs moûts, dont le degré d'acidité est généralement le double.

En dehors de ce qui précède, on rencontre encore des noirs en pâte ⁽¹⁾ qui, quoique bien réduits à l'état de carbone hydraté, sont si

(1) Dans ces conditions, l'eau qu'ils retiennent remplace sensiblement le poids des sels que l'acide a dissous.

franchement fluorurés qu'il y a lieu de chercher à ce fluor une autre origine. C'est qu'en réalité il y a été ajouté, tardivement le plus souvent, sous forme d'acide hydrofluosilicique. L'intervention de cet acide a pour but d'empêcher la pullulation des moisissures dès que le noir est mis à l'air.

La théorie dit bien que cet acide passe dans les lies dès qu'il est mis au contact des sels de potasse du vin : mais cette précipitation est très lente dans les vins acides. On dirait même qu'elle n'y est que partielle ; aussi n'est-il pas étonnant que les vins ainsi traités acquièrent de ce côté une part de leur fluoruration artificielle.

TANNINS. — Avec les tannins aurons-nous encore à suspecter la présence du fluor ?

S'il était possible de s'en tenir au tannin pur à l'éther, dit de Pelouze, on pourrait être rassuré, car dans les échantillons essayés nous n'en avons pas décelé de traces.

Mais il faut être circonspect avec les tannins dits à l'alcool ou à l'eau, car avec quelques bonnes marques nous avons pu déjà graver nos plaquettes de verre.

Quant aux tannins communs, à ceux qu'on a baptisés tannins pour vins rouges, probablement parce qu'ils donnent des solutions toujours très colorées et de trouble persistant, ils nous ont tous fourni des gravures dénotant du fluor en très sensible proportion (1).

N'oublions pas que ces espèces sont fort impures, puisque, à poids égal, elles précipitent de 35 à 40 p. 100 de gélatine de moins que les précédentes.

Ces faits méritent encore un commentaire.

Lorsqu'on recherche le fluor dans les cendres de chêne, on l'y retrouve de façon nette, mais sans abondance.

Si on répète l'opération sur 50 grammes de galles d'Alep (2), d'où

(1) Pour rechercher le fluor dans le tannin on peut procéder de deux façons :

1° Le faire dissoudre dans dix fois son poids d'eau et verser dans la solution du chlorure de baryum et de l'acétate de potasse. Laisser déposer, filtrer, laver, calciner le filtre et traiter les cendres par l'acide sulfurique dans un creuset recouvert de la plaque de verre cirée ordinaire.

2° Ou, moins bien, arroser le tannin avec de l'eau de baryte *bien limpide*, calciner, laver les cendres à l'eau acétique et finalement les traiter par l'acide sulfurique et le verre ciré avec réserves.

(2) Les galles concassées sont mises à digérer une nuit dans de l'eau de baryte *bien limpide* et calcinées. Les cendres sont traitées comme du tannin ci-dessus.

l'on extrait ordinairement le tannin, on ne l'y rencontre plus, quoique elles aient été alimentées exclusivement avec la sève du chêne. Avec les galles de Chine, au contraire, fournies par le *Rhus japonica* ou autres, on en rencontre des quantités nettes. 25 grammes suffisent à donner une gravure lisible. Ces galles servent aussi à l'extraction du tannin commercial.

Malgré ces résultats positifs, nous estimons que lorsqu'on retire du tannin commercial assez de fluor pour graver très nettement le verre, c'est qu'il a été volontairement ajouté. La combinaison employée en pareil cas doit être encore l'acide fluosilicique. Si on a recours à lui, c'est pour empêcher les moisissures d'infester le produit d'expression des galles; car on sait que ces liquides constituent pour elles un bon bouillon de culture et qu'elles transforment le tannin en dérivés œnologiquement inertes. Comme les basses matières donnant des tannins de qualité secondaire moisissent plus aisément que les autres, on conçoit que la proportion de fluorures trouvée ci-dessus soit en raison inverse de la qualité du tannin.

CLARIFIANTS POUR VINS. — Depuis quinze ans on en a créé des centaines de marques. La plupart sont formés de gélatines blanches destinées aux vins blancs ou aux vins rouges légers, et de gélatines foncées pour les vins rouges.

Comme la plupart de ces colles, les dernières surtout, sont extraites des os et que nous avons dit plus haut que tous les os sans exception renferment du fluor naturel, nous avons pensé qu'il n'était pas indifférent de savoir si dans leur fabrication les gélatines n'en entraînaient pas. A cet effet, nous en avons traité 25 grammes comme le tannin de tout à l'heure, mais aucune trace sur le verre ne s'est manifestée.

Et cependant, bien des clarifiants contiennent du fluor en sensible proportion. Son origine est encore l'acide fluosilicique, qu'à cause de son manque d'odeur et de sa constance on préfère à l'acide sulfureux autrefois employé.

En résumé : La quantité de fluor naturel que renferment parfois les vins est seule utile à notre organisme et pondéralement négligeable.

Dans le noir animal préparé pour l'œnologie, on en trouve quelquefois des quantités très sensibles, partie naturelle, sans inconvénients hygiéniques, partie ajoutée pour éloigner les moisissures.

Le tannin de Pelouze n'en renferme pas, mais il y a des tannins de

qualité avec lequel on peut graver le verre. Les tannins communs en contiennent davantage encore. Une partie de ce fluor peut provenir non des galls d'Alep, mais des galls de Chine. La majeure partie doit toutefois avoir été ajoutée pour éloigner les moisissures décomposantes dans les traitements des galls.

Il n'y a pas de fluor dans les gélatines, mais on en trouve quelquefois dans les clarifiants. Il paraît provenir de l'addition d'acide fluosilicique, agent de conservation fixe et inodore.

CONCLUSIONS. — D'après ce qui précède, un récoltant peut voir son vin suspecté de fraude au fluor, s'il l'a soigné avec des produits œnologiques tels que ceux qui précèdent. Comme il est prudent de ne pas permettre l'accumulation des fluorures dans les boissons, l'interdiction légale est fondée. La loi est sage de ne tolérer que l'emploi de tannins et de noirs commercialement purs. Aux intéressés avertis à prendre leurs mesures en conséquence.

Séance du 7 novembre 1907.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUCH

L'intoxication plombique par la vaisselle culinaire;

Par le Dr P. CARLES.

Il y a longtemps que cette intoxication existe, que les hygiénistes la dénoncent et que les médecins connaissent ses effets; effets d'autant plus funestes qu'ils se produisent sournoisement au début par des symptômes imprécis quoique sérieux.

Avec nos mœurs démocratiques actuelles, il est bon de le rappeler au public. Certains spécialistes ont même le devoir de le répéter entre temps, afin que chacun se tienne en garde. Ce devoir est même d'autant plus impérieux que, dans ce public, ceux qui pâtiennent le plus de cet état de choses appartiennent en très grande majorité à la classe ouvrière, c'est-à-dire à celle que son incompétence rend incons-

ciente du mal qui l'attend. Quant aux autres victimes, les plus nombreuses après les précédentes, ce sont les gens des petites villes, des bourgs et même des villages, de toutes les agglomérations enfin où l'hygiène est le moins observée et le moins armée pour la défense.

Quand on parcourt ces localités, il n'est pas rare de trouver sur une grande voie, mais toujours dissimulé dans un coin, un étameur de vaisselle culinaire, ayant la spécialité de la fonderie des cuillères d'étain; car c'est la partie la plus rémunératrice de son métier. Il blanchit bien les fourchettes de fer, mais si on consent à faire le sacrifice d'un peu d'étain et si on ajoute une petite rémunération, il sait assortir les fourchettes aux cuillères et en faire des couverts aux goûts modernes.

Le prix de la refonte est si modique qu'il est difficile de résister à la tentation. Il se rencontre toutefois des méfiants. Alors l'industriel leur propose de venir eux-mêmes mettre le vieil étain dans le creuset, ils le verront fondre et même mouler. En un quart d'heure ils seront servis.

Cependant, si ce témoin soupçonneux reste jusqu'au bout, on lui dit : « Nous allons, à nos frais, ajouter un supplément de métal apte à revivifier le vieux, à lui donner du corps et de l'éclat ! »

Hâtons-nous de déclarer que ce régénérateur est formé de plomb et d'antimoine. La ménagère a donné de l'étain pur ou à peu près, et on lui rend un alliage où cet étain ne figure plus que pour moitié. L'analyse dénote, en effet, qu'il est formé de : étain 50, antimoine 15 et plomb 35; le tout pour 100 parties.

Si l'ignorant qui s'est laissé ainsi duper n'y était que pour une perte financière déjà bien sensible (le prix du plomb est un peu moins du dixième de celui de l'étain), le préjudice causé ne serait pas trop grand pour lui; mais en échange de la moitié de son étain, métal bien salubre, il a reçu de l'antimoine et du plomb, métaux toxiques, dont le dernier surtout est spécialement à redouter.

Qu'on ne croie pas, en vérité, qu'à cause du mélange avec l'étain, le plomb va être préservé de l'attaque dissolvante des aliments. A propos de l'action dissolvante du plomb par certaines eaux potables, nous avons démontré que cette action est d'autant plus rapide et profonde que le plomb est plus impur, ou, ce qui est plus exact, allié à un plus grand nombre de métaux et que ces métaux sont plus abondants. (*V. Journ. ph. et chim.*, XII, 1900, p. 517.)

Pour être témoin de l'attaque, il n'y a qu'à mettre les cuillères ou

fourchettes dans de l'eau vinaigrée et on constatera au bout de quelques heures que cette eau brunit fortement avec une addition d'hydrogène sulfuré, ou moins bien avec une dissolution étendue de foie de soufre des pharmacies. On arrive même parfois à obtenir un précipité avec le chromate de potasse.

Quant à l'antimoine, il résiste mieux. Voilà pourquoi, lorsque les salades, tomates, oseille et aliments acides de toute nature ont dissous la majeure partie du plomb le plus superficiel, les belles cuillères du fraudeur deviennent noires. Cette couleur est en partie provoquée par l'antimoine dont c'est la teinte.

Au surplus, ces couverts, à cause même du plomb, sont beaucoup plus sensibles que l'étain blanc et salubre à l'oxydation initiale et à la sulfuration noire que détermine le soufre de l'oignon, de l'ail, des navets, des choux, des œufs et autres, de telle sorte que, du mirage du début, il ne reste bientôt à la ménagère que des couverts sans valeur marchande et plus noirs que n'eût été jamais l'étain.

Quant à l'insalubrité, elle diminue sans doute avec l'usage, mais elle est toujours présente et prête à se manifester brusquement. Voici comment :

Par suite de la dissolution du plomb superficiel, et du contact du corps gras, il se forme à la surface de ces couverts une couche de minuscule épaisseur formée d'étain, d'antimoine, de sulfure et d'oléate de plomb. Elle est très adhérente. Cette couche est peu accessible, il faut le reconnaître, à l'action dissolvante de la plupart de nos aliments. Sa protection est d'autant plus puissante et efficace qu'elle est plus ancienne, plus noire et, ainsi que le dit le vulgaire, que les couverts sont plus culottés.

Mais le jour où une ménagère jalouse de son matériel les décape et récure avec de la cendre, du sable ou du papier à verre, afin d'en faire des couverts d'argent(!), alors le plomb, mis à nu, se dissout brusquement sans que nos organes en soient en rien avertis ; mais sa présence se manifeste vite avec les conséquences sournoises et graves que nous avons fait pressentir.

La malpropreté, en pareil cas, est un gage de santé !

C'est cette irrégularité dans la protection du plomb sous-jacent qui a mis les hygiénistes en désaccord à son sujet. C'est elle qui a fait dire à Proust que l'alliage de 1 d'étain et 3 de plomb ne cède pas de plomb à l'acide acétique, tandis que Pleischl affirme qu'il y a toujours

dissolution, quelles que soient les proportions de l'alliage. Quant à Roussin, il a écrit que l'alliage à 5 p. 100 de plomb ne cède rien à l'acide acétique, qu'il faut arriver pour cela à 10 p. 100 de plomb (*Dict. Wurtz, art. Plomb*).

Voici, du reste, ce que nos grands maîtres en hygiène et en toxicologie disent du plomb :

« L'empoisonnement par le plomb et ses nombreuses préparations est de beaucoup le plus fréquent de tous, si on compte les cas où il résulte soit de l'exercice de certaines professions soit de l'usage de certaines substances alimentaires, altérées par des mélanges ou des falsifications. » (Tardieu et Roussin, 714, art. *Plomb*.)

Quant au professeur A. Gautier, il a écrit dans son *Cours de chimie*, p. 593 :

« Les effets du plomb sont d'autant plus redoutables qu'ils sont au début lents, obscurs, insidieux et faciles à confondre avec les symptômes qui se manifestent à la suite d'une foule de causes banales de débilitation. »

Quel remède apporter à pareille situation ?

C'est de signifier aux municipalités qu'elles ont la responsabilité des fraudes, surtout quand elles se passent en pleine rue plus qu'ailleurs. C'est de leur démontrer qu'elles ne peuvent arguer de leur incompetence puisqu'elles ont toujours pour les conseiller, en pareil cas, des pharmaciens et des médecins, gardiens naturels de la santé publique. C'est de leur rappeler qu'il existe, pour la sauvegarde de l'hygiène, un conseil officiel au chef-lieu d'arrondissement : qu'il y en a un plus important au chef-lieu de département. C'est de leur dire, enfin, que si on a mis naguère un certain retentissement dans la création de chimistes officiels régionaux, c'est non seulement pour déceler le mouillage du vin ou autres fraudes, hygiéniquement bénignes ou contestables, mais surtout pour réprimer celles qui sont anciennes, d'insalubrité incontestée et qui s'insinuent chez le faible et le pauvre de préférence.

En procédant à cette répression, nous estimons qu'on sera aussi utile à la santé publique qu'en procédant à la désinfection à domicile à la suite de maladies contagieuses, qu'en établissant des bains-douches, des débits de tempérance, des crèches et autres œuvres officielles ou officieuses, dont quelques-unes sont tout à l'honneur de grands philanthropes modernes.

En résumé, le genre de fraude que nous venons de dénoncer une nouvelle fois est aussi nuisible à la santé publique que banal. Celui qui se produit avec les étamages directs est aussi commun et plus nuisible peut-être encore⁽¹⁾. Pour les combattre on n'a jamais été aussi bien outillé qu'avec le ministère des nouveaux chimistes officiels. On pourra discuter leur compétence hygiénique, mais non certainement leur habileté technique. C'est ici suffisant.

Sur des combinaisons de l'acide borique et de l'acide sulfo-salicylique;

Par M. BARTHE.

Communication verbale.

Sur la présence du « *Lernæodiscus galathea* » Smith dans le golfe de Gascogne;

Par M. CHARLES PÉREZ.

A l'occasion du Congrès international des Pêches maritimes, qui s'est tenu à Bordeaux au mois de septembre dernier, une excursion a été organisée à Arcachon à bord d'un des chalutiers à vapeur de la Société des Pêcheries nouvelles. Au cours de cette excursion, un coup de chalut à plateaux a été donné, à dix milles environ au large du feu du Ferret, par soixante brasses de fond. Si, en raison de l'engin employé, la prise en poisson fut médiocre, en revanche un assez grand nombre de petites Galathées roses, *Galathea dispersa* Spence Bate, furent ramenées, cramponnées aux mailles mêmes du filet.

(1) Le professeur A. Gautier, qui est l'hygiéniste actuel le plus au courant de la question du plomb, dit dans son ouvrage *le Cuivre et le Plomb*, p. 194 : « L'étamage tel qu'il se fait aujourd'hui est une pratique essentiellement inutile et dangereuse. » Page 205 : « La pratique de l'étamage doit être considérée comme dangereuse. »

Cette opinion est basée sur ce que, par suite d'une indifférence coupable, on laisse les étameurs employer des alliages plombiques au lieu d'étain fin prescrit par la loi.

Sur une cinquantaine d'individus examinés, j'ai eu la chance d'en trouver cinq porteurs d'un Rhizocéphale orangé ou rouge cinabre, appartenant au genre *Lernæodiscus*; un exemplaire portait même simultanément deux parasites.

Dans sa récente monographie des Rhizocéphales du Golfe de Naples (*Fauna und Flora des Golfes von Neapel, Monogr. 29, 1906*) Geoffrey Smith signale sous le nom de *Lernæodiscus Galatheæ* un Rhizocéphale parasitant *Galathea dispersa* à Naples et *Galathea intermedia* en Norvège.

Le type que j'ai recueilli est bien vraisemblablement identique à celui qui parasite à Naples la même Galathée. On peut douter de l'identité des parasites de deux hôtes différents; mais puisque Smith figure sous le nom de *L. Galatheæ* le parasite de *G. dispersa*, c'est à cette espèce que le nom doit rester.

C'est, en tout cas, une espèce nouvelle pour le golfe de Gascogne, qui lui est commune avec la Méditerranée et, à ce double titre, intéressante à signaler. On voit en outre par ce qui précède que c'est une forme relativement fréquente, et ce point est encore à retenir, car il en résulte la possibilité de rechercher avec quelques chances de succès des parasites cryptonisciens de ce *Lernæodiscus*, dont l'étude serait pleine d'intérêt.

Séance du 21 novembre 1907.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUCH

Action réciproque du nickel et du plomb;

Par M. EM. VIGOUROUX.

Les travaux relatifs à ces deux métaux sont rares : Tuputti⁽¹⁾ a pris du nickel très divisé qu'il a exposé à plusieurs reprises au feu du fourneau à coupelle avec du plomb. Sans se fondre, le nickel s'est uni au plomb en grande quantité et s'est entièrement oxydé.

(1) TUPUTTI, *Ann. chim.*, série I, t. LXXVIII, p. 145; 1811.

Nous, au contraire, nous avons cherché à éviter l'oxydation en chauffant ces deux corps en présence de l'hydrogène. L'opération s'effectuait dans des nacelles en magnésie placées à l'intérieur de tubes en porcelaine parcourus par de l'hydrogène pur et sec et chauffés jusqu'au voisinage de leur point de ramollissement.

Premier essai. — Nous prenons en poids : nickel, 10 parties ; plomb, 90 parties.

Après la chauffe, pendant laquelle le plomb distille, nous trouvons comme composition du culot :

Nickel	14,89 p. 100
Plomb	85,24 —
	<hr/> 100,13

Sa cassure diffère sensiblement de celle du plomb ; elle est légèrement grenue, sa surface présente des cristaux brillants, il se laisse couper et s'aplatit facilement sous le marteau.

L'acide azotique l'attaque et le dissout rapidement.

L'acide sulfurique en solution en renfermant 30 p. 100, agissant à l'ébullition, dissout du nickel et forme, comme résidu, du sulfate de plomb que l'on élimine par dissolution dans l'acétate d'ammonium.

En continuant l'attaque de l'alliage, on enlève surtout du nickel et le corps résiduel arrive à contenir jusqu'à 98,80 p. 100 de plomb, le reste étant constitué par le premier métal.

L'acide chlorhydrique à 10 p. 100, agissant à l'ébullition, dissout surtout le plomb et amène un résidu qui ne décèle que du nickel à l'analyse.

Deuxième essai. — Nous le constituons avec parties égales des deux métaux, placés dans les mêmes conditions précédentes. Le culot obtenu est homogène, présente une cassure cristalline en apparence, se coupe assez facilement, se brise même et s'écrase au mortier d'Abich.

Sa composition est :

Nickel	50,92 p. 100
Plomb	49,70 —
	<hr/> 100,62

L'acide sulfurique, agissant sur le culot broyé, ne réalise qu'une attaque lente qui entraîne le nickel en solution. La proportion de nickel diminue de plus en plus sous l'action réitérée de ce liquide, bien qu'il passe un peu du second métal à l'état de sulfate. Finalement, on ne sépare que du plomb ne contenant, en fait de nickel, que des traces non dosables.

L'acide chlorhydrique à 10 p. 100 et bouillant dissout beaucoup de plomb; à mesure qu'on renouvelle cette action, on voit ce dernier disparaître peu à peu, et la substance résiduelle n'est plus constituée que par le nickel.

Troisième essai. — On a mélangé 80 parties de nickel à 20 parties de plomb et l'on a comprimé les deux substances afin d'obtenir, après fusion, une masse homogène. Le culot formé, bien que se cassant facilement, s'aplatit sous le choc. Il renferme :

Nickel.	86,02 p. 100
Plomb.	13,46 —
	<hr/>
	99,48

L'acide sulfurique bouillant, en solution étendue à 30 p. 100, attaque les deux métaux simultanément et, comme le plomb est ici en plus faible quantité, c'est le nickel qui reste en dernier avec des traces de l'autre métal. L'addition de quelques gouttes d'acide azotique à la liqueur sulfurique conduit au même résultat.

Quant à l'acide chlorhydrique étendu et bouillant, après plusieurs attaques réitérées, précédées de lavages des résidus à l'eau, il a donné finalement un corps ne renfermant plus que du nickel.

ANALYSE. — Dissolution de l'alliage dans l'acide azotique étendu, précipitation du plomb à l'état de sulfate; dosage du nickel par électrolyse.

CONCLUSIONS. — Ces alliages sont attaqués par l'acide sulfurique en abandonnant du plomb souillé de petites traces de nickel. L'acide chlorhydrique agit de préférence sur le premier métal et isole du nickel ne renfermant que des traces de plomb. Les deux éléments n'y

paraissent pas combinés, mais leur dissolution mutuelle peut être possible.

Ajoutons que tous ces corps sont attirables à l'aimant, à la température ordinaire, même ceux qui ne contiennent que peu de nickel.

État chimique des alliages de cobalt et de plomb;

Par M. DUCELLIEZ.

Lorsque l'on chauffe du cobalt avec du plomb, ce dernier se rassemble à la partie inférieure de la masse. Pour avoir des lingots bien homogènes, j'ai fait des comprimés à la presse hydraulique avec du cobalt en poudre et du plomb en menus fragments. Pour obtenir une division suffisante du plomb, ce métal a été martelé et la lame mince ainsi obtenue a été coupée. Les métaux employés ont été purifiés au laboratoire.

Le comprimé placé dans une nacelle en magnésie a été chauffé fortement, au four Schloesing, dans un courant d'hydrogène. La température obtenue a été suffisante pour distiller une partie du plomb; ce métal n'entraîne pas de cobalt.

J'ai préparé ainsi quatre lingots de compositions différentes, ils ont été attaqués : 1° par l'acide azotique très étendu; 2° par l'acide chlorhydrique à 10 p. 100; 3° par l'acide sulfurique à 30 p. 100.

L'attaque par l'acide azotique est vive; le tout passe rapidement en solution.

L'action de l'acide chlorhydrique est nette; il y a mise en solution de cobalt et de plomb et le résidu ne contient que du cobalt.

L'acide sulfurique attaque lentement ces alliages : du cobalt se dissout, on retrouve au fond du ballon du sulfate de plomb et une matière métallique. On élimine le sulfate de plomb par lavages à l'acétate d'ammoniaque et on obtient ainsi du plomb dans lequel le cobalt ne fait jamais complètement défaut.

Les lingots sont tous attirables à l'aimant à la température ordinaire, même ceux contenant très peu de cobalt. Le magnétisme de ces alliages augmente avec la teneur en cobalt. Ce métal s'y comporte donc comme à l'état libre.

CULOT I. — Le comprimé a été fait avec : cobalt, 20 parties ; plomb, 80 parties. Le culot auquel il a donné naissance est brillant et assez dur, quoique malléable ; il a pour composition :

CULOT I	
—	
Cobalt	22,84 p. 100
Plomb	76,68 —
	<hr/>
	99,52

ATTAQUE PAR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. — L'alliage a pu être martelé et la lame ainsi obtenue a été coupée en petits fragments. Ces derniers ont été traités par l'acide chlorhydrique à 10 p. 100. Il rentre en solution beaucoup de plomb et peu de cobalt. On est averti de la disparition du plomb dans le résidu par la grande quantité de cobalt qui passe en solution dès le début d'une attaque subséquente. Le résidu, après quatre opérations identiques effectuées successivement, est faible et contient exclusivement du cobalt.

ATTAQUE PAR L'ACIDE SULFURIQUE. — La matière, fragmentée comme précédemment, a été mise dans un ballon à réfrigérant avec de l'acide sulfurique à 30 p. 100. J'ai maintenu l'ébullition pendant trois jours. Le liquide d'attaque se colore fortement en rouge, et on trouve un résidu entouré de sulfate de plomb pulvérulent. Des attaques successives effectuées sur les résidus débarrassés du sulfate de plomb par lavages à l'acétate d'ammoniaque isolent des corps de plus en plus malléables : dès la troisième action, on peut les aplatir au mortier d'agate. Après la quatrième, ils s'y agglomèrent en lames fines ayant l'aspect du plomb. L'opération suivante donne cependant des résidus contenant du cobalt : 0,5 p. 100 environ.

On peut arriver rapidement au même point en ajoutant un peu d'acide azotique dans la liqueur d'attaque. Dans ces conditions, il n'y a plus de cobalt dès la troisième opération. Le résultat est donc aussi plus net.

CULOT II. — Le comprimé a été fait avec parties égales des deux métaux. Le culot obtenu est peu malléable ; cependant il s'écrase

légèrement, avant de se briser, au mortier d'Abich. Il a pour composition :

CULOT II	
—	
Cobalt.	51,92 p. 100
Plomb.	47,37 —
	<hr/>
	99,29

ATTAQUE PAR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. — Le culot fragmenté au mortier d'Abich a été soumis longtemps à l'action de l'acide chlorhydrique à 10 p. 100. Pendant le refroidissement, on voit le chlorure de plomb cristalliser en grande quantité. Le résidu, traité de nouveau, ne laisse que du cobalt.

ATTAQUE PAR L'ACIDE SULFURIQUE. — L'attaque par l'acide sulfurique à 30 p. 100 a donné un résidu qui a été soumis à un second traitement à l'acétate d'ammoniaque. Après la cinquième attaque, la matière contenait moins de 1 p. 100 de cobalt.

CULOT III. — Le comprimé est formé de : cobalt, 80 parties ; plomb, 20 parties. Le culot est gris, lamelleux, dur. Sa composition est :

CULOT III	
—	
Cobalt.	82,23 p. 100
Plomb.	17,25 —
	<hr/>
	99,48

ATTAQUE PAR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. — Le culot fragmenté a été soumis à l'action de l'acide chlorhydrique à 10 p. 100. Du cobalt et surtout du plomb entrent en solution. Le résidu remis à l'attaque donne un corps ne contenant que du cobalt.

ATTAQUE PAR L'ACIDE SULFURIQUE. — L'acide sulfurique à 30 p. 100, employé alternativement avec l'acétate d'ammoniaque, donne un résidu constitué par des fragments noirs s'agglomérant au mortier d'agate. Après plusieurs attaques à l'acide concentré, suivies de

lavages à l'acétate d'ammoniaque, cette matière ne contient plus que des traces de cobalt. On a obtenu ce résultat plus rapidement par addition de quelques gouttes d'acide azotique à la liqueur.

CULOT IV. — Le comprimé a pour composition : cobalt, 90 parties; plomb, 10 parties. Le culot présente une surface brillante, il est dur et se brise difficilement au mortier d'Abich. Son analyse a donné :

CULOT IV	
—	
Cobalt.	95,12 p. 100
Plomb.	4,25 —
	<hr/> 99,37

ATTAQUE PAR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. — On obtient rapidement par l'action de l'acide chlorhydrique à 10 p. 100 sur les menus fragments de ce culot, un résidu de cobalt.

ATTAQUE PAR L'ACIDE SULFURIQUE. — Le culot fragmenté a été soumis à l'action de l'acide sulfurique à 30 p. 100. Les deux métaux sont attaqués, mais comme la proportion de cobalt est très forte, ce corps finit par rester seul.

ANALYSE. — La matière a été mise en solution dans l'acide azotique, puis additionnée d'acide sulfurique. On a chauffé jusqu'à apparition de fumées blanches d'acide sulfurique. Après addition d'alcool, le sulfate de plomb obtenu a été pesé. La liqueur filtrée, concentrée, donne le sulfate de cobalt, qui a servi au dosage de ce dernier.

CONCLUSIONS. — 1° Les alliages de cobalt et de plomb s'obtiennent difficilement à l'état fondu et homogène.

2° Il n'a été possible d'isoler par la méthode chimique aucune combinaison de ces deux métaux, mais leur dissolution mutuelle paraît possible.

3° Tous les culots sont magnétiques.

Élaboration et destruction de la matière grasse dans les végétaux;

Par M. J. DUBAQUIÉ.

(Travail du laboratoire de M. GAYON.)

On sait ⁽¹⁾ que les végétaux inférieurs contiennent des quantités de matière grasse, qui vont croissant pendant la période de végétation active et d'accroissement, puis sont consommées rapidement dès que la plante vieillit.

Nous avons été amené à considérer la matière grasse des végétaux non point comme un produit de dégénérescence, une excrétion, mais bien comme une matière de réserve proprement dite, dont l'abondance est liée non à la richesse alimentaire du milieu, mais à l'âge de la plante, à la phase actuelle de sa végétation.

Il est intéressant de voir les transformations qui s'opèrent dans cette matière grasse aux différents âges de la plante et d'en suivre, pour ainsi dire, et dans la mesure du possible, le processus d'élaboration et de destruction.

Déjà à la seule *apparence*, la graisse extraite d'une moisissure jeune (avant le maximum de poids et le commencement de sporulation) est blonde, fluide, odorante, tandis que celle extraite de la moisissure sporulée et vieillie sur un liquide épuisé est plus colorée, plus grenue, moins fluide et présente des cristallisations d'acides gras libres.

Avec toutes les graisses extraites de moisissures, l'éther dissout des matières chromogènes et autres, ordinairement azotées ⁽²⁾. Quand on distille la dissolution éthérée, ces matières s'insolubilisent partiellement. Cet insoluble est d'autant plus considérable que la moisissure est plus âgée. Il peut atteindre alors jusqu'à 8 p. 100 du poids d'extrait par l'éther ⁽³⁾ et renfermer jusqu'à 7 p. 100 d'azote (ce qui

⁽¹⁾ V. *Rôle physiologique de la matière grasse dans les végétaux* (Procès-verbaux, séance du 13 juin 1907).

⁽²⁾ La présence de matière azotée est caractéristique des corps gras végétaux, d'après Chevreul.

⁽³⁾ On voit combien il importe de ne pas confondre extrait par l'éther et matière grasse. Comme poids de matière grasse nous avons adopté celui de la graisse soluble.

correspond à des teneurs très élevées d'impuretés, si l'on se rapporte aux poids moléculaires des matières azotées extraites par l'éther, cholestérine et cytotéarine, etc.).

Au point de vue chimique apparaissent des différences très importantes qui caractérisent très nettement le procédé de formation et de destruction de la graisse.

Les petites quantités de graisses recueillies ⁽¹⁾ n'ont permis d'utiliser avec précision que deux des indices d'ailleurs les plus significatifs, usités dans l'analyse des huiles.

Indice de saponification qui renseigne sur le poids moléculaire moyen des acides gras.

Indice d'iode qui indique la proportion d'acides saturés et non saturés.

Avant de citer les résultats il faut insister sur la nécessité de garantir l'échantillon à examiner de l'oxydation au cours de la dessiccation préalable.

L'oxydation est d'autant plus sensible qu'on opère sur de petites quantités formant une couche mince et étalée au fond du vase, par suite très exposée à l'action de l'air.

Des échantillons de 1 gr. 5 d'une huile ont augmenté de poids au bout de 48 heures de 3 p. 100; de 72 heures de 7 p. 100; de 96 heures de 6 p. 100, et l'indice de saponification passe de 198 à 219 et 258...

L'indice d'iode semble diminuer de quantités très faibles et qui n'influent pas sensiblement.

Aussi importe-t-il d'arrêter la dessiccation au moment où la diminution de poids par heure ne dépasse plus quelques milligrammes.

De très nombreuses déterminations permettent de conclure que dès le début apparaît un mélange d'acide gras à poids moléculaire peu élevé. Ce poids moléculaire augmente et tend vers une moyenne bien caractérisée qui correspond à la période de richesse maximum en matière grasse, période que nous savons être celle de la plus grande activité végétative et constructrice de la plante.

(1) De 200 à 750 milligrammes.

Puis, la période venue de consommation des réserves, le poids moléculaire moyen diminue très rapidement.

L'indice d'iode très élevé au début décroît très rapidement, passe par un maximum, puis augmente à mesure que s'avance la consommation des réserves.

Voici les chiffres moyens relatifs à l'*Aspergillus niger* sur liquide Raulin normal ($t^{\circ} = 30^{\circ}$).

TEMPS DE CULTURE	RENDEMENT (1)	INDICES	
		IODE	SAPONIFIÉ
1 jour 1/2 : 36 heures.	0,22	110	240
		110	258
2 jours : 48 heures. .	0,50	85	220
		92	224
3 jours : 72 heures. .	0,52	87	193
		85	197
4 jours : 96 heures. .	0,35	92	199
		94	198
5 jours.	»	»	200
6 jours.	»	102	207
		106	207
9 jours.	0,14	120	240
			258
12 jours.	»	»	260
			280


(1) Le rendement est défini par le quotient $\frac{P \text{ de moisissure sèche}}{P \text{ d'aliment consommé}}$.

Il est commode de considérer, au lieu des indices de saponification, les poids moléculaires moyens des acides gras qu'il est facile d'en déduire et on peut tracer les deux courbes suivantes en prenant pour abscisses le temps en jours et pour ordonnées, dans la courbe inférieure l'indice d'iode et dans la courbe supérieure les poids moléculaires moyens des acides gras.

Des chiffres cités plus haut et de la courbe il ressort que les acides gras qui apparaissent d'abord sont des acides de poids moléculaire moindre. A mesure que la plante arrive à sa période de végétation la plus active, augmente la proportion d'acides gras de poids moléculaire le plus élevé.

Bien qu'on ne puisse dire si ces acides plus lourds se forment aux dépens des moins compliqués ou sont eux-mêmes des produits directs de l'activité protoplasmique, il est intéressant de constater que ce sont les formes les plus simples qui apparaissent d'abord en plus forte proportion.

Les indices d'iode, élevés pour les graisses de moisissures très jeunes, décroissant ensuite, on peut supposer que les acides saturés



en plus forte proportion au début, ou bien sont consommés, ou bien entrent dans la constitution des acides gras de molécule plus massive trouvés ultérieurement.

La destruction de la matière grasse consommée comme réserve de la plante âgée présente un processus inverse. Les matières grasses sont oxydées⁽¹⁾, les molécules scindées en des molécules acides moins

⁽¹⁾ On retrouve des oxydations analogues dans tous les actes digestifs des plantes. Pour les matières grasses ce processus est particulièrement remarquable. Si l'on donne à une moisissure déjà développée de l'huile ou un beurre pour aliment, on

considérables. L'indice de saponification augmente très rapidement, ainsi que celui d'iode. Il y a donc lieu d'admettre la dislocation des molécules lourdes en molécules moins lourdes ou la formation d'acides oxhydriles ou polyacides ou bien que les acides les plus élevés sont consommés d'abord, laissant en plus forte proportion les acides moins lourds.

Il serait utile de pouvoir suivre par l'analyse, les variations de constitution de la matière grasse au cours de l'évolution de la plante. Mais il faudrait opérer sur des quantités de graisse assez considérables; et d'autre part on est encore loin d'avoir les éléments d'une analyse méthodique et suffisamment complète des corps gras.

Séance du 5 décembre 1907.

PRÉSIDENTE DE M. BOULOUGH

M. le Secrétaire général annonce à la Société que M. Sigalas, professeur à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie, a bien voulu se charger de faire à notre séance publique annuelle une conférence sur la « Photographie des Couleurs ».

Le vote sur la candidature de M. Maurice, préparateur de chimie à la Faculté des sciences, présenté par MM. Hugot et Vigouroux, est mis à l'ordre du jour de la prochaine séance.

M^{me} Baudeuf dépose sur le bureau de la Société un mémoire ayant pour titre :

Action de la lumière sur les faux équilibres électriques.

verra très rapidement la graisse devenir solide, son indice de saponification augmenter.

Par exemple, du beurre de coco placé sous un *Aspergillus niger*, d'abord fluide à la température de l'étuve, y devient rapidement solide; on trouve un indice de saponification plus élevé, une grande quantité d'acide libre. La matière grasse recueillie présente même des analogies avec celle qu'on obtient par l'action d' AzO_3H sur le beurre de coco. Elle dégage l'odeur spéciale d'aldéhyde cœnanthylique.

L'oxydation porte d'abord sur la glycérine qui est pour la moisissure un élément de choix.

Dans le liquide sous-jacent, j'ai vainement essayé de caractériser les petites quantités de glycérine ayant échappé à la combustion que M. Laborde avait trouvées dans une expérience analogue avec l'*Eurotiosis Gayoni* (Thèse Paris, 1896, p. 61).

M^{me} Baudeuf demandant l'impression de ce mémoire, MM. Duhem et Marchis sont nommés commissaires chargés de l'examiner.

M. le Président adresse ses félicitations et celles de la Société à M. Duhem, qui vient de se voir décerner par l'Institut le prix Petit d'Ormoy, et à M. Hadamard qui a obtenu une partie du prix Vaillant

A propos de la fraude des farines;

Par M. CARLES.

M. Carles indique que, contrairement à l'opinion publique, toute addition faite aux matières alimentaires n'est pas une fraude; que la fraude est caractérisée par la volonté de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles des aliments, ou sur le degré d'altération de ces aliments. Or, il y a des additions utiles et si bien que la loi les tolère pour le vin comme pour le pain, par exemple.

Quand la fraude existe, le degré de culpabilité du fraudeur est lié au degré de tromperie et plus encore au degré réel de nocivité des matières qu'il a employées. Ces deux appréciations exigent de la part des experts une compétence spéciale pour éclairer les tribunaux.

Séance du 19 décembre 1907.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUCH

Conformément aux conclusions du rapport de MM. Duhem et Marchis, et après avis favorable de la Commission des finances et d'impression, la Société décide l'impression, dans ses Mémoires, du travail de M^{me} Baudeuf ayant pour titre : « Action de la lumière sur les faux équilibres électriques. »

M. Maurice, préparateur de chimie à la Faculté des sciences, présenté par MM. Hugot et Vigouroux, est élu membre titulaire.

Reboisement en montagnes sans pépinières d'altitude;

Par M. PAUL DESCOMBES,

Président de l'Association centrale pour l'aménagement des montagnes,

et M. H. DEVAUX,

Professeur de physiologie végétale à la Faculté des sciences de Bordeaux.

L'Association centrale pour l'aménagement des montagnes avait organisé, en août 1906, un Congrès dont le programme comprenait des excursions sur ses terrains d'expériences des Pyrénées. Elle a visité en particulier les pépinières du Pic-Poc, situées sur le territoire affermé par l'Association dans la haute vallée d'Aure, entre les ruisseaux de Saux et de la Gela. Ces pépinières, sises à une altitude de 1,800 mètres, sont destinées, dans l'esprit des organisateurs, à fournir des plants pour le reboisement des pentes qu'il convient de protéger contre le ruissellement afin de prévenir, aux lieux mêmes d'origine, la formation des avalanches.

L'un de nous a insisté, en effet, depuis longtemps déjà, sur l'importance qu'il y a à planter des arbres sur les pentes où l'herbe ne suffit pas pour maintenir la terre, et très spécialement sur les points favorables à la formation des avalanches ⁽¹⁾.

Ces pépinières avaient été intentionnellement placées à une altitude analogue à celle des terrains à planter pour avoir concordance climatologique des régions au point de vue de l'arrachage des plants et de leur mise en terre ⁽²⁾. L'une de ces pépinières du Pic-Poc avait été établie en 1904, la deuxième le fut en 1905; pour les deux, le terrain avait été préparé et une barrière établie tout autour dans le but de préserver les jeunes plants contre les déprédations des animaux.

⁽¹⁾ PAUL DESCOMBES, *Étude sur l'aménagement des montagnes dans la chaîne des Pyrénées* (Revue philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest, mai, juin, juillet 1904). — *La défense des montagnes* (Revue des Deux-Mondes, 15 juin 1907). — *Le problème du reboisement* (L'Économiste français, 16 novembre 1907).

⁽²⁾ D'après les renseignements obligeamment fournis par M. Henry, professeur à l'École forestière de Nancy, c'est ainsi qu'on opère dans les reboisements des Alpes: «on établit toujours des pépinières volantes à proximité des points à reboiser.»

Dans la première, on a semé des mélèzes ; dans la deuxième, une assez grande variété de pins et de sapins.

La levée se fit d'une manière normale pour ces divers plants ; mais la croissance fut lente à cause sans doute de l'altitude et de la brièveté de la saison favorable. D'autre part, la distance de ces pépinières aux habitations les plus voisines rendait difficiles les soins à donner : binage, arrosage, etc. A l'époque de la visite du Congrès ces plants, provenant de semis de deux et trois ans, étaient encore tous de dimension insuffisante pour la transplantation.

En présence des difficultés révélées ainsi par cet essai, nous nous sommes demandé s'il ne serait pas possible d'éviter toutes les complications correspondantes à la création et à l'entretien de pépinières d'altitude, en cherchant une méthode permettant la transplantation directe dans la montagne de plants cultivés en plaine.

La difficulté essentielle réside dans ce fait qu'il n'y a pas concordance entre les saisons propices à l'arrachage en plaine et à la plantation en montagne. Cette discordance a été le point de départ de la méthode adoptée par le service forestier. En plaine, on compromettrait beaucoup les plants en les arrachant au delà de la fin de mars, tandis que, sur la montagne, le sol est recouvert par la neige jusque dans le courant de mai ou de juin. Il semble donc impossible de transplanter sans danger dans la haute montagne des plants provenant de la plaine. Cependant, une observation très simple nous a donné la solution du problème.

On voit souvent dans la montagne, la neige persister longtemps sur certains emplacements, à côté d'autres où elle a disparu beaucoup plus tôt. Si l'on examine la végétation comparée dans ces deux genres d'emplacements, on constate que les plantes sont en plein développement dans les endroits à dégel hâtif, tandis qu'à côté les mêmes espèces sont encore en plein hivernage. Ce qui se fait spontanément, devait pouvoir être réalisé artificiellement.

Dans le courant de l'hiver 1906-07 (vers mars), des plants de *Pin cembro*, d'*Abies Douglasii* et d'*Abies excelsa*, âgés de quatre ou cinq ans et hauts d'environ 40 centimètres, ont été envoyés d'Orléans par les pépinières Barbier. Ces arbres, emballés à la manière ordinaire, furent transportés au village du Plan (1,350 mètres), le plus voisin du Pic-Poc et, par les soins de M. Pécloze, garde et conducteur des travaux, les bottes furent emmagasinées sur des chantiers qui les isolaient du

sol et recouvertes de planches supportant une épaisse couche de neige. La température se maintenant sous cet abri à 0° au plus, la végétation de ces jeunes arbres fut absolument empêchée jusqu'au mois de mai, époque à laquelle le dégel dans la montagne voisine permit de songer à la plantation définitive. La couche de neige avait été entretenue jusqu'à cette époque. Les plants retirés de dessous cette neige se montrèrent en parfait état. Ils ne présentaient, en particulier, aucune trace de moisissures, grâce à leur isolement du sol et à l'aération qui les préservaient à la fois de l'humidité venant de la terre et des gouttes d'eau de neige fondue. Ces plants, au nombre d'une trentaine, furent portés sur le Pic-Poc, et plantés sur le bord du chemin muletier qui conduit de la pépinière au casque de Bourgade : altitude, 1,900 à 2,000 mètres.

Au commencement d'août, l'un de nous vint les examiner, avec le garde. Tous ces arbres étaient en pleine végétation, ayant produit de jeunes frondaisons. Quelques-uns avaient bien quelques branches séchées (ce qui tient probablement à ce qu'ils étaient un peu âgés pour la transplantation), mais aucun n'était mort, et ceux à branches mortifiées poussèrent de vigoureux rejets, végétant comme les autres qui étaient absolument indemnes et très vigoureux. Quelques jours après, M. Palustran, maire de l'une des communes propriétaires du Pic-Poc, vint examiner aussi ces plantations et fut très frappé de leur réussite.

Il serait évidemment prématuré de dire que le problème qui nous était posé est déjà résolu par ces premiers résultats ; il faut attendre à l'année prochaine pour voir si ces plants se maintiendront. Il faut aussi multiplier des essais semblables sur d'autres points. Néanmoins, nous avons cru intéressant de signaler la concordance des résultats obtenus, avec nos prévisions théoriques. Et ceci d'autant mieux que la publicité donnée à ces résultats pourra, nous l'espérons, provoquer d'autres essais du même genre, ce qui serait de nature à faciliter la solution du problème si difficile et si urgent du reboisement des montagnes.

NOTA. — Les essais actuels représentent en somme un nouvel exemple des avantages du « retardage » de la végétation des plantes par le froid. Le retardage est très employé en horticulture pour le lilas, le muguet, les lis, etc., avec l'emploi du froid artificiel. Mais il

ne paraît pas avoir été appliqué au reboisement des montagnes, en se servant du froid naturel.

Recherches et Observations sur les conditions de formation et de développement de la truffe mélanospore ou truffe du Périgord;

Par M. G. BOYER.

Le mystère qui enveloppe la production de la truffe mélanospore et de beaucoup d'autres champignons n'a pas encore été pénétré. Plusieurs observateurs s'y sont appliqués sans pouvoir, jusqu'à ce jour, y parvenir.

Désireux à mon tour d'apporter quelques clartés dans une étude aussi difficile que passionnante, j'ai pu, grâce à de persévérantes recherches poursuivies depuis plusieurs années, observer des faits qui me paraissent être d'un certain intérêt pour ce qui a trait au développement et à la culture du précieux tubercule.

Je dois dire tout d'abord que j'ai tenté à diverses reprises de faire germer les spores de la truffe et que moins heureux, sans doute, en cela que MM. Matruchot et Boulanger, malgré la similitude des méthodes employées, les résultats ne m'ont pas encore paru suffisamment décisifs pour qu'il vaille la peine d'en entretenir la Société.

Plus fructueuses ont été les observations et les expériences que j'ai pu faire sur le développement du tubercule, grâce au bienveillant concours de M. le docteur Pradel, dans ses truffières de Sorges (Dordogne).

1° D'abord, en ce qui concerne l'époque de formation des tubercules, de nombreuses fouilles opérées dans les truffières m'ont permis de faire les constatations suivantes:

Il n'est apparu en 1906 aucun tubercule avant le mois de juillet et à partir, au plus tard, du commencement d'octobre. En 1907 les premiers tubercules formés l'ont été fin juillet et en août après des pluies. Septembre, quand il est chaud, peut être aussi un mois de production, mais il ne semble pas, d'après mes recherches, qu'octobre donne naissance à de jeunes tubercules; ces derniers se reconnaissent à leur

peu de volume, à la minceur et à la teinte peu foncée du péricidium surtout dans l'interstice des verrues, à la blancheur de la trame intérieure. A mesure que les tubercules avancent en âge, ils grossissent généralement si les conditions extérieures (pluies fréquentes surtout) les favorisent; le péricidium devient plus épais et plus noir, les veines sporifères deviennent grisâtres et finalement noires.

Je n'ai pu observer aucun tubercule jeune en octobre.

D'autre part il n'est possible de trouver de jeunes truffes, décelées au regard par les fentes du sol dites de la marque, que quelques jours après des pluies d'une certaine importance.

La température ayant été cette année relativement fraîche jusque vers le milieu de juillet, les faits observés montrent, me semble-t-il, avec évidence que la truffe exige pour sa formation, outre de l'humidité, beaucoup de chaleur.

La production de tubercules après des pluies d'été, généralement des pluies d'orage, explique pourquoi les anciens (Plutarque, Juvénal, Athénée...) attribuaient à la foudre et aux orages la genèse de la truffe.

2° DÉVELOPPEMENT DU TUBERCULE. — Il doit être au début assez rapide, si l'on s'en rapporte à la difficulté qu'il y a à se procurer de jeunes truffes. Malgré un grand nombre de fouilles, je n'ai pu m'en procurer que quelques échantillons bien en rapport avec le mycélium, échantillons d'ailleurs du plus grand intérêt que je me propose de décrire dans un travail ultérieur.

La truffe acquiert-elle tout son développement en quelques jours ou en quelques semaines, ou bien progresse-t-elle constamment pendant l'été et l'automne?

Les expériences que j'ai faites m'ont permis de résoudre cet important problème.

Des truffes reconnues au mois de septembre à la marque, ont été mesurées à plusieurs reprises, en prenant la précaution de ne découvrir chaque fois que la moitié la plus superficielle du tubercule sans le toucher autrement ni le déplacer.

Dans ces conditions j'ai pu observer les accroissements de dimensions suivants sur deux de ces tubercules. Un troisième mesuré une première fois n'a pas pu être retrouvé. Tous les trois avaient dans les premiers jours de septembre la grosseur d'une grosse noisette.

Voici les dimensions ultérieures des deux premiers qui finalement ont été recueillis le 12 décembre, puis mis dans l'alcool.

Ces tubercules que je présente à la Société seront tenus à la disposition des personnes qui désireraient les voir.

DIMENSIONS

TRUFFES	25 septembre 1907	15 octobre	10 novembre	12 décembre	POIDS EN DÉCEMBRE
N° 1	2cm/3cm	3cm5/4cm2	4cm/5cm	4cm6/5cm	50 grammes
N° 2	5cm/5cm	5cm6/6cm5	6cm/7cm	6cm6/7cm5	150 —

On voit que l'accroissement, non seulement en diamètre, mais aussi en poids, est très sensible, puisque le n° 2, qui au 15 décembre pèse 150 grammes devait, d'après ses dimensions primitives, ne peser guère plus de 50 grammes le 25 septembre, si l'on s'en rapporte au poids définitif du n° 1.

Les accroissements se produisent surtout après des pluies chaudes ; et ils se manifestent par des fentes superficielles du sol, dites fentes de la marque qui se rencontrent quelques jours après les pluies. Ces fentes en étoiles sont dues à l'écartement de la terre argileuse des truffières sous l'influence du grossissement des tubercules.

3° Des truffes enlevées de la terre truffière, puis remises en place au même endroit ou dans un lieu plus ou moins éloigné de leur situation primitive ont pu, d'après mes observations, se maintenir sans altérations, dans certains cas, mais avec une perte en poids très appréciable ; dans d'autres cas, des truffes ainsi déplacées se sont détériorées et ont pourri. La transplantation semble donc défavorable dans tous les cas même lorsqu'elle est très rapide et qu'on recouvre aussitôt le tubercule de terre humide et qu'on arrose.

4° L'explication de ces faits doit probablement être cherchée dans l'adhérence aux truffes non encore arrivées à maturité mais susceptibles de grossissement, du mycélium truffier que j'ai déjà décrit. (Note sur un mycélium très commun dans les truffières, *P.-V. de la Soc. Linnéenne de Bordeaux*, séance du 4 février 1903 ; — Note sur un

mycélium et des mycorhizes se rapportant très probablement à *Tuber melanosporum*. Soc. des Sc. ph. et nat. de Bordeaux, 31 mai 1906.)

J'ai pu voir ce mycélium très nettement adhérent aux tubercules par de fins filaments fixés au sommet des verrues; le plus souvent au fond d'une petite cavité qui creuse ces sommets et qui se prolonge sur l'organe par des sillons allant de la dépression centrale jusqu'à la périphérie de la verrue.

Les protubérances ainsi constituées offrent de bonne heure un péri-dium noir et probablement peu extensible. Au contraire les sillons qui séparent les verrues et ceux de la verrue elle-même sont, au début et pendant tout le grossissement du tubercule, d'un blanc rougeâtre; le péri-dium y est peu développé et paraît être extensible: c'est vraisemblablement en ces points que se fait l'accroissement en surface des tubercules. La croissance est même parfois si rapide qu'on peut assez souvent après de fortes pluies, telles que celles d'octobre et novembre 1907, voir s'ouvrir dans certains interstices des verrues de véritables crevasses; ces dernières, larges de un à quelques millimètres, forment à la surface du tubercule des bandes plus ou moins sinueuses, longues parfois de plusieurs centimètres. Le fond de ces crevasses est au début blanc ou gris comme la trame même du tubercule; plus tard il se recouvre d'un péri-dium noir.

Les fins filaments mycéliens, adhérents, comme je viens de l'indiquer, aux tubercules ne sont que des dépendances des ramifications du mycélium si abondant dans les truffières. C'est ce même mycélium qui forme des mycorhizes avec les racelles de l'arbre truffier. Il est d'ailleurs de très petites dimensions, quelques μ . d'épaisseur pour les dernières ramifications, et en même temps très fragile, il est peut-être très rapidement résorbable et devient très difficile à apercevoir sous l'influence de toutes espèces de causes et en particulier de la dessiccation. Il disparaît même entièrement autour des tubercules au moment de l'arrêt de leur développement et avant leur maturation, cette dernière se manifestant, on le sait, par le noircissement des spores et par l'apparition du parfum.

Le détail complet des expériences et des observations qui me permettent d'affirmer ces faits fera l'objet d'une publication spéciale lorsque d'autres points encore en suspens auront été élucidés.

Séance du 9 janvier 1908.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUCH

**Action de la lumière
sur les faux équilibres électriques;**

Par M^{me} BAUDEUF.

Communication verbale.

Séance du 23 janvier 1908.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUCH

**Louche singulier en bouteilles de quelques
vins blancs;**

Par M. P. CARLES.

M. Carles parle de vins blancs légèrement édulcorés et soufrés qui, étant limpides en barrique, louchissaient vite et progressivement en bouteilles, tandis qu'ils se clarifiaient dès qu'on les mettait au contact de l'air, en enlevant simplement le bouchon. Ces vins n'étaient pas surcollés, ils étaient aseptiques. Comme ils renfermaient des traces sensibles de cuivre, M. Carles pense que le louche naissant à l'abri de l'air était le résultat d'une réduction lente d'hydrate d'oxyde de cuivre, à la faveur de l'acide sulfureux, des glucoses, aldéhydes et autres.

Séance du 20 février 1908.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUCH

Action de l'arsenic sur le nickel;

Par M. EM. VIGOUROUX.

Les arséniures de nickel naturels sont au nombre de deux principaux : la Rammelsbergite ou Chloanthite NiAs^2 et la Nickéline NiAs (1).

(1) HOFFMANN, *An. Ph. Chim.*, Pogg. 25, 485, 1832. — ROSE, *An. Ph. Chim.*, Pogg. 28, 435, 1833. — C. RAMMELSBURG, *Ber. Chem. Gesell.*, 7, 152, 1874.

Les arséniures artificiels préparés jusqu'à ce jour sont Ni^3As^2 et NiAs . — Wöhler (1) a trouvé le premier dans les fours à verre bleu des fabriques de smalt; par réduction de l'arséniate de nickel ou d'un mélange d'arsenic et d'oxyde de nickel à l'aide du cyanure de potassium, Descamps (2) l'a préparé; Granger et Didier (3) l'ont obtenu en faisant passer un courant de trichlorure d'arsenic sur le métal. Enfin Durocher (4) opère la synthèse de la nickeline en traitant le chlorure de nickel par un mélange d'hydrogène et d'anhydride arsénieux.

En chauffant dans un tube à essais un point d'un mélange intime de nickel et d'arsenic, nous avons constaté qu'au voisinage de 250° apparaît une vive incandescence résultant de la combinaison de ces deux corps. Des expériences effectuées avec des mélanges correspondant à Ni^3As ou Ni^3As^2 font apparaître des masses frittées, brillantes, résultant d'une union presque complète, très peu de matière restant attirable à l'aimant.

Si l'on augmente la proportion d'arsenic en opérant sur des mélanges correspondant à des formules comprises entre NiAs et NiAs^2 , on constate la production du même phénomène, particulièrement vif pour la proportion NiAs , et de plus, au moment de l'incandescence, de l'arsenic se dégage. La chaleur de la réaction paraît donc décomposer les arséniures à teneur élevée.

Cette considération nous a amené à rechercher non seulement la composition des arséniures qui peuvent se produire sous l'action mutuelle de ses deux composants, mais encore les effets résultant de températures de plus en plus élevées sur les composés formés.

Première série d'expériences. — 1. Un mélange intime de nickel et de poudre d'arsenic en excès est chauffé dans une nacelle placée à l'intérieur d'un tube en verre parcouru par un courant d'hydrogène, la température étant maintenue autour de 300° , mais sans jamais dépasser 400° . Une certaine quantité d'arsenic distille pendant l'opération. Après refroidissement, la masse, additionnée d'une nouvelle quantité d'arsenic, est remise en expérience jusqu'à ce qu'elle conserve un poids constant.

(1) WÖHLER, Pogg. Ann. XXV, p. 302. *An. Ch. Ph.* (2), t. 51, p. 208, 1832.

(2) DESCAMPS, *C.R.*, t. 86, p. 1022-1065, 1878.

(3) GRANGER et DIDIER, *B. Soc. Ch.* (3), t. 23, p. 506, 1900.

(4) DUROCHER, *C. R.*, t. 32, p. 823, 1851.

Pour 2 grammes de nickel on obtient 7^{gr}2 d'arséniure dont la composition :

Nickel	gr. 2 »
Arsenic	5,2
	<hr/> 7,2

correspond à

Nickel	27,78 p. 100
Arsenic.	72,22 —
	<hr/> 100,00

L'analyse donne des chiffres voisins :

Nickel	28,00 p. 100
Arsenic.	71,66 —
	<hr/> 99,66

2. Du nickel pulvérulent est soumis à l'action de la *vapeur d'arsenic* jusqu'à saturation à une température toujours inférieure à 400°. A cet effet, dans un tube horizontal en verre chauffé par une grille à gaz, on a placé deux nacelles : l'une contenant 1 gramme de nickel, l'autre chargée d'un excès d'arsenic. Un faible courant d'hydrogène entraîne les vapeurs de ce dernier. En réitérant l'action jusqu'à ce que la masse contenue dans la première nacelle conserve un poids constant, on tombe sur une poudre grise, cristalline, pesant 3 gr. 37. Sa composition est donc :

Nickel	gr. 1 »
Arsenic	2,37
	<hr/> 3,37

ce qui correspond à :

Nickel	29,67 p. 100
Arsenic.	70,33 —
	<hr/> 100,00

Résultat confirmé par l'analyse :

Nickel	29,40
Arsenic	70,46
	<hr/> 99,86

Ces expériences montrent qu'au-dessous de 400° le nickel, en se combinant soit à l'arsenic libre, soit à sa vapeur, forme le corps NiAs^2 dont la composition calculée est :

Nickel	28,13	
Arsenic	<u>71,87</u>	
		100,00

C'est une poudre grise, brillante, cristalline, se ternissant à l'air, non magnétique. Sa densité théorique : 6,37 est inférieure à la densité trouvée à zéro : 7,08. Chauffée progressivement dans un tube horizontal parcouru par de l'hydrogène, cette poudre subit, dès qu'on atteint le voisinage de 400° , une décomposition légère d'abord, plus accentuée ensuite, à mesure que la température s'élève. Cette décomposition se manifeste par l'apparition d'un anneau d'arsenic dans la partie moins chaude du tube.

L'oxygène ou les oxydants attaquent vivement cette substance; ainsi, chauffée au rouge sombre dans ce gaz, elle y brûle avec production d'une flamme pâle, en dégageant des fumées blanches qui, dissoutes dans la potasse, donnent un précipité rouge brique avec l'azotate d'argent. Le chlorate ou l'azotate de potassium fondus engendrent de l'oxyde de nickel et de l'arséniate de potassium; la première réaction a lieu avec incandescence.

Le chlore a sur elle une action vive; au rouge sombre, du trichlorure d'arsenic distille, et du chlorure de nickel anhydre reste dans la nacelle.

L'acide azotique et l'eau régale l'amènent rapidement en solution. Les acides chlorhydrique et sulfurique, même concentrés et chauds, ne produisent que fort peu d'effet. L'attaque par les carbonates alcalins est lente.

Deuxième série. — 1. La vapeur d'arsenic passant sur le nickel chauffé au four Mermet vers 500° , dans les conditions antérieures, fournit, après un certain nombre d'opérations successives susceptibles d'amener la substance à conserver un poids sensiblement constant, un corps révélant à l'analyse :

Nickel	34,35	34,05
Arsenic	<u>65,21</u>	<u>65,91</u>
	99,56	99,96

2. DÉCOMPOSITION DE NiAs^2 . — Un poids de 5 grammes de ce composé a été chauffé dans l'hydrogène à 400° , température de sa décomposition commençante, pendant deux heures. L'opération a été renouvelée jusqu'à ce que, à cette même température, toute apparition d'anneau cesse. Le poids du corps est alors 3 gr. 974.

COMPOSITION CALCULÉE DE 5^{gr} DE NiAs^2

Nickel	1,407
Arsenic	<u>3,593</u>
	5,000

COMPOSITION DE L'ARSENIURE TROUVÉ

Nickel	1,407
Arsenic	<u>2,567</u>
	3,974

soit :

Nickel	35,40
Arsenic	<u>64,60</u>
	100,00

Ces expériences donnent donc un arsénium de formule Ni^2As^3 qui exige :

Nickel	34,29	p. 100
Arsenic	<u>65,71</u>	—
	100,00	

Ce corps en poudre grise, cristalline, possède des propriétés chimiques comparables à celles du précédent. Il se décompose vers 600° . Densité théorique : 6,53. Densité prise à zéro : 7,35.

Troisième série. — 1. Un mélange de nickel et d'arsenic à 90 p. 100 de ce dernier et contenant 2 grammes de métal a été maintenu dans l'hydrogène vers 700° . Une suite d'opérations, précédées de porphyrisation de la masse et d'addition d'arsenic, ont conduit au poids constant 4,552 d'arsénium.

La composition :

Nickel	2 ^{gr.} »
Arsenic	<u>2,552</u>
	4,552

correspond à :

Nickel	43,94	p. 100
Arsenic.	56,06	—
	<u>100,00</u>	

2. Du nickel finement tamisé a été soumis, dans une atmosphère d'hydrogène, à l'action de la vapeur d'arsenic vers 700°. Dès la première expérience, la masse contenait déjà 51,69 p. 100 d'arsenic; porphyrisée et traitée un certain nombre de fois, elle a donné successivement à l'analyse :

	I	II	III	IV	
	—	—	—	—	
Nickel .	45,03	45,24	44,64	44,31	p. 100
Arsenic.	54,50	54,74	55,15	55,19	—
	<u>99,53</u>	<u>99,98</u>	<u>99,79</u>	<u>99,50</u>	

3. DÉCOMPOSITION de Ni^2As^3 . — La calcination amène ce corps à la formule NiAs .

La température a été portée de 600° (décomposition commençante) jusqu'à 700° dans le but d'accélérer la transformation. Lorsqu'il n'y a plus trace de décomposition à partir de 600°, un poids de 4 gr. 108 de Ni^2As^3 renfermant 1 gr. 409 de nickel se trouve transformé en 3 gr. 338 d'arséniure de composition :

Nickel	1,409 gr.
Arsenic.	<u>1,929</u>
	3,338

soit :

Nickel	42,21	p. 100
Arsenic.	57,79	—
	<u>100,00</u>	

L'analyse a fourni :

Nickel	43,25	p. 100
Arsenic.	56,02	—
	<u>99,27</u>	

On forme donc autour de 700° le corps NiAs ; sa composition calculée étant :

Nickel	43,90	p. 100
Arsenic.	<u>56,10</u>	—
	100,00	

Ce corps se présente sous forme d'une poudre de couleur bronzée ou en masse frittée, affectant parfois la forme cristalline. Densité théorique : 6,87. Densité trouvée à zéro : 7,57. La chaleur le décompose à partir de 800°. Les agents chimiques agissent sur lui comme sur les précédents.

Quatrième série. — 1. Un mélange de nickel et d'arsenic à 80 p. 100 de ce dernier est chauffé au sein de l'hydrogène dans une nacelle placée à l'intérieur d'un tube en porcelaine porté au voisinage de 1400° ; il se forme une masse *fondue* ayant pour teneur :

Nickel	55,31
Arsenic.	<u>45,02</u>
	100,33

2. L'arséniure NiAs chauffé dans l'hydrogène vers 1300° perd de l'arsenic et fond. La composition du corps résiduel est :

Nickel	54,20	54,72	p. 100
Arsenic.	<u>45,67</u>	<u>45,20</u>	—
	99,87	99,92	

Ces expériences montrent que, dans ces conditions, il se forme de l'arséniure Ni²As³, dont la composition calculée exige :

Nickel	54,00	p. 100
Arsenic.	<u>46,00</u>	—
	100,00	

Ce corps est le premier qui affecte l'état fondu ; c'est un lingot dur, brillant, se fragmentant facilement en lames sous l'action du choc. Non magnétique. Densité théorique : 7,10. Densité réelle à zéro : 7,86. Il est particulièrement fixe, mais subit cependant une décomposition légère vers 1450°. Ses propriétés chimiques sont comparables à celles des autres arséniures.

Cinquième série. — Des mélanges de nickel et d'arsenic contenant moins de 39 p. 100 de ce dernier, fondus dans une atmosphère d'hydrogène vers 1400°, engendrent des lingots brillants, cristallins, durs, attaquables facilement par l'acide azotique et abandonnant une matière cristalline sous l'influence des acides chlorhydrique ou sulfurique. Un premier culot se compose de grandes lames à reflets bronzés, brillantes, fragiles, facilement clivables. Son analyse décèle :

Nickel	62,20	p. 100
Arsenic.	38,08	—
	<u>100,28</u>	

L'acide sulfurique dilué à 5 p. 100, en l'attaquant très sensiblement au début, met en solution du nickel avec un peu d'arsenic et sépare, avec une poudre noirâtre qui disparaît ultérieurement, un résidu assez abondant. Finalement, ce dernier, après pulvérisation, abandonne de petits grains brillants, brun clair, dans lesquels l'analyse décèle :

Nickel.	59,70	59,77	p. 100
Arsenic	39,38	39,32	—
	<u>99,08</u>	<u>99,09</u>	

Un second lingot légèrement bronzé, dur et cassant, renfermant :

Nickel	75,00	p. 100
Arsenic.	24,63	—
	<u>99,63</u>	

s'attaque plus facilement que le précédent par l'acide sulfurique à 5 p. 100. La matière cristalline brun clair qui s'isole, après avoir été dépouillée par décantation d'une certaine quantité de poudre noirâtre qui la souille, se compose de :

Nickel.	60,81	61,02	p. 100
Arsenic	38,83	38,10	—
	<u>99,64</u>	<u>99,12</u>	

Un troisième culot contient :

Nickel	89,40	p. 100
Arsenic.	11,05	—
	<u>100,45</u>	

Il est légèrement malléable et présente une surface brillante, moirée. L'acide sulfurique à 5 p. 100 en attaque vivement les fragments et abandonne une substance composée de deux parties : l'une claire, non magnétique, présentant l'apparence des précédentes ; l'autre noire, et qui peut être éliminée par l'aimant.

La partie attirable contient 77,16 p. 100 de nickel ; celle qui lui est indifférente, correspond aux résidus antérieurs. Son analyse a donné en effet :

Nickel.	60,92	60,97	p. 100
Arsenic	39,02	39,07	—
	<u>99,94</u>	<u>100,04</u>	

Les culots de teneur en arsenic inférieure à 39 p. 100 abandonnent donc, sous l'action de l'acide sulfurique étendu, un corps dont la composition s'écarte peu de celle exigée par la formule Ni^3As , soit :

Nickel.	61,00
Arsenic	39,00
	<u>100,00</u>

L'arséniure est formé de petits cristaux brillants se ternissant à l'air, non magnétiques et manifestant des propriétés chimiques comparables à celles des arséniures déjà décrits. Densité théorique : 7,31. Densité trouvée à zéro : 8,12.

ANALYSE. — A la méthode générale, nous préférons la suivante : attaquer le corps au moyen de l'acide azotique en présence d'un peu de chlorate de potassium. La solution limpide, traitée par l'ammoniaque en excès, puis additionnée de mixture magnésienne, précipite de l'arséniate ammoniaco-magnésien.

La liqueur filtrée, étendue par une solution d'acétate d'ammonium, est traitée par le sulfure d'ammonium après addition d'acide acétique jusqu'à réaction acide.

Le nickel à l'état de sulfure est lavé, repris par l'eau régale, puis dosé par la méthode ordinaire.

CONCLUSIONS. — 1. Les différents arséniures formés dans ces expériences sont d'autant plus instables qu'ils contiennent plus d'arsenic.

NiAs^3 n'est fixe que jusqu'à environ 400° , Ni^3As^3 jusqu'à 600° , NiAs jusqu'à 800° . Au-dessus de 800° , ne persiste que Ni^3As^3 , dont la décomposition commence vers 1400° et finalement, Ni^3As se maintient constant jusqu'au voisinage du ramollissement de la porcelaine. C'est ainsi que NiAs^3 chauffé progressivement a pu fournir Ni^3As^3 , puis NiAs , Ni^3As^3 , etc.

Inversement, ces arséniures se transforment les uns dans les autres ; les plus pauvres, chauffés en présence de l'arsenic à des températures décroissantes, en peuvent former d'autres dont la teneur va en augmentant jusqu'à NiAs^3 , fait qu'il nous a été très facile de vérifier. Ainsi NiAs , maintenu vers 500° au four Mermet, en présence de vapeurs d'arsenic, perd sa couleur rougeâtre et augmente de poids. La présence de l'arsenic n'ayant plus entraîné d'augmentation sensible de poids, le corps a été soumis à l'analyse, qui a révélé la formation de Ni^3As^3 par les chiffres :

	I	II	
Nickel.	34,35	34,05	p. 100
Arsenic	65,21	65,91	—
	<u>99,56</u>	<u>99,96</u>	

L'expérience montre que la température la plus favorable à la formation complète de ces arséniures ne doit être que de quelques degrés au-dessous de leur température de décomposition.

Ce premier travail a pour but de faciliter l'étude de la marche générale de l'arséniuration ; il y a à reconnaître si tous les corps signalés ci-dessus correspondent à des composés définis.

Ajoutons que des essais analogues, effectués avec le fer, ont entraîné des formules comparables. Ainsi, par l'arsenic en excès, à basse température, on forme FeAs^3 ; à température élevée, on engendre Fe^3As^3 et, en présence de fer en excès et à haute température, on obtient Fe^3As .

Action de la chaleur sur le mélange d'arsenic et de cobalt ;

Par M. F. DUCÉLLIEZ.

Les travaux relatifs aux arséniures de cobalt n'en comprennent pas l'étude méthodique ; ils se rapportent généralement aux produits

naturels, le cobalt se rencontrant dans la nature presque toujours combiné à l'arsenic, au soufre.

La smaltine CoAs^2 a été reproduite synthétiquement en réduisant par l'hydrogène un mélange de chlorure de cobalt et d'arsenic (Durocher) (1).

Les sulfoarséniures se décomposent sous l'action de la chaleur, ils retiennent cependant 5 à 6 p. 100 de soufre et tendent vers le composé CoAs (Berthier).

Ayant préparé du cobalt et de l'arsenic, à l'état de pureté, au laboratoire de M. Vigouroux, j'ai entrepris l'étude de l'influence de la chaleur sur leur mélange, étude qui a été complétée par celles de l'action de la vapeur d'arsenic et du trichlorure d'arsenic sur le cobalt, puis par la décomposition en présence de l'hydrogène de l'arséniate et de l'arsénite de ce métal. Les arséniures isolés dans le cours de ce travail sont :



Le cobalt et l'arsenic pulvérulents se combinent avec incandescence dans ces proportions; il suffit de chauffer un point de leur mélange placé dans un tube à essais vers 250° pour voir le phénomène se propager dans toute la masse. Il se forme un anneau d'arsenic dans le tube; de l'anhydride arsénieux se dépose également lorsque l'opération n'est pas effectuée dans l'hydrogène avec du cobalt bien réduit.

ARSÉNIURE Co^2As

Composition calculée :

Arsenic	38,86	p. 100
Cobalt	61,14	—
	<hr/>	
	100,00	

PRÉPARATION. — On obtient ce composé en traitant des culots cobalt-arsenic par l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique étendus.

La teneur en arsenic de ces corps ne doit pas dépasser 38,86 p. 100.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. — Isolé par les acides, ce corps présente l'aspect d'une poudre brillante, cristalline; fondu, il est formé de grandes lames se clivant facilement. Il n'est pas attirable à l'aimant. Sa densité théorique : 7,205 est plus faible que la densité trouvée à zéro : 8,28.

(1) DUROCHER, *C. R.*, t. 32, p. 823, 1851.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. — Le chlore attaque vivement ce corps vers 400°, il se forme des vapeurs de chlorure d'arsenic et du chlorure de cobalt anhydre.

L'oxygène réagit au rouge sombre et amène l'incandescence; ce fait se reproduit avec l'attaque au chlorate de potassium fondu.

Le soufre en vapeur donne au rouge des sulfures fondus.

L'acide azotique, l'eau régale le mettent facilement en solution.

L'acide chlorhydrique, même concentré et chaud, a fort peu d'action; l'acide sulfurique agit encore moins.

Les alcalis et les carbonates alcalins en fusion l'attaquent lentement.

L'azotate de sodium fondu fournit de l'oxyde de cobalt et de l'arséniate de sodium.

EXPÉRIENCES. — En chauffant au four Schloesing des mélanges d'arsenic et de cobalt riches en ce métal, on obtient facilement des lingots homogènes. Les opérations sont effectuées dans des nacelles en magnésie, au sein de l'hydrogène.

Essai 1. — Un premier lingot est obtenu en fondant un mélange contenant environ 10 p. 100 d'arsenic; il est gris clair, brillant, attirable à l'aimant; à sa surface on remarque un feutrage de petits cristaux. La quantité d'arsenic distillé pendant la chauffe est presque nulle. Son analyse décèle :

CULOT I		
—		
Arsenic	10,81	p. 100
Cobalt	89,65	—
	<hr/>	
	100,46	

a) Le culot fragmenté est mis en digestion avec l'acide chlorhydrique à 5 p. 100; les deux composants passent en solution. Le résidu, dépouillé à l'aide de lévignations d'une matière noirâtre qui l'accompagne, est peu abondant, de couleur foncée avec des points brillants; il fournit à l'analyse :

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
—		
Arsenic	39,20	38,43 p. 100
Cobalt.	61,27	61,36 —
	<hr/>	<hr/>
	100,47	99,79

Ce qui correspond à la formule Co^2As .

b) Une attaque réalisée avec de l'acide sulfurique à 5 p. 100 donne le composé Co^2As en plus grande quantité et de couleur plus claire que précédemment. L'analyse fournit :

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
	—	—
Arsenic	37,08	38,08 p. 100
Cobalt.	62,29	61,19 —
	<u>99,37</u>	<u>99,27</u>

Soit Co^2As .

Essai 2. — Un culot est obtenu avec un mélange à 25 p. 100 d'arsenic; sa surface est brillante, il est dur et cassant, se réduit en poussière au mortier d'Abich, est magnétique; son dosage indique :

	CULOT II
	—
Arsenic	24,15 p. 100
Cobalt	75,79 —
	<u>99,94</u>

a) L'action de l'acide chlorhydrique à 5 p. 100, assez vive au début, entraîne en solution beaucoup de cobalt, mais peu d'arsenic; le produit isolé, assez abondant, gris foncé, a un aspect cristallin; il contient :

	1 ^{re} ATTAQUE
	—
Arsenic	41,19 p. 100
Cobalt	59,02 —
	<u>100,21</u>

Après porphyrisation on reprend l'opération qui conduit à :

	2 ^e ATTAQUE	
	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
	—	—
Arsenic	39,08	38,14 p. 100
Cobalt.	60,71	61,02 —
	<u>99,79</u>	<u>99,16</u>

L'action de l'acide ne modifie plus la composition du corps; celui-ci correspond de nouveau à Co^3As .

b) L'attaque par l'acide sulfurique à 5 p. 100 donne des résultats identiques aux précédents; les analyses fournissent après la seconde opération :

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
Arsenic	38,78	38,13 p. 100
Cobalt.	61,76	61,54 —
	<u>100,54</u>	<u>99,67</u>

Soit Co^3As .

Essai 3. — Ce dernier est fait en fondant les corps mélangés au préalable dans la proportion de la formule Co^3As ; le culot particulièrement cristallin n'est pas attirable à l'aimant. La limite du magnétisme pour ces alliages correspond donc à une teneur en arsenic comprise entre 25 et 38 p. 100; l'analyse de ce culot brut donnant :

CULOT III		
	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
Arsenic	37,16	37,68 p. 100
Cobalt.	62,79	62,97 —
	<u>99,95</u>	<u>100,65</u>

a) L'attaque par l'acide chlorhydrique à 5 p. 100 est légère; du cobalt et de l'arsenic rentrent en solution; l'action limite est susceptible de conduire le corps à la composition :

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
Arsenic	38,12	38,96 p. 100
Cobalt.	61,24	61,47 —
	<u>99,36</u>	<u>100,43</u>

Soit Co^3As .

b) L'acide sulfurique à 5 p. 100 mène rapidement à l'obtention d'un produit brillant, cristallin, de même teneur que le précédent.

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
Arsenic	38,82	38,96 p. 100
Cobalt.	61,07	61,47 —
	<u>99,89</u>	<u>100,43</u>

Dans ces attaques il se forme en général un produit noirâtre, qu'il faut éliminer avec grand soin du composé Co^3As . On y arrive soit par lévigation, soit en continuant longtemps l'action de l'acide. Ce produit, sur la nature duquel je ne suis pas fixé, est en tout cas riche en arsenic. Le pour cent des analyses augmente en arsenic, du fait de sa présence, de deux environ. Il arrive donc qu'une première attaque isole un mélange contenant 41,19 p. 100 d'arsenic, une seconde attaque ou une séparation par lavages donne ensuite le composé Co^3As . La formule peut donc d'abord être dépassée et n'être obtenue qu'ultérieurement.

ARSÉNIURE Co^3As

Composition calculée :

Arsenic	45,87	p. 100
Cobalt	54,13	—
	<hr/>	
	100,00	

PRÉPARATIONS. — Ce corps se produit au-dessus de 800° :

1. En chauffant des mélanges ou des composés de cobalt et d'arsenic (CoAs , Co^2As^3 , CoAs^2) contenant plus de 45,87 p. 100 d'arsenic;
2. Par l'action de la vapeur d'arsenic sur le cobalt pulvérulent ou sur Co^3As ;
3. Sous l'influence du trichlorure d'arsenic sur le cobalt en poudre ou sur Co^3As ;
4. Par réduction, au moyen de l'hydrogène, de l'arséniate ou de l'arsénite de cobalt.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. — Ce corps s'obtient en lingots brillants, à section cristalline, très fragiles, se réduisant en poussière sous l'action du choc. Il n'est pas magnétique; sa densité théorique : 6,99, est inférieure à la densité trouvée prise à zéro : 7,82.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. — Fond sous l'influence de la chaleur vers 1000° avant de se décomposer (1400°). Possède des réactions comparables à celles étudiées avec l'arséniure Co^3As .

EXPÉRIENCES. *Essai 4.* — Un mélange de cobalt et d'arsenic, fait à 80 p. 100 d'arsenic, est chauffé, à l'aide du four Mermet, au rouge vif. Le résultat est une masse pulvérulente contenant de petits grains

fondus. L'aimant n'a pas d'action sur ces corps. Je me suis surtout attaché à l'analyse des grains facilement séparables à la pince. Trois d'entre eux, soumis à l'analyse, décèlent :

	I	II	III	
	—	—	—	
Arsenic . . .	43,65	43,26	44,51	p. 100
Cobalt . . .	55,98	55,92	54,94	—
	<u>99,63</u>	<u>99,18</u>	<u>99,45</u>	

Ils ont donc sensiblement même composition; celle-ci correspond à Co^3As^3 .

Essai 5. — Un mélange de cobalt et d'arsenic contenant un grand excès d'arsenic, les arséniures de composition CoAs , Co^3As^3 , CoAs^2 , sont maintenus séparément à une température voisine de 1300° . La matière est placée à l'intérieur d'une nacelle en magnésie isolée pendant l'opération dans l'hydrogène. On obtient une distillation plus ou moins abondante d'arsenic et, dans la nacelle, des culots bien fondus fournissant respectivement à l'analyse :

	I (Mélange)	II (CoAs)	III (Co^3As^3)	IV (CoAs^2)	
	—	—	—	—	
Arsenic . .	45,50	46,54	46,25	46,29	p. 100
Cobalt . .	54,46	53,17	53,58	53,22	—
	<u>99,96</u>	<u>99,71</u>	<u>99,83</u>	<u>99,51</u>	

On est donc toujours conduit à la formule : Co^3As^3 .

Les culots précédents sont ensuite soumis à la température maxima du four Schloesing (1450°) soit tels que, soit pulvérisés, ce qui a été reconnu sans influence sur le résultat. On obtient un léger anneau d'arsenic, mais étant donnée la masse du corps, cette faible décomposition n'est guère sensible à l'analyse.

Essai 6. — *a)* Une grande nacelle remplie d'arsenic, surmontée d'une plus petite contenant 2 grammes de cobalt, est chauffée au four Schloesing dans une atmosphère d'hydrogène. Après l'expérience, on trouve un arséniure fondu pesant 3 gr. 6.

La composition :

Arsenic	1,6
Cobalt	<u>2 »</u>
	3,6

correspond à :

Arsenic	44,45
Cobalt	<u>55,55</u>
	100,00

Soit Co^3As^2 .

L'analyse donne :

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
Arsenic	<u>44,75</u>	<u>45,22</u>
Cobalt	<u>55,23</u>	<u>54,12</u>
	99,98	99,34

Soit Co^3As^2 .

b) L'arséniure Co^3As substitué au cobalt dans l'expérience précédente fournit des résultats comparables.

Essai 7. — a) Du cobalt pulvérulent, maintenu au-dessus de 800° dans un courant d'anhydride carbonique, est brusquement soumis à l'action du trichlorure d'arsenic. La réaction est fort vive, le réfrigérant destiné à recueillir le chlorure d'arsenic se recouvre d'arsenic et de chlorure de cobalt. On trouve après l'opération un culot fondu contenant 40,12 p. 100 d'arsenic. Une deuxième opération semblable faite sur la matière obtenue précédemment, porphyrisée, donne un culot fondu, contenant :

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
Arsenic.	<u>46,83</u>	<u>46,50</u>
Cobalt.	<u>53,78</u>	<u>54,21</u>
	100,61	100,71

Soit Co^3As^2 .

De nouvelles opérations ne modifient pas cette composition, la masse du corps diminue rapidement, la dernière partie analysée fournit en effet :

Arsenic.	45,14
Cobalt	<u>54,53</u>
	99,67

b) L'arséniure Co^3As soumis aux vapeurs de trichlorure d'arsenic, dans une série d'expériences semblables faites vers 1000° , se transforme en Co^3As^2 .

Essai 8. — a) De l'arséniate de cobalt obtenu par précipitation est réduit par l'hydrogène. La réduction se fait avec incandescence. La masse obtenue frittée donne à l'analyse :

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
Arsenic.	44,15	45,20
Cobalt	55,73	54,38
	<u>99,88</u>	<u>99,58</u>

Soit Co^3As^2 .

b) L'arsénite de cobalt obtenu par double décomposition amène au même résultat, la réduction est également très vive. Le produit élaboré contient :

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
Arsenic.	45,28	44,82
Cobalt	54,35	55,15
	<u>99,63</u>	<u>99,97</u>

Soit Co^3As^2 .

Le fort dégagement de chaleur qui accompagne ces opérations faites au-dessus de 800° , provoque la volatilisation d'une partie de l'arsenic et, par suite, empêche la formation de l'arséniure CoAs qui devait normalement être le résultat de ces réductions.

ARSÉNIURE CoAs

Composition calculée :

Arsenic	55,97	p. 100
Cobalt	44,03	—
	<u>100,00</u>	

PRÉPARATIONS. — Ce corps se forme de 600 à 800° :

1. En maintenant dans une atmosphère d'hydrogène les composés Co^3As^3 , CoAs^2 ou un mélange pulvérulent de cobalt et d'arsenic contenant plus de 55,97 p. 100 de ce dernier;
2. En faisant agir sur du cobalt pulvérulent ou sur Co^3As^3 de la vapeur d'arsenic entraînée par un léger courant d'hydrogène;
3. Par l'action du trichlorure d'arsenic sur le cobalt en poudre ou sur Co^3As^3 .

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. — Le corps a l'aspect d'une poudre grise brillante, parfois frittée et nettement cristalline, non magnétique. Densité théorique : 6,72; densité trouvée à zéro : 7,62.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. — S'oxyde légèrement à l'air, se décompose à partir de 800° sans fondre. La vapeur d'arsenic, le trichlorure d'arsenic le transforment en Co^3As^3 de 400 à 600°.

Les réactions indiquées pour Co^3As lui sont applicables.

EXPÉRIENCES. Essai 9. — Un mélange intime de cobalt et d'arsenic fait à 80 p. 100 d'arsenic, les composés Co^3As^3 et CoAs^2 en poudre, sont placés dans une nacelle et portés au rouge (750°) dans le tube en porcelaine du four Mermet, en présence d'une atmosphère d'hydrogène jusqu'à poids constant. On a ainsi des masses frittées, non magnétiques, contenant respectivement :

	I (Pour le mélange)	II (Pour Co^3As^3)	III (Pour CoAs^2)
Arsenic . . .	56,22	55,28	55,72 p. 100
Cobalt . . .	<u>44,50</u>	<u>44,35</u>	<u>44,38</u> —
	100,72	99,63	100,10

Soit CoAs .

Essai 10. — a) On place dans un tube en porcelaine une première nacelle contenant 10 grammes de cobalt en poudre, puis une seconde dans laquelle on met de l'arsenic; le tout est porté au rouge (750°) à l'aide du four Mermet; un léger courant d'hydrogène préserve le corps de l'oxydation et entraîne les vapeurs d'arsenic. Après six heures, on trouve une poudre grise brillante, non magnétique, pesant 22 gr. 3.

Sa composition :

Arsenic	^{gr} 12,3
Cobalt	<u>10,0</u>
	22,3

correspond à :

Arsenic	55,16 p. 100
Cobalt	<u>44,84</u> —
	100,00

Soit CoAs .

Le corps ainsi obtenu est soumis de nouveau dans les mêmes conditions à la vapeur d'arsenic; il ne change pas de poids; analysé il donne :

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
Arsenic	54,23	55,35 p. 100
Cobalt.	<u>45,53</u>	<u>44,28</u> —
	99,76	99,63

Une expérience semblable effectuée dans un tube de verre sur la grille à gaz montre que le cobalt se combine avec les vapeurs d'arsenic sans incandescence.

b) Dans les mêmes conditions, Co^3As^3 se transforme en CoAs .

Essai 11. — a) Du cobalt finement tamisé soumis à l'action du trichlorure d'arsenic vers 800° , au four Mermet, donne une masse non magnétique entourée de chlorure de cobalt. Ce produit lavé et porphyrisé est soumis à une opération semblable; il se dépose de l'arsenic dans le tube; le produit obtenu observé au microscope est fritté et cristallin, il décèle à l'analyse :

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
Arsenic.	55,33	56,45
Cobalt	<u>44,24</u>	<u>43,76</u>
	99,57	100,21

Soit CoAs .

b) Le trichlorure d'arsenic est susceptible d'amener Co^3As^3 à la même composition.

Essai 12. — Le composé CoAs , placé dans un tube entouré de magnésie et protégé de l'oxydation par l'hydrogène donne un léger anneau d'arsenic lorsque la pince thermoélectrique plongée dans la magnésie indique 800° . La décomposition est peu sensible à cette température.

ARSÉNIURE Co^3As^3

Composition calculée :

Arsenic	65,60	p. 100
Cobalt	<u>34,40</u>	—
	100,00	

PRÉPARATIONS. — Ce corps s'obtient de 400 à 600° :

1. Par action directe du cobalt et de l'arsenic ou par décomposition de CoAs^2 ;
2. Sous l'influence des vapeurs d'arsenic sur le cobalt pulvérulent ou sur CoAs ;
3. Par action du chlorure d'arsenic sur le cobalt ou sur CoAs .

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. — Ce composé se présente sous la forme d'une poudre grise, brillante, non magnétique. Densité théorique : 6,47; densité trouvée à zéro : 7,35.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. — La chaleur le transforme en CoAs , sa décomposition commence à 600°. Il représente la limite d'arséniuration directe du cobalt par le trichlorure d'arsenic.

Le chlorure d'arsenic, la vapeur d'arsenic agissant sur lui au-dessous de 400° produisent CoAs^2 . Les réactifs ont sur lui les mêmes effets que sur les précédents arséniures.

EXPÉRIENCES. *Essai 13.* — Cette opération effectuée vers 600° ne diffère de l'essai 9 que par la température. Les corps obtenus donnent à l'analyse :

	I (Pour le mélange)	II (Pour CoAs^2)
	—	—
Arsenic	65,04	66,32 p. 100
Cobalt.	34,05	33,62 —
	<hr/> 99,09	<hr/> 99,94

Soit Co^2As^2 .

Essai 14. — Il est semblable à l'essai n° 10, mais l'action est obtenue de 400 à 600°.

a) Le poids du cobalt employé est 2 grammes; la matière pèse 5,87 après l'opération.

Sa composition :

Arsenic	^{gr} 3,87
Cobalt	2 »
	<hr/> 5,87

correspond à

Arsenic	65,93	p. 100
Cobalt	<u>34,07</u>	—
	100,00	

Soit Co^{As} .

b) Le composé CoAs , ainsi transformé, par la vapeur d'arsenic, analysé après l'opération, donne :

Arsenic	65,36	p. 100
Cobalt	<u>34,48</u>	—
	99,84	

Soit Co^{As} .

Essai 15. — La température de décomposition est prise comme dans l'essai 12. Maintenu au-dessus de 600° , le corps fournit CoAs .

Essai 16. — a) On fait passer du trichlorure d'arsenic sur de la poudre de cobalt bien réduite. La réaction s'observe nettement vers 450° , il se forme du chlorure de cobalt; la masse se boursoufle. Le corps obtenu, lavé, est encore partiellement magnétique. Une nouvelle opération de 500 à 600° fait disparaître cette propriété. Pendant une troisième expérience semblable, le chlorure de cobalt ne se forme plus.

La matière présente au microscope l'aspect d'une masse frittée cristalline. L'analyse donne :

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse	
Arsenic	65,02	65,74	p. 100
Cobalt	<u>34,83</u>	<u>34,18</u>	—
	99,85	99,92	

Soit Co^{As} .

b) Il a été facile de vérifier que dans ces conditions CoAs se transformait en Co^{As} .

ARSÉNIURE CoAs^{e}

Composition calculée :

Arsenic	71,77	p. 100	•
Cobalt	<u>28,23</u>	—	
	100,00		

PRÉPARATIONS. — Ce composé se forme au-dessous de 400° :

1. Par l'action directe du cobalt et de l'arsenic ;
2. Par l'action de la vapeur d'arsenic sur le cobalt ou sur le composé Co^2As^3 ;
3. Sous l'influence du chlorure d'arsenic sur Co^2As^3 .

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES. — Le corps a l'aspect d'une poudre grise, brillante, non magnétique. Densité théorique : 6,22 ; densité trouvée à zéro : 6,97.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES. — Il représente la limite d'arséniuration du cobalt à la pression ordinaire par l'arsenic, la vapeur d'arsenic ; s'oxyde légèrement à l'air, se transforme en Co^2As^3 sous l'influence de la chaleur (400°).

Essai 17. — Un mélange intime, fait à 95 p. 100 d'arsenic, est maintenu longtemps au-dessous du rouge sombre (350°), dans une atmosphère d'hydrogène. On reconnaît que la combinaison a lieu à ce que la matière produite n'est pas magnétique. Le corps pulvérulent ainsi obtenu, porphyrisé avec de l'arsenic, est traité de la même façon jusqu'à ce que les opérations successives laissent un résidu de poids constant. Les trois dernières expériences donnent un résidu de 3 gr. 46 pour 1 gramme de cobalt mis en œuvre.

La composition de l'arséniure est donc :

Arsenic	gr 2,46
Cobalt	1 »
	<hr/> 3,46

ce qui correspond à :

Arsenic	71,10	p. 100
Cobalt	28,90	—
	<hr/> 100,00	

L'analyse du produit donne :

	1 ^{re} Analyse	2 ^e Analyse
• Arsenic	70,64	71,04 p. 100
Cobalt	29,32	28,38
	<hr/> 99,96	<hr/> 99,42

La limite d'arséniuration obtenue dans ces conditions correspond donc à CoAs^2 .

Essai 18. — 10 grammes de cobalt, le composé Co^2As^3 , finement tamisés, sont soumis séparément à l'action de la vapeur d'arsenic à une température inférieure au rouge sombre (350°) obtenue au four Mermet.

Dans le cas du mélange, la combinaison se produit pendant la première opération, le magnétisme disparaissant. Le corps obtenu prophyrisé est remis pendant plusieurs jours en expérience, dans le but de l'amener à un poids constant. Pour les deux premières réactions l'augmentation du poids est considérable, celui-ci double après la première; la seconde donne 35 gr. 05. La composition de l'arséniure est alors :

Arsenic	25,05
Cobalt	10,00
	<hr/>
	35,05

ce qui correspond à :

Arsenic	71,47	p. 100
Cobalt	28,53	—
	<hr/>	
	100,00	

Si l'on continue les opérations, le poids reste sensiblement constant. L'analyse des arséniures donne finalement :

	I (Pour le mélange)	II (Pour Co^2As^3)
	<hr/>	<hr/>
Arsenic	71,25	71,52 p. 100
Cobalt	27,86	28,46 —
	<hr/>	<hr/>
	99,11	99,98

Soit CoAs^2 .

Essai 19. — La température de décomposition a été prise comme dans l'essai n° 12, le corps commence à se décomposer à 400° . Le poids de CoAs^2 employé est de 2 gr. 35. Maintenu à cette température jusqu'à ce qu'il n'abandonne plus d'arsenic, il fournit 1 gr. 90 d'arséniure.

Composition de 2 gr. 35 de CoAs^2 :

Arsenic	^{gr} 1,687
Cobalt	0,663
	<hr/> 2,350

Composition de l'arséniure formé :

Arsenic	1,237
Cobalt	0,663
	<hr/> 1,900

ce qui correspond à :

Arsenic	65,10	p. 100
Cobalt	34,90	—
	<hr/> 100,00	

L'analyse décèle :

Arsenic	65,29	p. 100
Cobalt	34,02	—
	<hr/> 99,31	

On passe donc ainsi à 400° de CoAs^2 à Co^3As^3 .

Essai 20. — Il fait suite à celui du n° 16. Le composé Co^3As^3 est maintenu au-dessous de 400° dans la vapeur de trichlorure d'arsenic; il se forme de nouveau du chlorure de cobalt pendant les deux premières opérations. Le corps analysé donne :

	Après la 3 ^e opération	Après la 4 ^e opération
Arsenic	71,12	71,39 p. 100
Cobalt	28,74	28,35 —
	<hr/> 99,86	<hr/> 99,74

Soit CoAs^2 .

Ce corps n'est pas obtenu directement par l'action du trichlorure d'arsenic sur le cobalt, au-dessous de 400° .

ANALYSE. — La méthode générale n'est pas employée. Après dissolution dans l'acide azotique on ajoute l'ammoniaque jusqu'à redissolution de l'hydrate de cobalt, puis un excès, ensuite de la mixture magnésienne. L'arséniate ammoniaco-magnésien donne la teneur en arsenic. La liqueur filtrée, précipitée à l'hydrogène sulfuré, produit du sulfure de cobalt qui est repris par l'eau régale faible en acide azotique. On

concentre cette dissolution additionnée d'acide sulfurique; le sulfate de cobalt obtenu est pesé.

Ainsi conduite, l'analyse donne de bons résultats et ne présente aucune difficulté.

CONCLUSIONS. — 1. L'union directe du cobalt et de l'arsenic produit quatre arséniures :

- a) Co^3As^2 décomposable seulement à 1400° .
- b) CoAs stable de 800° à 600° .
- c) Co^2As^3 stable de 600° à 400° .
- d) CoAs^2 stable au-dessous de 400° .

Le premier seul s'obtient fondu en lingots.

2. La vapeur d'arsenic dirigée sur le cobalt donne les composés précédents, dans les mêmes limites de température.

3. Le trichlorure d'arsenic agissant sur le cobalt forme les mêmes corps, aux températures précédemment indiquées. Mais CoAs^2 ne s'obtient pas directement. Un dépôt d'arsenic à la suite de la nacelle se manifeste généralement dans ces expériences.

4. La réduction par l'hydrogène de l'arséniate ou de l'arsénite de cobalt au-dessus de 800° , produit Co^3As^2 .

5. Par attaque à l'acide chlorhydrique ou sulfurique dilués des culots arsenic-cobalt à moins de 39 p. 100 d'arsenic, on obtient un résidu cristallin, de composition Co^2As .

6. Quelques propriétés physiques et chimiques de ces arséniures ont été étudiées.

Une action prolongée est nécessaire pour obtenir chaque composé dans la limite de température exigée par sa formation. Dans une expérience (action de la vapeur d'arsenic sur le cobalt à 400° par exemple) susceptible d'engendrer CoAs^2 , il peut se former d'abord le composé CoAs ; ce n'est qu'en continuant l'opération jusqu'à poids constant, que l'on obtiendra l'arséniure CoAs^2 . La température la plus favorable à la préparation de ces composés est aussi légèrement inférieure que possible à celle de leur décomposition.

Séance du 12 mars 1908.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUCH

Le vote sur la candidature de M. Sigalas, professeur à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux, présenté par

MM. Padé et Vèzes, est mis à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Action de l'acide sulfosalicylique sur le borax oxydiborodisulfone-salicylate de soude;

Par M. L. BARTHE.

On sait que certains sels et, en particulier, le borate de soude, favorisent la dissolution de l'acide salicylique : il se forme dans ces conditions des sels solubles. Les auteurs qui ont étudié cette dernière réaction chimique, ne sont pas arrivés à s'entendre sur la constitution du composé obtenu. Jahns (1), par combinaison d'une molécule de borax sur 4 molécules d'acide salicylique, a fait connaître le composé :

$$\text{B} \begin{cases} \text{OH} \\ \text{OC}^*\text{H}^*\text{COOH} \\ \text{OC}^*\text{H}^*\text{COONa} \end{cases}$$
 M. Adam (2), par mélange équimoléculaire de

salicylate de soude et d'acide borique avec 2 p. d'eau, a préparé un borosalicylate auquel il assigne les formules $(\text{C}^*\text{H}^* \begin{cases} \text{O-BO} \\ \text{CO}^*\text{Na} \end{cases})^n$

ou $\text{C}^*\text{H}^* \begin{cases} \text{O-BO-ONa} \\ \text{CoO} \end{cases}$, cette dernière se rapprochant des émétiques.


Sans reprendre les travaux effectués par les auteurs précités sur ce même sujet, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'étudier l'action de l'acide sulfosalicylique sur le borax, la constitution du composé obtenu étant de nature à apporter quelque éclaircissement sur ces combinaisons.

Si l'on fait dissoudre 1 molécule de borax dans de l'eau bouillante, et si l'on ajoute à cette dissolution 4 molécules d'acide sulfosalicylique dissous dans de l'alcool, on obtient par refroidissement et évaporation sous cloche au-dessus de l'acide sulfurique, de magnifiques cristaux blancs, brillants, assez solubles dans l'eau froide, très solubles dans l'eau chaude, à laquelle ils communiquent une acidité très manifeste. Les mêmes cristaux se produisent encore si, au lieu de


(1) In BEILSTEIN, 1896, t. II, p. 1496.

(2) In PRUNIER, *Les Médicaments chimiques*, 1899, t. II, p. 511.

4 molécules d'acide sulfosalicylique, on emploie 2 molécules du même acide. L'équation suivante rend compte de leur formation :



Avec 4 molécules d'acide sulfosalicylique, et par analogie avec l'équation de Jahns à propos de la préparation du borodisalcylate acide de soude, on pourrait représenter la formation de nos cristaux par la formule :



Mais cette seconde formule, qui fournit un composé de poids moléculaire = 506 (sans compter l'eau de cristallisation) ne cadre pas avec les dosages acidimétriques effectués, ni avec les résultats analytiques formés par le dosage du soufre et du bore.

Dans la réalisation de la formule (1) on observe également la formation d'acide borique, facile à décèler dans les eaux-mères des cristaux obtenus.

Ces cristaux renferment $3\text{H}^{\circ}\text{O}$ de cristallisation. En effet, $2^{\circ}067$ ont perdu, chauffés à l'étuve à $100-110^{\circ}$, $0^{\circ}228$ d'eau, par suite la molécule = 450 renferme $\frac{0,228 \times 450}{2,067} = 49,63$ (théoriquement 54). Ils n'abandonnent rien à l'éther sulfurique avec lequel on vient à les agiter, ce qui montre bien que l'acide sulfosalicylique est combiné. De même que l'acide sulfosalicylique, ces cristaux constituent un réactif très sensible de l'albumine, qu'ils précipitent surtout à chaud.


Les solutions aqueuses et alcooliques fournissent une couleur vio-

lette avec le perchlorure de fer, couleur qui disparaît par addition d'acide chlorhydrique. Elles ne sont pas décomposées par l'addition d'acide chlorhydrique ou d'acide nitrique. Elles fournissent la réaction connue du curcuma avec l'acide borique.

Ces cristaux ont une réaction franchement acide : cette acidité mesurée à l'aide d'une solution alcaline titrée et de la phénolphthaléine comme indicateur, correspond à une double acidité de la molécule (PM = 450) anhydre, au moment précis de cette première saturation. Vient-on à ajouter de la glycérine dans ce mélange, la couleur rouge de la phthaléine disparaît ; on constate qu'on a à nouveau créé une double acidité, et que, pour effectuer cette seconde saturation, il faut verser la même quantité d'alcali que dans la première opération. Ces cristaux renferment donc deux acidités libres, et deux autres acidités révélées par la glycérine et dues à l'acide borique. Il n'y a donc pas dans cette molécule de groupes (BO)' qui, en présence de la glycérine, ne récupèrent pas de fraction acide.

L'acide borique est copulé à l'acide sulfosalicylique ; il est facile par la saponification d'opérer la disjonction des deux acides. Si on fait passer dans la solution alcoolique des cristaux un courant d'acide chlorhydrique pur, on obtient, avec un dégagement de chaleur très appréciable, un précipité de chlorure de sodium et d'acide borique. D'autre part, si, après filtration, on reprend le résidu de l'évaporation de la solution alcoolique par de l'éther sulfurique anhydre, ce dernier retient en dissolution de l'acide sulfosalicylique.

L'équation suivante rend compte des faits observés :



Disons enfin que les fonctions phénoliques sont dissimulées et ne perturbent nullement la saturation des fonctions acides ; en effet, le réactif de Millon ne donne de couleur rouge qu'à l'ébullition prolongée, et le réactif au sulfate de mercure de Denigès ne fournit aucun précipité après une minute d'ébullition. L'analyse volumétrique démontre donc que les cristaux d'oxydiborosulfonate de soude ont quatre acidités libres, en y comprenant les deux acidités dues à l'acide

borique. La formule (2) ne saurait leur convenir puisqu'il n'y a qu'une acidité boriquée, de plus le poids moléculaire d'un composé de cette formule qui renfermerait deux acidités absorberait une quantité d'alcali supérieure à celle qui a été trouvée pour la saturation des deux acidités du composé de la formule (1). Enfin les résultats obtenus en pratiquant le dosage du soufre ne cadrent qu'avec le composé de formule (1).

Dans l'oxydiborodisulfone-salicylate de soude, en dehors des quatre acidités libres dont nous venons de parler, il se trouve encore deux acidités saturées par du sodium, métal d'ailleurs mis en évidence par la production de chlorure de sodium dans la saponification du produit par l'acide chlorhydrique en milieu alcoolique.

A propos des dosages acidimétriques on a pu remarquer que la présence du groupe sulfone dans le molécule acide salicylique ne permet pas de mesurer exactement avec les indicateurs phtaléine, hélianthine et résazurine la saturation de la fonction acide libre dans l'acide sulfosalicylique. Le virage, avec les trois indicateurs précédents, se produit un peu avant d'avoir ajouté la quantité théorique d'alcali.


Le bleu soluble dans ces dosages a à peu près même valeur que la phthaléine; il indique très approximativement les quatre acidités libres dans nos cristaux. La juxtaposition de l'acide borique et de l'acide sulfosalicylique ne modifie pas les conditions de saturation.

Le dosage du soufre dans les cristaux obtenus se fait très bien en projetant dans un mélange à parties égales et en fusion de carbonate et d'azotate de potasse, et par petites portions, la prise d'échantillon. On traite la masse fondue par de l'eau bouillante fortement acidulée par de l'acide chlorhydrique; et dans la liqueur portée à l'ébullition on ajoute la solution du chlorure de baryum.

Le précipité du sulfate de baryte est lavé sur filtre avec de l'acide chlorhydrique étendu, puis avec de l'alcool. Voici les résultats obtenus:

	I	II	CALCULÉ POUR $B^2C^{14}H^{10}O^{18}S^4Na^2, 3H^2O$ = 504
Substance . . .	0,415	0,401	
BaSO ⁴ trouvé. .	0,382	0,355	
S correspondant.	0,05245	0,04874	
Soufre p. 100. .	12,63	12,15	12,69

Les différentes considérations théoriques que nous venons de développer ne nous laissent aucun doute sur la constitution chimique des cristaux obtenus qui répondent bien à la formule (1).



rant à l'ébullition une solution aqueuse des cristaux précédents par une solution alcoolique de potasse, en présence de phtaléine. En faisant évaporer sous cloche la liqueur, on obtient au bout d'un temps assez long de magnifiques tables cristallines, brillantes. La solution du sel sodico-potassique, additionnée de glycérine, est encore capable d'absorber de l'alcali pour la saturation des acidités boriées.

Sur la siliciuration du fer et du manganèse;

Par M. EM. VIGOUROUX.

Nous exposerons un certain nombre de résultats susceptibles de contribuer à la connaissance des limites supérieure et inférieure de siliciuration de ces deux métaux.

LIMITE SUPÉRIEURE. — La recherche de la limite supérieure de siliciuration de ces corps paraît aisée dans la plupart des cas : il suffit de mettre, en présence du métal à étudier, du silicium en excès tel qu'il s'en retrouve dans le culot fondu ; en traitant ce dernier par une solution étendue de potasse, le métalloïde en excès s'attaque, et, après lavage du résidu à l'aide de l'eau fluorhydrique s'il y a lieu, il s'isole le composé persiliciuré de formule simple généralement.

C'est ainsi que l'auteur a pu déterminer la limite supérieure de siliciuration du cuivre et du platine ; par les expériences d'un certain nombre de chimistes, Moissan, Lebeau, de Chalmot par exemple, les limites de siliciuration de la plupart des métaux de la famille du fer nous sont connues.

Les dérivés persiliciurés que nous avons utilisés dans nos essais de désiliciuration, essais mentionnés dans une publication antérieure, ont été généralement obtenus de cette façon.

Le *persiliciure de fer* que nous avons pu retirer de ferrosiliciums purs renfermant un excès de silicium libre, a pu être également préparé en réduisant dans un tube en porcelaine parcouru par un courant d'hydrogène du sesquioxyde Fe^3O^3 par son poids de silicium. En éliminant ce dernier du culot obtenu par la solution alcaline, il s'isolait le corps FeSi^2 , déterminé par un dosage et par sa propriété de résister à l'action de tous les liquides acides, y compris l'eau régale, et d'être complètement soluble dans l'acide fluorhydrique, même très étendu et froid, en donnant une liqueur parfaitement limpide. Le silicium en excès, réagissant dans les mêmes conditions sur le sulfure de fer, a également réduit ce dernier.

Le *persiliciure de manganèse*, signalé par M. de Chalmot, formé par M. Lebeau, a été préparé d'abord en tenant compte de cette considération que « pour obtenir les composés persiliciurés, qui sont aussi les plus dissociables, il ne suffisait pas de se trouver en présence de silicium libre, mais qu'il fallait encore que ce silicium eût en quelque sorte une certaine concentration dans le mélange, et nous voyons, pour le préparer, utiliser des mélanges en renfermant des proportions comprises entre 88,88 et 95 p. 100 (MnSi^2 en exige 50,81 p. 100).

Ainsi nous le retirions d'un premier culot très fortement chargé de ce métalloïde, c'est-à-dire en renfermant des proportions voisines de 90 p. 100.

Mais nous avons pu constater que, dans un culot de densité plus forte et renfermant des quantités moindres de silicium total, le manganèse et le silicium qui s'y trouvaient combinés répondaient également à la formule MnSi^2 et nous avons pu, de même, en extraire ce persiliciure.

Ces différents manganosiliciums étaient préparés dans un très grand état de pureté et fondus en mettant en réaction les mélanges de manganèse et de silicium contenus dans des nacelles en magnésic que l'on introduisait à l'intérieur de tubes en porcelaine parcourus par un courant d'hydrogène et chauffés jusqu'au voisinage de leur point de ramollissement, puis abandonnés au refroidissement lent. La potasse qui s'emparait de leur silicium libre lorsqu'elle était utilisée en solution étendue, se chargeait en plus de flocons d'oxyde de manganèse

dès qu'elle présentait une certaine concentration. Un lavage rapide à l'eau fluorhydrique s'imposait après ce traitement alcalin.

LIMITE INFÉRIEURE. — La limite inférieure se trouve, dans beaucoup de cas, moins aisée à saisir par les procédés chimiques, car s'il est facile de former des culots susceptibles de renfermer, avec le siliciure inférieur cherché, du métal à l'état de liberté, il n'est pas toujours possible de disposer d'un réactif convenable permettant de dissoudre le métal sans altérer ce composé inférieur. Nos expériences antérieures montrent toutefois la possibilité de faire cristalliser dans le siliciure de cuivre pur à très faible teneur des corps répondant aux formules Fe^3Si et Mn^3Si .

CAS DU FER. — Nous formons un mélange intime de : silicium, 13 à 14 parties et fer, 85 à 86 parties et le chauffons jusqu'à fusion dans une nacelle en porcelaine maintenue au sein d'une atmosphère d'hydrogène. Après attaque du culot par une solution aqueuse d'acide azotique à 2 p. 100 qui entraîne du fer, on tombe sur une substance cristalline, magnétique, répondant à la formule Fe^3Si . L'existence de ce corps avait déjà été signalée.

CAS DU MANGANÈSE. — Nos recherches ont porté sur des mangano-siliciums pauvres, préparés en chauffant jusqu'à fusion dans des tubes en porcelaine parcourus par de l'hydrogène, des mélanges convenables de silicium et de manganèse purs, placés dans des nacelles en magnésie.

Un premier culot, contenant environ 10 p. 100 de silicium combiné, affecte l'éclat métallique très prononcé; il est très cassant et présente un certain nombre de soufflures. Un premier traitement effectué à l'aide d'une solution alcoolique d'acide acétique cristallisable en renfermant 10 à 15 p. 100 produit une action légère à froid, assez vive à chaud, qui fait monter la teneur de la partie non attaquée à 13,96 p. 100; un épuisement complet par ce même liquide fait apparaître une poudre métallique, lamellaire, brillante, répondant à la formule Mn^3Si . Les eaux d'attaque, chargées en manganèse, ne renfermaient pas 0,25 p. 100 de silicium à l'état de silice.

Un second lingot, au titre de 13,20 p. 100, épuisé de la même façon, abandonne encore une substance ténue, brillante, cristalline, répon-

dant à la formule Mn^3Si . Dans le liquide d'attaque ne se rencontrent encore que de très faibles quantités de silice.

Enfin un troisième culot, très cassant, contenant autour de 14 p. 100 de silicium, présentant une dureté apparemment supérieure à celle du manganèse pur et se laissant facilement pulvériser, fournit également le corps de formule Mn^3Si après avoir subi les traitements indiqués ci-dessus.

L'acide chlorhydrique et l'acide azotique dissolvent complètement ce composé; de même, l'acide fluorhydrique même très dilué. L'acide acétique en solution étendue alcoolique ou même aqueuse ne produit aucune action.

Sous l'influence de la chaleur, l'oxygène, la vapeur de soufre et le chlore l'attaquent, ce dernier avec incandescence.

La soude et la potasse en fusion produisent une action énergique et complète; il y a formation de silicate et de manganate. Dans l'azotate et le chlorate de potassium, ce corps se détruit avec incandescence. La vapeur d'eau est décomposée, dès le rouge, avec dégagement d'hydrogène.

Bref, l'existence des deux siliciures Fe^3Si et Mn^3Si paraît non moins établie que celle du composé correspondant de chrome Cr^3Si , découvert par M. Zettel et nous croyons qu'il peut y avoir quelque intérêt à publier ces résultats.

En considérant que le silicium est tétravalent, comme le carbone, on peut rapprocher les formules précédentes de celles des carbures de fer Fe^3C appelé cémentite et de manganèse Mn^3C étudié par MM. Troost et Hautefeuille.

Sur une Némerte d'eau douce, « *Stichostemma Eilhardi* » Montgomery;

Par M. CHARLES PÉREZ.

A plusieurs reprises, dans des localités très diverses, on a constaté l'existence de Némertiens vivant dans les eaux douces; et la littérature est déjà assez abondante sur ce sujet. Malheureusement, les descriptions données par les auteurs sont généralement loin d'être assez détaillées et assez précises pour que l'on puisse admettre sans hésita-

tion la validité de toutes les espèces signalées sous des noms distincts ; surtout si l'on songe que, pour des organismes d'eau douce, la dispersion géographique des espèces peut être très étendue. Aussi y a-t-il intérêt à noter, toutes les fois que cela sera possible, les stations diverses d'une espèce bien déterminée.

C'est à ce titre que je signale ici l'observation que je viens de faire de l'existence du *Stichostemma Eilhardi* Montgomery, dans un bassin du jardin annexé à mon laboratoire, à l'Institut de Zoologie de Bordeaux. Cette espèce, par une coïncidence assez curieuse, a été découverte pour la première fois en 1893 par le professeur Fr. Eilh. Schulze, dans un bassin de l'Institut Zoologique de Berlin. Et c'est là qu'elle fut étudiée par T. H. Montgomery (*Zeitschr. f. w. Zool.*, 59, 1895), dont la monographie détaillée a fait de cette espèce la mieux caractérisée des Némertes dulcaquicoles. La structure anatomique aussi bien que les détails histologiques ne me laissent aucun doute que c'est bien la même espèce que j'ai entre les mains.

Bien qu'ayant recherché en vain cette Némerte dans les eaux douces des environs de Berlin, Montgomery est persuadé qu'il s'agit d'une espèce indigène. Sur ce point je ne puis apporter pour le moment aucun document ; le bassin où je fais mes observations ayant été peuplé à plusieurs reprises par des apports d'origines très diverses, n'excluant pas la possibilité d'exotisme, qui cependant me semble improbable.

Un fait à noter est la variabilité du nombre des yeux. La disposition la plus typique paraît consister en trois paires alignées de ces organes ; mais les aberrations sont fréquentes, l'un des yeux pouvant par exemple disparaître ou se dédoubler. Il y a, semble-t-il, une sorte d'indétermination, de flottement, sous réserve cependant de la présence constante des quatre yeux ordinaires des *Tetrastemma*. Je signalerai aussi la présence, dans un individu, de trois poches à stylets accessoires.

Mais la particularité la plus intéressante de cette espèce est son hermaphrodisme protandrique. Or, tandis que Montgomery, sur quatre-vingts individus examinés en coupes, avait surtout rencontré des mâles immatures et seulement quelques-uns plus ou moins avancés vers les stades hermaphrodites ou femelles ; au contraire, sur une dizaine d'individus examinés jusqu'ici, je n'en ai trouvé que deux méritant un peu le nom d'hermaphrodites, et présentant, à côté

d'ovules déjà volumineux, un très petit nombre de spermatozoïdes adultes ou même quelques stades de spermatogénèse. Tous les autres étaient exclusivement femelles.

Le plus souvent un seul ovule arrive à maturité dans chaque glande, alternant dans une sorte de métamérie avec les diverticules intestinaux. Il peut cependant y avoir parfois deux gros ovules dans la même glande. Les ovules sont appendus à la paroi ovarienne par une sorte de pédicule protoplasmique fibrillaire, au voisinage duquel se trouve le noyau de l'ovule. Une légère pression sur le couvre-objet fait fuser le vitellus à travers les téguments, et manifeste ainsi l'existence des orifices de ponte.

Certains ovules non pondus sont résorbés par phagocytose.

Séance du 26 mars 1908.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUCH.

M. Sigalas, professeur à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux, présenté par MM. Padé et Vèzes, est élu membre titulaire.

Sur les falsifications de l'essence de térébenthine;

Par M. VÈZES.

A la suite d'une démarche faite dans ce but auprès de lui par le Syndicat du Commerce des produits résineux de Bordeaux, M. le Ministre de l'Agriculture vient de décider qu'il y a lieu d'appliquer aux falsifications de l'essence de térébenthine les prescriptions de la loi du 1^{er} août 1905 sur la répression « des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ». Cette application soulève un certain nombre de questions scientifiques que nous nous proposons de discuter ici, en utilisant, lorsqu'il y aura lieu, les données statistiques que nous ont fournies les nombreuses analyses d'essence de térébenthine landaise effectuées depuis 1900 par le laboratoire des résines.

I. — Telle qu'elle sort normalement des usines landaises, l'essence de térébenthine extraite par distillation de la gemme du pin maritime n'est pas un corps pur. C'est un mélange où domine le térébenthène gauche, mais où figurent aussi d'autres carbures, isomères ou polymères de ce dernier, à point d'ébullition plus élevé, provenant de la pyrogénéation subie par le térébenthène pendant sa distillation, ainsi que d'autres carbures moins volatils encore, provenant d'un commencement de décomposition pyrogénée de la colophane; en outre, un peu de colophane, entraînée à l'état de vapeur ou projetée dans le serpentin par une ébullition trop violente, vient lui communiquer une légère acidité. On peut donc dire, en réunissant sous le nom d'huile de résine l'ensemble des hydrocarbures peu volatils dont nous venons d'indiquer la genèse, que l'huile de résine et la colophane sont des *adultérants normaux* de l'essence : tant qu'ils n'y figurent qu'à dose modérée, l'essence ne cesse pas d'être marchande. Au contraire, il arrive quelquefois que l'essence que l'on trouve dans le commerce contienne des produits d'origine toute différente, comme le benzène et les différentes variétés de pétrole (white spirit, pétrole raffiné, etc.): ces corps, ne provenant pas de la distillation de la gemme du pin maritime, ne peuvent exister dans l'essence de térébenthine landaise que par suite d'une addition volontaire. Ils devront donc être considérés comme des *adultérants anormaux* de l'essence, et leur présence, à quelque dose que ce soit, constituera une infraction à la loi du 1^{er} août 1905. La même qualification devra être attribuée aux autres substances qui pourraient ultérieurement venir grossir la liste des falsifiants de l'essence et rempliraient aussi cette condition de n'être pas des produits de distillation de la gemme du pin maritime.

D'après cela, une essence de térébenthine landaise sera marchande si elle est complètement exempte d'adultérants anormaux, et si elle ne contient d'adultérants normaux qu'à une dose suffisamment faible, inférieure à une certaine limite. Sur notre proposition — justifiée par l'étude d'un grand nombre d'échantillons d'essence d'origine authentique et certaine, — le Syndicat du Commerce des produits résineux de Bordeaux a fixé cette limite ainsi qu'il suit : pas plus de 2,5 p. 100 d'adultérants normaux, et, en outre, acidité inférieure ou égale à 1,0, l'acidité étant définie par le poids, en grammes, de potasse pure (KOH) nécessaire pour saturer, à la phénol-phtaléine, un litre d'essence.

II. — Reste à examiner si une essence exempte d'adultérants anormaux, mais contenant trop d'adultérants normaux (ou possédant une acidité trop forte) pour être marchande, devra être considérée comme fraudée et tomber sous le coup de la loi du 1^{er} août 1905. Ce serait, à notre avis, excessif, la présence d'un peu plus de 2,5 p. 100 d'adultérants normaux, ou une acidité supérieure à 1,0, pouvant fort bien être le résultat d'une distillation mal conduite, ou encore du séjour trop prolongé d'une essence, primitivement marchande, dans des récipients mal clos : nous avons eu fréquemment à analyser des essences qui se trouvaient dans l'un ou l'autre de ces deux cas.

En revanche, une teneur excessive en adultérants normaux, ou une acidité excessive, peut aussi être le résultat d'une addition volontaire d'huile de résine, d'essence vive de résine, de gemme ou de colophane, addition qui constitue évidemment une infraction à la loi de 1905.

Il y a là, comme on voit, une difficulté qu'il paraît malaisé de lever autrement qu'en fixant, pour la teneur en adultérants normaux et l'acidité, une limite nouvelle, différente de celle indiquée plus haut, et au-dessus de laquelle l'essence sera envisagée comme fraudée.

D'après les nombres que nous a fournis l'analyse d'essences non marchandes pour cause de distillation mal conduite ou de séjour prolongé dans des vases mal clos, il paraît légitime de fixer ainsi qu'il suit cette nouvelle limite : pas plus de 5 p. 100 d'adultérants normaux, et acidité, définie comme plus haut, inférieure ou égale à 5,0.

En résumé, voici la règle qu'il conviendrait d'adopter pour définir les fraudes dont l'essence de térébenthine peut être l'objet :

Une essence de térébenthine landaise est déclarée *non fraudée* si elle remplit *les trois* conditions suivantes :

1^o Être totalement exempte d'adultérants anormaux (white spirit, pétrole, benzine et autres substances définies par la condition de n'être point des produits de la distillation de la gemme de pin maritime);

2^o Contenir une proportion d'adultérants normaux (huile de résine et colophane) inférieure ou égale à 5 p. 100 (cinq pour cent);

3^o Posséder une acidité (définie par le nombre de grammes de potasse KOH nécessaires pour saturer, à la phénol-phtaléine, un litre d'essence) inférieure ou égale à 5,0 (cinq).

Si *une au moins de ces trois conditions* n'est pas remplie, l'essence est déclarée fraudée.

III. — Cette règle, définissant, au point de vue de la loi de 1905, les fraudes de l'essence de térébenthine landaise, ne suffit pas à résoudre à elle seule la difficulté signalée plus haut : elle laisse en effet aux fraudeurs une certaine marge dont ils peuvent profiter, en falsifiant leurs essences au moyen de matières résineuses, employées à dose assez faible pour ne pas dépasser 5 p. 100 d'adultérants normaux ou une acidité égale à 5,0 (par exemple, au moyen de 4 p. 100 d'huile de résine). Il est donc tout à fait essentiel de faire subir aux essences non marchandes, mais non fraudées, une dépréciation au moins égale au bénéfice que pourrait procurer une fraude volontairement limitée à ces chiffres. Partant de ce principe, nous proposons au commerce des produits résineux d'adopter les définitions suivantes :

Une essence de térébenthine landaise *totalelement exempte d'adultérants anormaux* se classe, d'après sa teneur en adultérants normaux et son acidité, dans l'une des catégories ci-après :

1° Essence *normale* (1), si sa teneur en adultérants normaux est inférieure ou égale à 2,5 p. 100, et si son acidité est inférieure ou égale à 1,0 ;

2° Essence de *deuxième qualité*, si (l'une au moins des conditions ci-dessus n'étant pas remplie) sa teneur en adultérants normaux est inférieure ou égale à 3,0 p. 100, et si son acidité est inférieure ou égale à 3,0 ;

3° Essence de *troisième qualité*, si (l'une au moins des conditions prévues au paragraphe précédent n'étant pas remplie) sa teneur en adultérants normaux est inférieure ou égale à 5,0 p. 100, et si son acidité est inférieure ou égale à 5,0 ;

4° Essence *fraudée*, si sa teneur en adultérants normaux dépasse 5,0 p. 100, ou si son acidité dépasse 5,0.

Le cours des essences, établi hebdomadairement dans les marchés de Bordeaux et de Dax, est celui des essences normales ; par rapport à ce cours, les essences de deuxième qualité subissent une dépréciation de deux francs par 100 kilogrammes, celles de troisième qualité une dépréciation de quatre francs par 100 kilogrammes (2).

(1) C'est ce que nous appelons plus haut essence *marchande* ; la confusion qui s'établit trop souvent entre les termes d'essence *non marchande* et d'essence *fraudée* nous conduit à proscrire désormais cette expression.

(2) Ces chiffres de 2 et 4 francs sont donnés ici à titre d'exemple ; c'est au Syndicat du Commerce des produits résineux, beaucoup plus compétent que nous sur cette

IV. — Pour l'application pratique des définitions ci-dessus, il est d'une importance capitale que les fabricants d'essence puissent reconnaître eux-mêmes quelle est la qualité de l'essence qu'ils livrent au commerce; il est très important aussi qu'ils puissent s'assurer par eux-mêmes que leur essence ne risque pas d'être considérée comme fraudée. Or, si la mesure de l'acidité de l'essence est une opération facile, il n'en est pas de même du dosage des adultérants normaux. Heureusement, il est possible de remplacer, pour le classement d'une essence dans l'une des quatre catégories indiquées ci-dessus, ce dosage par une mesure de densité, qui est, elle aussi, une opération facile. En effet, sous la condition expresse qu'il s'agisse d'une essence *exempte de toute addition de substances étrangères*, la densité d'une essence fournit une mesure approximative de sa teneur en adultérants normaux.

La comparaison, faite sur un grand nombre d'essences pures de tout mélange, de leur densité avec leur acidité et leur teneur en adultérants normaux, nous conduit en effet à la règle suivante :

Un fabricant peut reconnaître lui-même, en mesurant l'acidité et la densité de l'essence qu'il livre au commerce, *et qu'il sait parfaitement être exempte de toute addition de substances étrangères (white spirit, pétrole, benzine, huile de résine, essence vive de résine, etc.)*, dans quelle catégorie devra être rangée cette essence :

Elle sera normale si sa densité (à 25°) est inférieure à 0,8620 et son acidité inférieure à 1,0;

Elle sera de deuxième qualité si, sa densité (à 25°) restant inférieure à 0,8620, son acidité est comprise entre 1,0 et 3,0;

Elle sera de troisième qualité si sa densité (à 25°) est comprise entre 0,8620 et 0,8650, ou si son acidité est comprise entre 3,0 et 5,0.

Enfin, elle risquera d'être considérée comme fraudée si sa densité (à 25°) dépasse 0,8650 ou si son acidité dépasse 5,0.

L'application de cette règle exige, dans chaque cas, une mesure d'acidité et une mesure de densité. Pour la première, il y a intérêt à employer une liqueur titrée de potasse à 10 grammes de potasse pure (KOH) par litre : l'acidité de l'essence est alors donnée, sans aucun

question purement commerciale, qu'il appartient de les fixer. Ils doivent être tels que le fraudeur n'ait aucun bénéfice à transformer une essence normale en essence de troisième qualité par l'addition de 4 p. 100 d'huile de résine.

calcul, par le nombre de centimètres cubes de cette liqueur nécessaires pour saturer, à la phénol-phtaléine, 10 centimètres cubes d'essence, dissous dans 100 centimètres cubes d'alcool neutre. Pour mesurer la densité, on emploiera avec avantage les densimètres spéciaux, gradués de 0,8500 à 0,8800 et munis d'un thermomètre intérieur, que construit dans ce but, sur nos indications, la maison Berlemont ⁽¹⁾; la mesure étant faite à une température t° inférieure à 25°, il sera nécessaire, pour la ramener à 25°, de retrancher de la densité trouvée autant de fois 0,0008 qu'il y a de degrés entre t° et 25° ⁽²⁾.

Rappelons enfin, une fois de plus, que la règle ci-dessus n'est utilisable que par le fabricant, analysant sa propre essence et certain de sa pureté : elle ne peut avoir aucune valeur aux yeux du négociant ou du consommateur, parce que ceux-ci ne peuvent, en général, avoir la certitude que l'essence qui leur est offerte n'a pas été additionnée de substances étrangères.

Séance du 9 avril 1908.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUCH

Sur la métamorphose des mouches;

Par M. CH. PÉREZ.

Communication verbale.

Séance du 30 avril 1908.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUCH

Extraction d'une « lipase » de l'*Aspergillus niger*;

Par M. DUBAQUIÉ.

Dans une étude précédente relative à la consommation par les moisissures de leurs réserves en matière grasse, il apparaissait que

⁽¹⁾ Paris, 11, rue Cujas.

⁽²⁾ La lecture de la température pouvant être faite à un quart de degré près, il y aura intérêt, dans tous les cas douteux, à faire la correction en retranchant de la densité trouvée autant de fois 0,0002 qu'il y a de quarts de degré entre t° et 25°.

tout d'abord la graisse était scindée en acides gras et glycérine, cette dernière étant immédiatement oxydée par la plante et consommée.

Cette vue a été confirmée par une série d'observations montrant que les acides gras ne sont attaqués qu'après que la glycérine est disparue.

La glycérine, en effet, constitue pour la moisissure un aliment de choix permettant d'atteindre un rendement élevé (45 0/0).

Si l'on donne comme aliment à la moisissure une matière grasse, étrangère, ajoutée au liquide de culture : 1° on ne trouve pas de glycérine dans le liquide de culture (1); 2° on voit augmenter rapidement la teneur en acides gras libres. Par exemple, de l'huile d'olives à peu près neutre (acidité, 0,62 0/0), placée sous l'*Aspergillus niger* durant trois jours, présente 20 0/0 d'acides libres.

Cependant les indices de saponification et d'iode, caractéristiques du mélange d'acides gras, ne varient pas sensiblement. C'est donc que la glycérine est attaquée et consommée la première, avant les acides gras.

La matière grasse de réserve que la moisissure contient dans ses propres tissus est utilisée par un procédé analogue, quoique moins facile à suivre étant donnée la rapidité de l'action digestive.

L'huile extraite de la moisissure présente une acidité libre qui est relativement plus forte dans la graisse de moisissure très jeune (*Aspergillus*, deux jours; acides libres, 3 0/0), diminue dans l'huile à peu près neutre de la moisissure pleinement développée (0,5 — 0,8 0/0 d'acides gras libres), augmente de nouveau et très rapidement aussitôt que la plante consomme ses réserves grasses (15 0/0 dans la moisissure de six jours, 60 dans celle de dix jours) (2).

Il y a donc lieu de vérifier quelle action scinde ainsi la molécule grasse en acide plus stable et en glycérine immédiatement consommée.

La présence d'une diastase lipolytique était à soupçonner dans les végétaux inférieurs reconnus capables de consommer leurs réserves grasses après dédoublement en glycérine et acide gras.

Voici comment on peut mettre en évidence la présence de lipase dans le mycélium de l'*Aspergillus niger* recueilli à son troisième jour

(1) Il est d'ailleurs difficile de caractériser de faibles quantités de glycérine surtout dans un milieu riche en matières organiques diverses comme un liquide organique.

(2) Résultats analogues de Laborde (Thèse, Paris, 1896). — Rechenberg, *Berichte*, 1881, p. 2217: *Acidité libre des graines oléagineuses*.

de végétation. C'est à ce moment, comme nous l'avons indiqué, que la plante commence à consommer ses réserves de matière grasse.

La moisissure, rincée⁽¹⁾ et fortement exprimée à la presse, est divisée en deux parties. L'une est desséchée à l'étuve à 100°; la deuxième, après vingt-quatre heures de traitement par l'acétone, est desséchée par le vide à 1 centimètre de mercure pendant vingt-quatre heures, puis à 95-100°.

7 gr. 500 de l'une et l'autre portion sont pulvérisés puis longuement triturés avec environ dix fois plus d'huile. On place séparément dans deux flacons bouchés à l'émeri préalablement flambés ainsi que les mortiers employés au broyage.

On s'est assuré que la moisissure traitée par l'acétone est morte. Du liquide Raulin ensemencé ne donne aucune végétation.

Après vingt-quatre heures à l'étuve (35°), l'huile laissée en contact avec la moisissure non traitée par l'acétone présente la même acidité libre que l'huile témoin, soit 0,6 0/0 d'acides gras libres.

Le deuxième échantillon a 1,8 0/0 d'acides libres. Au bout de trois jours cette acidité devient 3,6 0/0. Elle atteint 6,2 au bout de dix jours et 6,9 après douze jours.

L'action étudiée est donc celle d'une diastase que le dessèchement après traitement par l'acétone et évaporation dans le vide avait laissée subsister.

Ce qui le confirme, c'est que la moisissure ainsi préparée présente une action très énergique de la sucrase. 7 gr. 500 de moisissure séchée et pulvérisée intervertissent complètement 5 grammes de sucre dissous dans 50 centilitres d'eau.

La moisissure desséchée directement à l'étuve est sans action.

La dessiccation directe avait donc détruit les diastases que l'on retrouve actives dans la moisissure traitée par le procédé indiqué, et c'est à des diastases que ressortissent aussi bien l'action lipolytique observée que l'hydrolyse intense du sucre⁽²⁾.

⁽¹⁾ Le procédé employé est, sauf une légère modification (l'acétone au lieu de l'alcool éther), celui indiqué par Albert (*Berichte*, t. XXXIII, p. 3775, 1900). Ce procédé nous a semblé préférable à celui indiqué par Constein et Hoyer (*Berichte*, 1902, p. 3988).

⁽²⁾ On n'obtient plus d'action lipolytique avec la moisissure âgée. (*Aspergillus*, six jours). La diastase n'apparaîtrait donc qu'au moment de l'utilisation des réserves grasses.

L'Observatoire de Prague a fait don à la bibliothèque de la Société d'un ouvrage sur les horloges astronomiques artistiques existant à cet observatoire. L'ouvrage a pour titre :

**Die Kunst-Uhren auf der K. K. Sternwarte
zu Prag.**

Par JOSEF GEORG BOEHM.

Séance du 14 mai 1908.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUCH

**Sur l'origine de la matière colorante des raisins
rouges;**

Par M. J. LABORDE.

La matière colorante des raisins rouges a été préparée, à l'état pur, en 1858, par Glénard, qui l'appela *Œnoline* ($C^{28}H^{16}O^{10}$). En 1878, M. A. Gautier isola, de divers cépages, des pigments ayant chacun une composition spéciale, mais peu éloignée de la précédente, et il posa le premier la question de l'origine de ces pigments ou *acides œnoliques*. Deux hypothèses furent émises, et la plus généralement adoptée consiste à faire dériver la couleur rouge de l'œnotanin par oxydation.

Les botanistes ont également cherché à expliquer l'apparition normale ou accidentelle de l'*anthocyanine* des feuilles ou des fruits.

Les recherches d'Overton (1899) et de M. Marcel Mirande (*C. R.*, 1907) tendent à démontrer une relation entre l'anthocyanine et l'accumulation du sucre et des matières tannoïdes jointe à la présence des oxydases. Par conséquent, ces hypothèses sont encore assez obscures : les résultats que je viens d'obtenir sur cette question y apporteront peut-être un peu de lumière.

Si on prend des raisins verts de cépages rouges ou blancs, et que l'on traite leurs éléments solides par de l'eau chlorhydrique à 2 0/0 de HCl, à l'autoclave à 120°, pendant demi-heure, on obtient un liquide magnifiquement coloré en rouge vineux, et les parties insolubles du

mélange renferment encore une grande quantité de couleur que l'on peut extraire par l'eau alcoolisée. La même réaction a été fournie par des marcs de raisins blancs desséchés à l'étuve depuis le mois d'octobre dernier et par les jeunes pousses actuelles de la vigne rouge ou blanche. Avec 10 grammes de ces pousses desséchées, on peut colorer, comme un beau vin rouge, un litre d'eau alcoolisée.

J'ai pensé tout d'abord à l'existence d'un glucoside tannique. Mais, après avoir précipité les matières tannoïdes des raisins ou des pampres de la vigne par une liqueur acéto-ammoniac-mercurique (100 grammes d'acétate d'ammoniaque et 20 grammes d'acétate mercurique par litre) et décomposé le précipité par H^2S en liqueur chlorhydrique, la solution filtrée, puis chauffée à 120° , était complètement exempte de corps réducteurs de la liqueur de Fehling. Les matières tannoïdes paraissaient s'être transformées seulement de la manière suivante : 1° en une belle couleur rouge soluble dans l'eau acidulée ; 2° en une matière colorante rouge peu soluble dans l'eau pure, mais très soluble dans l'eau alcoolisée ; 3° en un corps de couleur brune insoluble dans l'eau et l'alcool qui rappelait la matière colorante des vins insolubilisée par oxydation profonde. Déjà, ces caractères rapprochent beaucoup la couleur obtenue par l'action de HCl de la couleur des vins rouges ; en outre, comme celle-ci, la première vire au vert par les alcalis et au rouge par les acides, elle est précipitable par les matières albuminoïdes en présence de coagulants tels que la crème de tartre, elle forme des combinaisons insolubles avec certains oxydes métalliques, elle s'oxyde à l'air et plus rapidement en présence de l'oxydase en jaunissant et devenant insoluble, etc. Il n'est donc pas douteux que la couleur naturelle et la couleur quelque peu artificielle sont de même nature et qu'elles dérivent toutes les deux de l'œnotanin.

D'autres matières tanniques sont également douées de cette propriété chromogène ; ainsi, je l'ai constatée, à un degré plus ou moins élevé, pour le tanin du houblon, du cerisier, du poirier, de la vigne vierge, etc. ; mais le tanin des chênes ordinaires ne l'a pas.

Cette action de HCl dilué ne paraît avoir rien de commun avec celle de SO^4H^2 dilué sur certains tanins, d'après laquelle on classe ces produits naturels parmi les glucosides parce qu'on obtient du glucose et une matière rougeâtre insoluble. Mais j'ai constaté que cette production de glucose n'a lieu que par une attaque profonde de la matière organique par l'acide assez concentré, comme celle qui fournit du glucose

avec la cellulose, par exemple. Quant à la matière rouge brun, elle paraît résulter d'une transformation partielle des phlobaphènes en cette matière colorante rouge que j'obtiens dans de bien meilleures conditions avec HCl. Cette question des tanins glucosides mérite donc d'être mieux étudiée, et il y a lieu de vérifier, par exemple, si la réaction donnant la matière colorante rouge n'est pas un dédoublement analogue à celui que subit le gallotanin pour donner l'acide gallique par hydrolyse, et si, dans la nature, il n'y aurait pas intervention d'une diastase pour l'œnotanin comme pour le gallotanin.

La propriété chromogène des matières tanniques considérées ne se borne pas au fait indiqué ci-dessus. En effet, si on fait bouillir ces tanins pendant quelques instants avec une solution de potasse caustique à 20/0, et si on expose ensuite la liqueur brune à une aération suffisante, cette liqueur prend, ici encore, une coloration rouge vineux très intense; l'expérience est surtout curieuse avec des pépins de raisins blancs ou rouges. Conservée à l'abri de l'air, la coloration persiste, tandis qu'elle vire au jaune clair au bout de quelques heures si l'oxydation par l'air continue; on obtient la même teinte quand on sature l'alcali par un acide, mais la coloration reparait avec l'alcalinité. Cette matière colorante est donc très différente de la précédente.

En rapprochant maintenant les observations qui ont été faites sur la coloration rouge normale ou accidentelle, que présentent les feuilles ou les fruits d'une foule de plantes, des propriétés chromogènes de certains tanins, on entrevoit beaucoup mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à présent l'origine des pigments rouges de nature tannoïde. Le mécanisme de leur production est évidemment tout autre dans la nature qu'au laboratoire, mais, en principe, il est peut-être identique, même s'il se rattache aux actions diastasiques hydrolisantes ou oxydantes ou à ces deux catégories à la fois. Et, par analogie avec d'autres faits bien connus, ceux relatifs à la myrosine ou l'émulsine, par exemple, on peut se demander si ce n'est pas à cause de l'absence de ces actions diastasiques que les raisins blancs ne se colorent pas au moment de la véraison.

Sur la saponification de la colophane.

I. Méthode;

Par MM. VÈZES et SANS.

On sait que la colophane, insoluble dans l'eau, se dissout dans les solutions aqueuses des alcalis caustiques, en donnant des solutions de savon résineux, c'est-à-dire de sels alcalins des acides résiniques qui constituent la colophane; et que l'addition d'un excès d'alcali aux dissolutions ainsi obtenues provoque la précipitation d'une partie du savon résineux qu'elles contiennent. Nous nous proposons d'exposer ici l'étude que nous avons faite de ce phénomène dans le cas, de beaucoup le plus important pour la pratique industrielle, où l'alcali employé est la soude caustique.

1. Les mélanges dont nous avons étudié les états d'équilibre étaient constitués par de l'eau distillée, de la soude caustique (soude pure du sodium, *pro analysi*, de Merck), et de la colophane landaise, provenant d'un bloc unique, bien transparent et de nuance assez claire, correspondant à la notation M de la classification américaine usuelle. L'étude préliminaire des conditions d'équilibre de ces mélanges nous ayant montré que la solubilité du savon résineux dans les lessives alcalines est très fortement influencée par l'oxygène de l'air, nous avons dû opérer en tubes scellés et, par suite, employer une méthode inverse de celle qui est généralement suivie dans les mesures de solubilité: au lieu de déterminer la composition de la liqueur qui, à une température donnée, se trouve en équilibre, soit avec le savon, soit avec la colophane, nous avons déterminé la température à laquelle une liqueur de composition donnée commence à déposer, soit du savon, soit de la colophane.

Le mode opératoire adopté a été le suivant: on fait d'abord, en évitant autant que possible l'acide carbonique de l'air, une solution de soude caustique dans l'eau distillée, de titre à peu près connu (N/10, 2N/10, 3N/10, etc.); on titre ensuite plus exactement cette liqueur en y dosant l'alcali à l'état de sulfate, ainsi que par un dosage alcalimétrique à l'hélianthine: les résultats concordants de ces mesures donnent le titre exact γ de la solution (poids de soude pure NaOH contenu dans

100 grammes de solution). On vérifie enfin, par un titrage à la phtaléine dont le résultat ne doit différer que très peu du précédent, que cette solution n'est que peu carbonatée; nous indiquons dans les tableaux que l'on trouvera plus loin, à côté du titre γ de chaque solution alcaline (qui représente en réalité l'alcali total contenu dans la liqueur), la portion γ_1 de ce poids d'alcali qui s'y trouvait à l'état carbonaté. La différence $\gamma - \gamma_1$ représente ainsi, dans chaque cas, le poids d'alcali caustique réel.

La colophane destinée à réagir sur les liqueurs alcalines ainsi constituées a été empruntée, pendant toute la durée des recherches dont les résultats sont exposés ci-dessous, à un même bloc, provenant directement d'une coulée industrielle. Pour la confection de chaque série nouvelle de mélanges, on détache de ce bloc un fragment de colophane qui est aussitôt pulvérisé.

Il s'agit maintenant de constituer de petits tubes scellés contenant des poids connus de colophane et de liqueur alcaline. On emploie dans ce but des tubes en verre vert d'environ 10 millimètres de diamètre intérieur, qui sont coupés en fragments d'une vingtaine de centimètres. Pour les nettoyer, on les immerge pendant quarante-huit heures dans une solution de bichromate de potassium, fortement acidulée par de l'acide sulfurique; puis, pendant quarante-huit heures encore, dans une solution étendue d'acide chlorhydrique; on les rince ensuite à plusieurs reprises avec de l'eau distillée bouillante, et on les sèche à l'abri des poussières et des vapeurs acides. On les ferme alors à une extrémité, et l'on introduit dans chacun d'eux deux perles de verre, nettoyées par le même procédé, et destinées à faciliter l'agitation de leur contenu. On pèse alors un poids de colophane pulvérisée légèrement supérieur à celui que l'on veut employer, et on l'introduit dans le tube, au moyen d'un tube à entonnoir, que l'on retire ensuite avec soin, de manière à ne laisser aucune trace de colophane sur les parois supérieures. Enfin, on pèse avec soin le tube préalablement taré, ce qui donne le poids p de colophane qu'il contient. On l'étire ensuite, à 7 centimètres environ du fond, de manière à constituer un canal étroit, à parois épaisses, facile à fermer, après remplissage, d'un coup de chalumeau. On remplit enfin le tube de liqueur alcaline, à la façon d'un thermomètre, jusqu'à la naissance de l'étranglement; on essuie la partie étranglée et la partie plus large qui la surmonte, et l'on pèse de nouveau, ce qui donne le poids P de liqueur introduite; on

ferme ensuite le tube d'un trait de chalumeau, et on l'étiquette avec soin. La composition du mélange qu'il contient est alors définie par le titre y de la liqueur alcaline employée (poids de soude pure NaOH contenu dans 100 grammes de cette liqueur), et par la proportion centésimale z de colophane contenue dans le mélange total, qui est donnée par la relation

$$z = \frac{100p}{P + p}.$$

Une série de tubes étant ainsi constituée avec une même liqueur alcaline de titre y et des teneurs croissantes z en colophane, on soumet ces tubes à une agitation énergique et prolongée (dans des boîtes qu'un moteur électrique soumet à un mouvement continu de rotation autour d'un axe horizontal), de manière à saponifier la colophane au contact de la lessive alcaline (1). Cette saponification, qui est intégrale si la dose de colophane n'est pas trop forte, n'est que partielle quand le tube contient un excès de colophane. Quand elle ne progresse plus, ce qui se reconnaît aisément par l'examen de la quantité de colophane restant non saponifiée, on détermine, pour chaque tube, la température T de saturation de la solution qu'il contient, c'est-à-dire la température au-dessous de laquelle cette solution laisse déposer soit de la colophane, soit du savon résineux. La détermination de cette température se fait comme celle de la température de séparation des mélanges doubles liquides, qui a été récemment décrite à propos de l'étude des mélanges d'essence de térébenthine et d'alcool aqueux (2).

II. Avant d'indiquer les résultats qu'a fournis l'application de la méthode ci-dessus exposée, il importe de signaler les causes d'erreur qui peuvent influencer sur ces résultats, ainsi que la façon dont on peut les éviter.

Comme nous l'avons déjà brièvement indiqué, l'oxygène de l'air, en se fixant, soit sur la colophane sèche, soit sur ses solutions alcalines,

(1) Il arrive parfois, dans les tubes contenant une forte proportion de colophane, que le fond du tube est rempli de colophane qui se trouve soustraite à l'action de la liqueur alcaline par la couche de savon formée à sa surface, et ne peut ainsi se saponifier. Dans ce cas, on soumet le tube, dans un sens convenable, à l'action d'une centrifugeuse qui détache du fond la colophane immobilisée et lui permet ainsi de réagir.

(2) Sur la solubilité réciproque de l'essence de térébenthine et de l'alcool aqueux (deuxième série), par MM. Vèzes, Mouline et Brédon (*Procès-verbaux de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux*, 28 juin 1986).

exerce une influence très sensible sur la température de saturation des mélanges étudiés. En ce qui concerne la colophane sèche, on en trouvera la preuve dans la comparaison des deux tableaux ci-dessous, donnant les résultats des mesures effectuées comparativement sur deux échantillons provenant d'un même bloc de colophane, dont l'un A avait été pulvérisé deux mois avant la confection des tubes scellés, et conservé depuis lors dans un col droit bouché à l'émeri, à moitié rempli d'air, tandis que l'autre B n'a été pulvérisé que quelques heures avant la confection des tubes.

SOLUTION ALCALINE $\frac{5N}{10} : y = 2,00$ COLOPHANE A $y_1 = 0,03$	
POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation
z —	T —
1,98	$71,0 \pm 0,1$
3,84	$44,0 \pm 0,1$
5,57	$26,5 \pm 0,5$
7,28	$20,5 \pm 0,4$
9,07	$15,4 \pm 0,6$
10,65	$12,0 \pm 1,0$
12,10	$10,0 \pm 1,0$

SOLUTION ALCALINE $\frac{5N}{10} : y = 2,00$ COLOPHANE B $y_1 = 0,03$	
POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation
z —	T —
1,95	$94,0 \pm 0,1$
3,79	$83,5 \pm 0,5$
5,58	$75,5 \pm 0,5$
7,54	$65,2 \pm 0,4$
9,03	$57,2 \pm 0,5$
10,63	$46,5 \pm 0,5$
12,20	$37,4 \pm 0,4$

On voit, en comparant les mélanges de composition à peu près identique préparés avec la colophane A et la colophane B, que l'oxydation subie par la colophane A, pendant son séjour prolongé à l'air, a eu pour effet d'abaisser la température de saturation de quantités variant entre 20° et 50° . L'influence de l'oxydation préalable de la colophane est donc très considérable ⁽¹⁾; pour se mettre à l'abri de cette cause

(1) La mesure des températures de saturation paraît ainsi pouvoir constituer une réaction d'une extrême sensibilité pour l'appréciation de l'état d'oxydation d'une colophane; c'est là un point sur lequel nous nous proposons de revenir.

d'erreur, il importe de ne pulvériser la colophane qu'au moment de l'introduire dans les tubes, et de ne pas perdre de temps dans la confection de ceux-ci, de telle sorte que la colophane pulvérisée (ou sa solution alcaline, qui n'est pas moins sensible à l'action de l'air, comme on en trouvera la preuve plus bas) reste le moins longtemps possible au contact de l'atmosphère. En fait, tous les tubes ayant servi aux mesures définitives dont les résultats seront indiqués plus loin ont été confectionnés assez promptement pour qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux ou trois heures entre la pulvérisation de la colophane et le scellement des tubes: nous avons vérifié que l'oxydation pouvant s'effectuer pendant ce temps n'est pas susceptible de modifier la température de saturation de plus de $0^{\circ},1$.

Comme il était aisé de le prévoir, l'oxydation préalable de la colophane influe aussi sur la coloration de ses solutions alcalines: le contenu des tubes préparés au moyen de colophane A était beaucoup plus coloré que celui des tubes contenant la colophane B.

D'autre part, l'oxygène de l'air est également capable de réagir sur les solutions alcalines de colophane, c'est-à-dire les solutions de savon résineux, et d'abaisser encore la température de saturation de ces solutions: on peut aisément s'en assurer en constituant des tubes scellés contenant, avec des quantités identiques d'une même colophane et d'une même solution alcaline, des volumes d'air différents. Deux mélanges identiques ($y = 0,809$; $z = 1,95$) ont été formés en même temps dans deux tubes de longueur inégale, de telle sorte que l'un de ces tubes fût presque exactement rempli (ne contenant que la quantité d'air strictement nécessaire pour empêcher sa rupture au moment du chauffage), tandis que l'autre, plus long de quelques centimètres, contenait un volume d'air notable: leur température de saturation a été, pour le premier, de $37^{\circ},1 \pm 0,5$, pour le second de $34^{\circ},0 \pm 0,5$. De plus, le contenu du second tube était sensiblement plus coloré que celui du premier. Il apparaît clairement, d'après cela, que l'abaissement de $3^{\circ},1$ observé pour la température de saturation est dû à la présence d'une quantité notable d'air dans le second tube. On évite cette cause d'erreur en remplissant toujours les tubes jusqu'à la base de l'étranglement, de manière à ce que la partie étranglée reste seule pleine d'air: le petit volume d'air qui reste ainsi dans chaque tube, et dont la présence est d'ailleurs nécessaire pour que le tube n'éclate pas quand on le chauffera, est assez faible pour réduire à moins

de 0°,1 l'abaissement qu'il peut faire subir à la température de saturation.

III. Tandis que l'oxydation de la colophane, soit sèche, soit en solutions alcalines, tend à faire trouver, pour la température de saturation de ces solutions, des nombres trop faibles, il est une autre cause d'erreur qui tend au contraire à donner des nombres trop forts : c'est une transformation que subissent à la longue les solutions aqueuses de savon résineux, et que rend particulièrement rapide un séjour de ces solutions à température élevée, comme le montre l'expérience suivante :

Un tube scellé, construit en tenant compte de toutes les précautions indiquées plus haut, et contenant un mélange défini par les nombres $y = 0,797$, $z = 2,19$, donne, après les deux heures d'agitation à froid qui suffisent pour la saponification complète de la colophane qu'il renferme, une température de saturation de $40^{\circ},0 \pm 0,6$; son contenu constitue donc, au-dessus de 40° , une solution limpide. On le met à l'étuve à 100° - 105° : on voit bientôt cette solution se troubler, et, au bout d'une heure, on y constate la présence d'un dépôt insoluble, persistant aussi bien lorsqu'on élève encore la température que lorsqu'on la laisse redescendre jusqu'à la température ordinaire. Ce dépôt, dont l'étude détaillée fera l'objet d'une communication ultérieure, est cristallin, adhérent aux parois du tube ; son aspect le distingue très nettement du dépôt de savon résineux que contenait le tube avant d'être chauffé, et qui se reproduit par refroidissement.

Un dépôt cristallin tout à fait semblable se produit dans un tube analogue, donnant aussi une solution limpide au-dessus de 40° , et que l'on met à l'étuve à 65° - 70° ; mais, dans ce cas, le dépôt est plus lent à apparaître ; ce n'est qu'au bout de cinq heures que l'on voit le liquide se troubler et des centres de cristallisation apparaître sur la paroi du tube. La vitesse avec laquelle se forme ce dépôt dans les solutions de savon résineux est donc d'autant plus faible que la température est moins élevée. Son apparition est d'ailleurs précédée d'une ascension progressive de la température de saturation, comme le montre l'exemple suivant, dans lequel les chauffes successives nécessaires pour mesurer à plusieurs reprises cette température ont suffi à provoquer à la longue sa formation :

Mélange de composition : $\gamma = 1,21$; $z = 2,89$.

Température de saturation, aussitôt après la confection du tube.	62,9 \pm 0,4
— — après 24 h. de séjour à la température ordinaire.	63,7 \pm 0,7
— — après 36 h. — — —	64,2 \pm 0,4
— — après 48 h. — — —	65,2 \pm 0,4
— — après 60 h. — — —	65,8 \pm 0,3

Après soixante-douze heures, il n'est plus possible d'obtenir une solution limpide: il apparaît un dépôt cristallin qui ne fait que s'accroître quand on essaie de le dissoudre en élevant la température.

A température plus basse encore, le dépôt cristallin n'apparaît plus, et la modification que subit, sous l'influence du temps, la solution de savon résineux ne se traduit plus que par une élévation de sa température de saturation, comme le montre l'exemple suivant :

Mélange de composition : $\gamma = 2,01$; $z = 10,63$.

Température de saturation, aussitôt après la confection du tube.	46,5 \pm 0,5
— — apr. 40 jours de séjour à la température ordinaire.	48,3 \pm 0,7
— — apr. 41 — — — —	48,7 \pm 0,7
— — apr. 42 — — — —	48,8 \pm 0,6
— — apr. 45 — — — —	49,1 \pm 0,6

Comme conséquence de ces observations, il conviendra, pour éviter dans la mesure des températures de saturation l'erreur qui peut provenir de cette transformation lente des solutions de savon résineux, de faire la mesure relative à chaque tube aussitôt après sa confection, de la faire une seule fois et aussi rapidement que possible, de manière à éviter d'avoir à maintenir longtemps le tube à température élevée; enfin, de ne pas chercher à déterminer de température de saturation au delà de 80°, les résultats devenant trop incertains quand on dépasse cette température.

C'est en tenant compte de ces conditions, ainsi que de celles qui ont été indiquées plus haut comme permettant d'éviter l'action oxydante de l'air, qu'ont été faites les mesures dont il nous reste maintenant à exposer les résultats.

Sur la saponification de la colophane.

II. Courbes de solubilité;

Par MM. VÈZES et SANS.

I. Comme nous l'avons déjà indiqué, nous définissons la composition des mélanges de soude caustique, colophane et eau, dont nous déterminons la température de saturation, au moyen des deux variables suivantes: la proportion centésimale y de soude pure NaOH contenue dans la solution alcaline employée, et la proportion z de colophane ajoutée à cette liqueur alcaline, rapportée à 100 grammes du mélange ainsi obtenu. En d'autres termes, si m_1 , m_2 , m_3 sont les poids de soude pure NaOH, de colophane et d'eau contenus dans l'unité de poids du mélange, on a

$$y = \frac{100m_1}{m_1 + m_2} \quad \text{et} \quad z = \frac{100m_2}{m_1 + m_2 + m_3}$$

relations qui, avec l'égalité évidente

$$m_1 + m_2 + m_3 = 1,$$

permettraient de calculer, s'il en était besoin, les quantités m_1 , m_2 , m_3 , au moyen des variables y et z .

A chaque mélange, de composition yz , correspond une température T (température de saturation), au-dessus de laquelle il constitue une solution limpide, au-dessous de laquelle il laisse déposer, au contraire, soit de la colophane, soit du savon résineux. La composition des solutions susceptibles de rester, à la température T , en équilibre au contact, soit de colophane, soit de savon résineux, sera représentée, dans l'espace défini par trois axes rectangulaires OT , Oy , Oz , par deux surfaces: la surface de solubilité de la colophane et la surface de solubilité du savon résineux.

Nous avons déterminé la forme de ces surfaces en les sectionnant par des plans parallèles à zOT , c'est-à-dire en déterminant les courbes de solubilité de la colophane dans des solutions alcalines dont la concentration y était donnée *a priori*.

Les tableaux ci-dessous résument les résultats obtenus. Nous faisons figurer dans chacun d'eux, à côté de la concentration y en soude totale de la solution alcaline employée, la portion y_1 de ce poids d'alcali qui

s'y trouve à l'état carbonaté. Dans la colonne des températures, nous inscrivons, à côté de la température de saturation T , les écarts, égaux et de signe contraire, qui la séparent des températures t_1 , t_2 , réellement observées, et dont elle est la moyenne : t_1 étant la température à laquelle apparaît un trouble pendant le refroidissement lent de la liqueur limpide, et t_2 celle où ce trouble disparaît quand on élève lentement la température. Enfin, nous désignerons par la notation z_0 , en tête du tableau relatif à chaque solution alcaline, la proportion de colophane qui correspondrait à la saturation chimique exacte de l'alcali total contenu dans la liqueur ; pour déterminer cette proportion z_0 , on mesure par les procédés ordinaires, avec la phénol-phtaléine comme indicateur, l'acidité de la colophane employée, et l'on calcule, au moyen de cette donnée et du titre γ de la liqueur alcaline employée, le poids z_0 de colophane qui donne avec 100 — z_0 grammes de cette liqueur alcaline une solution neutre à la phénol-phtaléine.

I. SOLUTION ALCALINE $\frac{N}{10} : \gamma = 0,412$ $z_0 = 3,30$ $\gamma_1 = 0,009$		
POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation	NATURE du dépôt
$z = 0,45$	$T = 28,0 \pm 1,0$	Savon
1,01	$17,5 \pm 0,5$	D°
1,34	$9,5 \pm 0,5$	D°
1,83	$0,0 \pm 1,0$	D°
2,53	$< 0^\circ$	(¹)
2,65	$< 0^\circ$	(¹)
3,18	$< 0^\circ$	(¹)
3,52	$< 0^\circ$	(¹)
3,72	Résidu de colophane persistant à toute température.	
3,81		
4,38		
(¹) Dépôt de glace, rendant impossible la constatation du dépôt de savon et la mesure de sa température de saturation.		

II. SOLUTION ALCALINE $\frac{2N}{10} : \gamma = 0,838$ $z_0 = 6,50 :$ $z_1 = 0,012$		
POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation	NATURE du dépôt
$z = 0,57$	$T = 58,0 \pm 0,4$	Savon
0,94	$53,8 \pm 0,8$	D°
2,25	$42,9 \pm 0,7$	D°
2,59	$40,0 \pm 0,4$	D°
3,75	$30,5 \pm 0,5$	D°
4,49	$23,8 \pm 0,2$	D°
4,77	$19,5 \pm 0,5$	D°
5,83	$7,5 \pm 0,5$	D°
6,13	$3,4 \pm 0,4$	D°
6,22	$2,5 \pm 0,5$	D°
7,00	Résidu de colophane persistant à toute température.	
7,30		
7,67		

III. SOLUTION ALCALINE $\frac{3N}{10} : \gamma = 1,234$

$z_0 = 9,35$

$\gamma_1 = 0,010$

POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation	NATURE du dépôt
$z = 0,60$	$T = 80,8 \pm 0,2$	Savon
1,09	$76,7 \pm 0,3$	D°
3,75	$59,5 \pm 0,4$	D°
6,22	$43,0 \pm 0,8$	D°
7,22	$34,8 \pm 0,8$	D°
8,47	$24,5 \pm 0,5$	D°
8,91	$21,2 \pm 0,4$	D°
9,76	Résidu de colophane persistant à toute température.	

IV. SOLUTION ALCALINE $\frac{4N}{10} : \gamma = 1,640$

$z_0 = 12,10$

$\gamma_1 = 0,030$

POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation	NATURE du dépôt
$z = 3,42$	$T = 79,8 \pm 0,8$	Savon
5,28	$70,0 \pm 0,5$	D°
6,55	$63,0 \pm 0,6$	D°
7,66	$56,3 \pm 0,7$	D°
8,52	$51,5 \pm 0,5$	D°
9,37	$45,4 \pm 0,6$	D°
9,55	$44,0 \pm 1,0$	D°
10,78	$37,0 \pm 0,5$	D°
11,09	$33,2 \pm 0,3$	D°
12,24	Résidu de colophane persistant à toute température.	

V. SOLUTION ALCALINE $\frac{5N}{10} : \gamma = 2,000$

$z_0 = 14,30$

$\gamma_1 = 0,035$

POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation	NATURE du dépôt
$z = 8,51$	$T = 70,8 \pm 0,8$	Savon
8,87	$69,0 \pm 0,8$	D°
10,33	$61,0 \pm 0,1$	D°
11,10	$56,8 \pm 1,2$	D°
11,70	$52,7 \pm 0,7$	D°
11,85	$52,1 \pm 0,9$	D°
12,64	$47,5 \pm 0,5$	D°
13,01	$43,9 \pm 0,9$	D°
13,63	$40,5 \pm 0,1$	D°
14,51	Résidu de colophane persistant à toute température.	
15,49		
16,60		

VI. SOLUTION ALCALINE $\frac{6N}{10} : \gamma = 2,358$

$z_0 = 16,25$

$\gamma_1 = 0,021$

POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation	NATURE du dépôt
$z = 9,51$	$T = 80,3 \pm 0,5$	Savon
10,66	$74,5 \pm 0,5$	D°
12,92	$64,2 \pm 0,7$	D°
13,02	$63,7 \pm 0,7$	D°
13,71	$59,3 \pm 0,7$	D°
14,26	$56,8 \pm 0,6$	D°
14,58	$55,0 \pm 0,7$	D°
15,30	$50,5 \pm 0,9$	D°
15,80	$48,1 \pm 0,8$	D°
15,91	$48,7 \pm 0,9$	D°
16,14	$50,6 \pm 0,2$	D°
16,58	Résidu de colophane persistant à toute température.	
16,77		

II. Comme on le voit par ces tableaux, il n'a pu être déterminé de températures de saturation que dans le cas où la solution se trouve en contact avec un dépôt de savon résineux: lorsque la solution se trouve au contact d'un excès de colophane, qu'elle ne peut dissoudre à froid même après une semaine d'agitation continue, cet excès, si faible soit-il, persiste à toute température (c'est-à-dire, en fait, jusque vers 80°, les essais n'ayant pas été poussés plus loin, pour la raison déjà indiquée). La colophane n'est donc pas plus soluble à chaud qu'à froid dans les solutions de savon résineux: sa courbe de solubilité est une droite parallèle à l'axe des températures, droite dont l'ordonnée z_1 dépend essentiellement du titre y de la liqueur alcaline.

On voit de plus, en comparant les valeurs de z qui donnent lieu à un résidu de colophane aux valeurs correspondantes de z_0 , que l'ordonnée z_1 de cette droite est sensiblement égale à z_0 ; c'est-à-dire qu'il ne se dissout, dans une lessive alcaline, d'autre colophane que celle qui est nécessaire pour transformer tout l'alcali en savon résineux neutre à la phtaléine. Cette règle ne paraît souffrir d'exception que dans le cas des solutions très étendues: pour la soude N/10 ($y = 0,412$), en effet, z_1 paraît voisin de 3,60, sa valeur étant certainement comprise entre 3,52 et 3,72, tandis que z_0 correspond à la valeur un peu inférieure 3,30.

Il résulte enfin de la forme rectiligne de ces courbes de solubilité que, dans l'espace défini par les trois axes rectangulaires OT, Oy, Oz, la surface de solubilité de la colophane dans les solutions de soude caustique est constituée par un cylindre dont les génératrices sont parallèles à OT et dont la section par le plan yOz est la courbe définie par les valeurs correspondantes de y et de z_1 . Cette courbe, qui s'écarte assez peu d'une droite, est bien représentée, à part l'exception signalée ci-dessus, par la formule parabolique

$$z_1 = 8,20 y - 0,525 y^2,$$

comme le montre le tableau suivant:


y	z_1 TROUVÉ	z_1 CALCULÉ
0,412	3,60	3,29
0,838	6,50	6,50
1,234	9,35	9,32
1,649	12,10	12,09
2,000	14,30	14,30
2,358	16,25	16,41

III. Déterminons de même la surface de solubilité du savon résineux. Ses sections par des plans parallèles à zOT , correspondant à six valeurs particulières de γ , sont fournies par les valeurs correspondantes de z et de T figurant dans les tableaux ci-dessus. Construisons ces six courbes de solubilité dans le plan zOT , où elles se projettent en vraie grandeur. Adjoignons-y les droites, parallèles à OT , d'ordonnée z_1 , qui figurent la solubilité de la colophane dans les mêmes solutions. Nous obtenons ainsi le graphique ci-après (p. 106).

On voit par l'examen de ce graphique que les courbes de solubilité du savon résineux diffèrent peu de lignes droites. La variation de z en fonction de T dans chacun des tableaux qui précèdent peut en effet être représentée, au moins en partie, par les équations linéaires suivantes, en regard desquelles nous indiquons les limites de température entre lesquelles chacune de ces équations est applicable, et les écarts limites qu'elle donne entre les valeurs de z calculées et trouvées.

TABEAU	γ	ÉQUATIONS	LIMITES DE TEMPÉRATURE	ÉCARTS LIMITES
I	0,412	$z = 1,83 - 0,0493 T$	$T = 0^\circ \text{ à } T = 28^\circ$	$- 0,04 \text{ à } + 0,02$
II	0,838	$z = 7,22 - 0,1146 T$	20 à 58	$- 0,03 \text{ à } + 0,11$
III	1,234	$z = 12,23 - 0,1439 T$	20 à 81	$- 0,18 \text{ à } + 0,27$
IV	1,649	$z = 18,29 - 0,1863 T$	50 à 80	$- 0,05 \text{ à } + 0,28$
V	2,000	$z = 20,15 - 0,1610 T$	40 à 71	$- 0,24 \text{ à } + 0,13$
VI	2,338	$z = 25,60 - 0,2000 T$	52 à 81	$- 0,04 \text{ à } + 0,16$

La façon dont ces courbes rencontrent les droites, parallèles à OT , qui figurent la solubilité de la colophane, n'a pu être déterminée avec beaucoup de précision, parce qu'il est très difficile d'obtenir un tube scellé correspondant exactement à une composition prévue *a priori*, étant donnée la nécessité de laisser dans ces tubes le moins d'air possible. La sixième courbe ($\gamma = 2,358$) fournit néanmoins, à ce point de vue, des indications assez précises : elle dénote l'existence d'une courbe de raccordement entre les deux droites ou quasi-droites. La diminution de solubilité que manifeste cette courbe de raccordement paraît due à la petite quantité d'alcali carbonaté que contient la solution alcaline employée, comme le montrent des expériences encore en cours qui seront publiées ultérieurement : il est vraisemblable qu'avec



des solutions alcalines complètement exemptes de carbonate, les quasi-droites inclinées qui définissent la solubilité du savon résineux se prolongeraient jusqu'à leur rencontre à angle aigu avec les droites, parallèles à OT, qui représentent la solubilité de la colophane.

D'autre part, il est évident que ces quasi-droites inclinées ne doivent pas être prolongées vers le bas du graphique, jusqu'à leur rencontre avec l'axe des températures : le point de la première courbe, par exemple, dont l'ordonnée z est nulle, correspond à la solution alcaline de concentration $y = 0,412$, sans aucune addition de colophane ; or, cette solution est limpide à toute température supérieure à son point de congélation, lequel est de $-0^{\circ},37$, d'après les recherches classiques de Raoult. Il est donc nécessaire que la première courbe, lorsqu'on fait tendre z vers zéro, cesse de descendre de gauche à droite, donne lieu à un maximum de température, et longe ensuite l'axe OT dans la direction des températures décroissantes, jusqu'à ce qu'elle l'atteigne à la température de $-0^{\circ},37$. Étant donné le peu d'intérêt qu'offre, au point de vue pratique, ce maximum de température, et les difficultés que présente sa détermination, nous n'avons pas jugé utile d'en fixer la position exacte ; il est visible d'ailleurs qu'il est très voisin de l'axe des températures (il suffit d'une très faible quantité de colophane pour donner un trouble dans la sonde N/10), et que sa température est comprise entre $+28^{\circ}$ et $+35^{\circ}$. Il en sera de même pour les autres courbes ; nous donnons dans le tableau ci-dessous, pour chacune d'elles, la position approximative du maximum, toujours très voisin de l'axe des températures, et la température où la branche inférieure de la courbe vient rencontrer l'axe OT, température qui a été calculée au moyen des données de Raoult.

y	TEMPÉRATURE DU MAXIMUM	POINT DE CONGÉLATION
0,412	De $+28^{\circ}$ à $+35^{\circ}$	$-0^{\circ},37$
0,838	De $+58^{\circ}$ à $+63^{\circ}$	$-0,76$
1,234	De $+81^{\circ}$ à $+85^{\circ}$	$-1,12$
1,649	?	$-1,49$
2,000	?	$-1,81$
2,358	?	$-2,14$

En résumé, l'ensemble des courbes relatives à chaque valeur y du titre de la liqueur alcaline affecte à peu près la forme d'un Z renversé (Σ), dont la branche inférieure serait presque confondue avec l'axe OT.

Sur la règle de Kummer;

Par M. H. PADÉ.

Kummer a fait connaître (*J. de Crelle*, XIII, p. 171, 1835), un critère qui permet de décider, dans certains cas, de la convergence ou de la divergence d'une série à termes positifs $a_0 + a_1 + a_2 + \dots$

La première partie de ce critère consiste en ce que la série proposée est convergente quand il existe une suite illimitée de nombres positifs P_n tels que l'on ait $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n a_n = 0$, et, à partir d'une certaine valeur de n ,

$$P_n \frac{a_n}{a_{n+1}} - P_{n+1} > \alpha > 0,$$

α désignant un nombre indépendant de n .

On serait aisément porté à s'exagérer le degré de généralité de cette règle, en raison de l'indétermination très grande qu'elle semble laisser dans le choix des nombres P_n . En fait, elle n'est qu'une modification du critère général, appliqué depuis Gauss, qui se déduit du principe de la comparaison des séries et qui peut être énoncé ainsi : une série à termes positifs est convergente lorsque, c_n étant le terme général d'une série convergente, on a, à partir d'une certaine valeur de n ,

$$(1) \quad \frac{a_n}{c_n} < A,$$

A étant une constante positive quelconque; elle ne peut donner rien de plus que ce que donne ce critère lui-même. C'est ce que montre bien la démonstration suivante :

Soit R_n un nombre qui tend, en décroissant, vers une limite quelconque ω quand n grandit indéfiniment; la différence

$$(2) \quad c_n = R_{n-1} - R_n$$

est alors le terme général d'une série à termes positifs convergente. Il est évident que, réciproquement, le terme général d'une telle série peut toujours être mis sous cette forme, car il suffira, pour y parvenir, de prendre R_n égal à la somme du reste de la série arrêtée au terme a_n et de ω .

L'inégalité (1) devient alors

$$(3) \quad \frac{R_{n-1} - R_n}{a_n} > \frac{1}{A}.$$

Prenons $R_n = P_n a_n$, en sorte que P_n est un nombre qui est seulement assujéti à cette condition que $P_n a_n$ tende, en décroissant constamment, vers une limite, quand n grandit indéfiniment. La condition de convergence (3) devient alors, en remplaçant $\frac{1}{A}$ par α :

$$P_{n-1} \frac{a_{n-1}}{a_n} - P_n > \alpha > 0.$$

Cette condition de convergence suffit d'ailleurs à elle seule, si l'on suppose que P_n soit un nombre positif, car on en tire

$$P_n a_n < P_{n-1} a_{n-1},$$

ce qui montre que le nombre positif $P_n a_n$ est décroissant et tend, par suite, vers une limite quand n grandit indéfiniment.

La règle de Kummer se trouve ainsi établie et l'on voit, de plus, que la condition $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n a_n = 0$ qu'elle comporte, est superflue.

Sur la formule du prismatoïde;

Par M. BARBARIN.

La formule de Simpson,

$$(1) \quad V = \frac{h}{6} (B + B' + 4B''),$$

exige pour le calcul du volume du prismatoïde la connaissance de trois aires, les bases B , B' et la section à mi-hauteur B'' . A la vérité, dans un grand nombre de cas particuliers, par exemple quand une section S perpendiculaire à h est fonction du second degré de la

distance, B' s'exprime, mais d'une façon irrationnelle, au moyen de B et B' par

$$B' = \frac{B + B'}{4} + K \pm \sqrt{\frac{BB'}{4} - 2K \frac{B + B'}{4} + K^2},$$

K étant une certaine constante ; donc V est une irrationnelle du second degré de B et B' .

En prenant à la place des bases B et B' des sections convenables d'aires S_1 et S_2 accompagnées de coefficients respectifs α_1 et α_2 , on peut substituer à la formule de Simpson une formule plus simple,

$$(2) \quad V = h(\alpha_1 S_1 + \alpha_2 S_2),$$

qui a l'avantage d'être rationnelle et de se prêter aisément aux applications. Un cas particulier de la formule (2) est exposé dans le récent ouvrage de M. George Bruce Halsted, *Rational Geometry*, que j'ai analysé au *Bulletin des Sciences mathématiques* (1907, p. 317). Le principe est celui-ci : tout prismatoïde renfermé entre deux plans parallèles de distance h est une somme de tétraèdres ayant un sommet sur un des plans et trois sur l'autre, ou deux sommets sur chaque plan. Soient $x_1 = \lambda_1 h$, $x_2 = \lambda_2 h$ les distances des plans des sections S_1 et S_2 à l'extrémité de la hauteur choisie comme origine, il faut lier λ_1 et λ_2 par l'équation

$$(3) \quad \lambda_1 \lambda_2 - \frac{1}{2}(\lambda_1 + \lambda_2) + \frac{1}{3} = 0$$

prendre

$$\alpha_1 = \frac{\frac{1}{2} - \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}, \quad \alpha_2 = \frac{\frac{1}{2} - \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1},$$

ce qui donne en définitive la formule cherchée

$$(4) \quad V = \frac{h}{4(3\lambda_1^2 - 3\lambda_1 + 1)} [S_1 + 3(2\lambda_1 - 1)^2 S_2]$$

exprimée au moyen du seul paramètre variable λ_1 . Quand λ_1 varie de $\frac{2}{3}$ à 1, λ_2 varie de zéro à $\frac{1}{3}$, et c'est précisément pour $\lambda_1 = 1$ et

$\lambda_2 = \frac{1}{3}$ que l'on retrouve la formule particulière

$$V = \frac{h}{4} (B + 3S)$$

de Halsted. S est alors la section menée parallèlement à la base B et aux $\frac{2}{3}$ de la hauteur à partir de cette base.

Les migrations des parasites

(1^{re} CONFÉRENCE);

Par M. CH. PÉREZ.

Séance du 4 juin 1908.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUGH

Les vins rouges girondins de 1907;

Par le D^r P. CARLES.

Les personnes qui fréquentent les congrès viticoles ou qui en lisent les comptes rendus, ont pu être frappées par ce fait : c'est que depuis quelques années les chimistes œnologues demandent qu'on analyse tous les ans les vins des principales contrées de France, afin d'avoir une base d'appréciation lorsqu'ils ont à déterminer la pureté d'un vin de telle année et de telle région.

Le travail que nous avons fait dans ce sens déjà plusieurs fois pour les vins rouges de la Gironde, nous semble répondre à ce vœux. Celui de cette année apporte lui-même plus d'intérêt peut-être que les précédents, en ce sens qu'il met en parallèle la constitution des 1906 et 1907; récoltes dissemblables.

APPRÉCIATION CHIMIQUE. — En 1907, comme les années précédentes, un certain nombre de propriétaires viticulteurs girondins nous ont apporté des échantillons de leurs vins rouges nouveaux pour en avoir l'analyse générale. Cette analyse leur permet de connaître les côtés forts et faibles de leurs vins. Elle a pour eux l'avantage, déjà apprécié, de faciliter, d'enlever parfois la vente de leur récolte en primeur, surtout à l'étranger; et, dans le cas de mévente, de préciser les soins spéciaux que réclament les points faibles du vin. Il y a même

des crus qu'à cause de cela on soumet à notre examen à plusieurs reprises.

Ces analyses n'ont lieu, de façon générale, qu'à partir du troisième mois, dès la séparation des grosses lies par les froids précoces. A partir de ce moment, elles permettent de compléter l'avis des dégustateurs, de le préciser par des chiffres, parfois même de le modifier; car si la dégustation et la chimie œnologique se complètent, elles sont toutes deux faillibles dans leurs appréciations.

Or, voici nos résultats (*Voir les tableaux ci-contre*):

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS. — Degré alcoolique. — Il est en moyenne générale de 9,97 ou bien de 10 en nombre rond, en retard de deux unités sur le degré moyen des 1906 qui, lui, était de 12 ou en réalité de 11,95. Cette différence est surtout sensible sur les vins qui ont été vendangés après le 5 ou le 6 octobre. A cette époque les pluies, bienfaisantes par leur intermittence jusque-là, deviennent nuisibles par leur continuité et leur abondance.

Extrait réduit. — C'est l'extrait sec brut obtenu à 100 degrés dont on a séparé conventionnellement le poids du sucre supérieur à 1 gramme par litre. Cet extrait est, cette année, de 21 grammes 50 par litre, alors qu'il était l'année avant de 26,75, soit une différence de 5,25. Cet écart tient en grande partie à la dilution naturelle qu'a subie, par la sève, le jus du raisin sous l'influence tardive des pluies. Mais qu'on n'oublie pas que nous avons cependant des maxima de 28,50 attribuables non seulement à l'opportunité du moment des vendanges, mais aussi à l'ensemble des soins intelligents donnés par certains viticulteurs autant à la vinification en cuve qu'à leur vignoble.

Sucre réducteur ou de fruit. — On en trouve par litre 1,46 au lieu de 2,35 dans les 1906 à la même époque. Au moment où nous écrivons, ce sucre a à peu près disparu, tandis qu'une part persiste dans quelques rares 1906. Cette persistance tient non seulement à la constitution générale dissemblable des deux récoltes, mais surtout au degré alcoolique des 1906, degré assez élevé pour rendre le ferment alcoolique très paresseux. Il y a aussi une autre cause qu'il est bon ici de mettre en relief, car on l'a bien des fois mise inopportunément en œuvre pour les 1906. Cette cause, la voici :

Quand on constate qu'un vin de plus de six mois est en fermenta-

	MARGAUX	MARGAUX	MARGAUX	MARGAUX	MARGAUX	MARGAUX	MARGAUX	MARGAUX	MARGAUX	MÉDOC	MÉDOC	PAVILLAC	LESPARRE	BLANQUEFORT	VENSAAC
Densité.	996	995	996,5	994	995	994,5	994,5	994,5	994	996	995	994	995	994	995
Degré alcoolique. . . .	10,40	9,75	9,25	10,25	10,20	10,75	10,50	10,75	10,75	10,10	9,70	9,90	10,00	10,70	9,30
Alcool en poids (gr. par litre).	82,70	77,50	73,50	81,60	81,10	85,50	83,50	85,40	85,50	80,30	77,10	78,70	79,50	85,10	78,10
Extrait sec à 100° . . .	23,25	20,50	21,45	22,50	25,00	23,50	22,50	24,00	24,50	27,70	20,75	21,00	20,50	21,25	21,00
» réduit	23,00	19,60	21,10	21,90	24,10	23,30	22,23	23,70	23,40	27,00	20,75	20,00	20,00	19,95	20,00
» Houdart	22,80	20,10	20,60	20,50	22,50	21,60	21,60	22,10	23,20	25,50	19,80	21,10	20,80	21,10	20,63
Sucre réducteur	1,25	1,90	1,35	1,60	1,90	1,20	1,27	1,30	2,10	1,70	0,70	2,01	1,50	2,30	1,37
Sulfate de potasse . . .	0,32	0,30	0,30	0,31	0,40	0,31	0,42	0,40	0,42	0,57	0,54	0,42	0,41	0,39	0,46
Rapport alcool extrait	3,59	3,95	3,53	3,75	3,36	3,36	3,76	3,60	3,65	2,97	3,76	3,93	3,97	4,20	3,56
Acidité totale en SO ⁴ H ² .	3,28	3,78	3,78	3,64	3,52	3,64	3,80	4,02	3,78	4,10	4,10	3,83	3,70	3,32	5,13
Acides volatils	0,90	0,61	0,72	0,54	0,57	0,63	0,45	0,65	0,61	0,59	0,63	0,52	0,78	0,50	0,73
Sommes alcool et acide.	13,68	13,53	13,03	13,89	13,72	14,39	14,30	14,77	14,53	14,20	13,80	13,73	13,70	14,02	14,43
Tartre corresp ¹ à la potasse totale.	5,40	5,60	6,62	2,72	5,38	5,74	5,18	4,75	6,02	6,48	4,66	4,57	5,55	5,04	4,93
» » à l'acide tart ^r total.	4,60	4,14	3,66	3,52	3,58	3,30	2,92	3,25	3,50	3,57	2,55	3,16	2,55	3,81	2,53
Acide tartrique libre . .	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cendres.	3,00	3,00	2,40	2,50	2,50	2,75	3,00	2,25	2,50	2,90	2,10	2,50	2,10	2,75	2,50
Mannite.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déviation saccharimétrique.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-0,40	0,00	0,00	0,00	-3/4	-0,50
Couleur.	stable	stable	stable	cas. bleue	stable	stable	stable	stable	stable	st. tr. bel.	stable	stable	naturelle	stable	stable
Examen microscopique.	favorable	favorable	assez fav.	favorable	favorable	tr. favor.	favorable	favorable	favorable	passable	favorable	favorable	passable	favorable	défavor.
Oenotain	1,40	?	?	?	?	1,45	1,47	1,43	?	?	?	1,38	?	?	?

tion sourde et ne présente pas au goût une douceur sensible, on le mèche plus ou moins et si, au bout de quelques jours, tout est revenu dans l'ordre, on se félicite du résultat, on considère que la fermentation est sans retour et on ne surveille plus le vin, du moins de près.

C'est ce que bien des détenteurs des 1906 ont fait au printemps dernier et ce qui a entraîné beaucoup de déboires. Voici comment :

Un vin peut contenir, selon sa constitution, de 5 à 8 grammes de sucre par litre, sans que sa présence soit bien sensible à la dégustation. Le sort de ce sucre dans un vin rouge de degré ordinaire est de disparaître par fermentation alcoolique. Si, lorsque cette fermentation s'établit lentement, on mèche ce vin, on amoindrit sans doute l'énergie des levures et autres ferments qu'il contient toujours, mais on ne les tue pas. Avec le temps, au contraire, l'acide sulfureux disparaît fatalement, les levures et ferments divers reprennent leur force, le mycoderme de l'acescence va sur ce point beaucoup plus vite que les autres à cause de son siège en surface et le vin se pique avant même de refermenter.

Au lieu de cela, on aurait dû favoriser la fermentation du sucre *dès le début* (1) et n'avoir recours à l'acide sulfureux que lorsque la chimie eut affirmé que le sucre était nettement tombé au-dessous de 2 grammes.

Avec les 1907, on est sûr de n'avoir pas ce genre de déboires.

Sulfate de potasse. — Il reste cette année dans la même moyenne que précédemment, soit 0,35 au lieu de 0,38. C'est d'ailleurs le taux, on pourrait dire officiel, des vins rouges girondins non encore touchés par l'acide sulfureux. Mais après les soutirages de mars, cette proportion s'élève un peu et toujours proportionnellement au nombre et à l'intensité des méchages.

(1) Voici un moyen aussi simple qu'efficace de favoriser et de hâter cette fermentation quand elle commence à se manifester : on fait dans la barrique un creux de quinze litres environ, on la bonde et on l'agite très vivement. Dans ce but, deux hommes se la renvoient l'un à l'autre en la faisant rouler ; d'autres préfèrent la balancer dans le sens de son axe, comme s'ils voulaient la rincer à la chaîne. On peut encore sans bouger le fût fouetter le contenu vivement.

Cette opération agit en donnant de la vitalité au ferment en aérant le vin et aussi en faisant dégager le gaz carbonique. Ceci on le constate, en ouvrant la bonde après le roulis ou le tangage. L'opération doit être faite deux fois par jour. On cesse dès que l'acide carbonique ne se dégage plus.

Rapport alcool-extrait. — Ce rapport doit son importance à ce qu'il constitue un des facteurs principaux propres à déceler le vinage direct ou même indirect. Indirect vise le sucrage à la cuve. Le Comité des arts et manufactures a fixé sa limite à 4,50 et par tolérance 4,60. L'an dernier, nous constatons que ce nombre avait été dépassé dans le vin d'une île de la Garonne. Cette année, nous le trouvons encore plus élevé dans un petit vin de palus. On lira, en effet, 4,81 comme maxima dans notre tableau.

Acidité totale. — Exprimée selon l'usage français, en acide sulfurique, elle est de 4,00 cette année, alors que l'an dernier elle atteignait 1/4 de gramme de plus, soit 4,28 en moyenne. Il y aura là de quoi surprendre les dégustateurs. Cette dissimulation de l'acidité dans les 1906 tient à l'abondance de l'ensemble des matières qui composent l'extrait sec et même à l'élévation du degré alcoolique, tandis que dans les vins nouveaux cette acidité est plus franche, plus nue. C'est ce sentiment qu'on traduit en disant que ces vins ont plus de fraîcheur.

Acides volatils. — Même moyenne que pour les 1906, mais plus d'uniformité dans les doses individuelles. Ceci tient à ce que tous les moûts à la cuve avaient plus d'acidité initiale que ceux de l'année auparavant. La faiblesse de dose de ces acides est d'autant plus agréable à constater qu'on était autorisé à s'attendre à des nombres plus élevés, du moins pour beaucoup de vins. Or, on sait aujourd'hui que moins un vin nouveau renferme d'acides volatils et plus on l'estime à l'étranger comme de garde aisée et de valeur à venir. Cette assertion n'est pas sans fondement, car il est avéré que les acides volatils sont engendrés par les microbes pathogènes du vin.

Somme acide-alcool. — Cette somme est un des arguments les plus précis pour dénoncer le mouillage lorsqu'elle est trop faible. Les 12,61 inscrits à notre minima représentent sur ce point l'extrême limite; quant à la moyenne, d'ailleurs satisfaisante, elle offre deux degrés d'écart avec les 1906. Ce sont juste les deux degrés d'alcool que ces derniers ont en plus.

Acide tartrique libre. — Un seul vin, et non des moindres dans la hiérarchie girondine, a présenté un petit excès d'acide tartrique libre. Cela tient à ce que la vendange originaire a été récoltée, pour une

cause quelconque, dans un état de maturité incomplète. Nous reviendrons ailleurs sur cette question spéciale. Ce ne sera pas inutile à cause de la loi des fraudes.

Mannite. — Substance hygiéniquement innocente, mais qui a été pendant quelque temps la terreur des viticulteurs et négociants. Son intérêt vinicole principal repose sur ce qu'elle dénonce des vices de vinification à la cuve. La nature des raisins non surmûris et l'abaissement de température survenu durant les vendanges faisaient pressentir qu'on n'en trouverait pas dans les 1907. Il n'y en a nulle part, en effet.

Examen microscopique. — Pratiqué vers la fin de l'hiver, il a montré que le cinquième environ des vins nouveaux étaient fâcheusement surchargés de germes pathogènes. Mais nous avons eu plus haut la preuve que tous ces microorganismes sont restés en léthargie constamment, car leur action a été nulle sur la dose des acides volatils. Les examens supplémentaires pratiqués après les soutirages de printemps nous ont marqué que la généralité de ces microbes sont restés dans les lies. C'était utile et opportun.

Couleur. — Elle n'a pas l'intensité de celle des 1906, mais elle possède parfois plus de vivacité. Au début les casses bleues et jaunes n'étaient pas très rares dans les vins tardivement vendangés; mais avec les traitements licites bien connus, le mal a pu être aisément jugulé. Quelques crus y ont perdu un peu de leur rubis, mais ce qui reste est bien fixe et suffisant.

Tanin. — Comme la couleur, le tanin ne se forme que tardivement avec l'intensité de la lumière solaire, de la chaleur et même de la sécheresse. Voilà pourquoi nous en avons dosé 4,12 en moyenne dans les 1906 et 1,40 en moyenne seulement dans les 1907. Cette différence est fort notable et une des causes principales de la dissemblance des vins de deux années consécutives.

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS. — Les vins rouges girondins de 1907 sont de constitution chimique moyenne. Si, dans les premiers mois de leur existence, on a été autorisé à avoir quelque inquiétude sur leur valeur et leur tenue, on ne l'est plus aujourd'hui. Malgré la légère différence qui existe entre ceux du commencement et de la fin des vendanges, l'ensemble est en situation de se bien conserver, et s'ils ne paraissent

pas appelés à former une récolte de grande année, ils auront du moins l'avantage d'être vite en situation de faire figure sur les tables bien servies.

Voici le résumé de tous ces tableaux. Nous l'avons mis en regard de celui de l'analyse des 1906.

	1907			1906		
	Plus haut.	Plus bas.	Moyenne générale.	Plus haut.	Plus bas.	Moyenne générale.
Densité.	998	993	994,9	997	992,5	994,8
Degré alcoolique.	11,4	8,9	9,97	13,2	10,5	11,95
Alcool en poids	90,60	70,70	79,26	104,90	83,5	95,00
Extrait brut à 100°.	30,00	16,20	22,03	37,50	22,50	28,40
» réduit.	28,50	16,10	21,49	34,00	18,90	26,75
» densimétrique	29,50	16,20	21,12	»	»	»
Sucre réducteur.	2,50	0,50	1,46	6,60	0,70	2,35
Sulfate de potasse.	0,57	0,30	0,35	0,45	0,30	0,38
Rapport $\frac{\text{alcool}}{\text{extrait}}$	4,81	2,07	3,67	4,50	2,99	3,59
Acidité totale	5,17	3,28	4,00	5,44	3,57	4,28
Acides volatils	0,97	0,44	0,64	1,02	0,18	0,65
Sommes acide-alcool.	15,52	12,61	13,95	18,21	14,38	16,22
Tartre correspondant à la potasse totale	6,62	2,72	4,95	?	?	?
» » à l'acide tartrique total.	4,60	2,11	3,32	3,78	1,40	2,92
Acide tartrique libre.	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00
Cendres	3,00	1,75	2,41	3,10	1,75	2,52
Mannite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Déviati on saccharimétrique.	-0,75	-0,30	-0,14	»	»	»
Microscope	favorable	défavor.	assez fav.	excellent	mauvais	favorable
Couleur	très belle	cassable.	belle	très belle	belle	très belle
Tanin	1,47	1,38	1,40	4,90	3,25	4,12
				(1)		

(1) Les 1906 qui parviennent à des doses pareilles de tanin ne vieilliront dans la bonne acception du mot qu'en perdant une bonne partie de ce tanin au moyen de soutirages et de collages répétés.

Sur la saponification de la colophane ;**III. Isothermes.**

Par MM. VÈZES et SANS.

I. Du graphique antérieurement donné ⁽¹⁾, où se trouvent figurées les courbes de solubilité de la colophane landaise (échantillon de nuance M) et du savon résineux sodique dans diverses solutions étendues de soude caustique, il est facile de déduire l'isotherme des deux surfaces de solubilité correspondantes, c'est-à-dire leur section par des plans parallèles à YOZ et correspondant chacun à une température déterminée. Chaque courbe de solubilité, correspondant à une valeur déterminée γ du titre alcalimétrique, fournit en effet trois points de chaque isotherme, l'un correspondant à l'équilibre avec la colophane, les deux autres à l'équilibre avec le savon résineux. Il est aisé de déterminer les coordonnées de ces points dans le plan YOZ ou dans des plans parallèles : leur commune abscisse est la valeur de γ correspondant à la courbe de solubilité considérée, et leurs ordonnées sont celles des points où cette courbe rencontre la verticale correspondant à la température de l'isotherme à construire. L'ordonnée z_1 du premier de ces points sera, comme on l'a déjà vu, indépendante de la température (au moins entre 0° et 80°), et, par suite, les diverses isothermes de la surface de solubilité de la colophane se projeteront sur le plan YOZ suivant une courbe unique : c'est l'arc de parabole, différant peu d'une droite, dont nous avons donné plus haut ⁽¹⁾ l'équation et les principaux points. Le second point est donné par les branches inclinées, quasi rectilignes, des courbes de solubilité ; nous n'avons pas tenu compte ici des courbes de raccordement qui relient ces branches inclinées aux branches horizontales supérieures, ce qui revient à supposer l'alcali employé complètement exempt de carbonate. Enfin, le troisième point est très voisin de l'axe OT, et son ordonnée z_2 , très voisine de zéro, dépend vraisemblablement très peu de la température, de sorte que les branches correspondantes des différentes isothermes paraissent se

⁽¹⁾ *Procès-verbaux de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, séance du 14 mai 1908.*


confondre entre elles et avec l'axe OY, qu'elles longent jusqu'au point correspondant à la solution saturée de soude caustique : ce point, qui est fourni par les recherches de Pickering (*Chem. Soc.*, t. LXIII, p. 890), correspond, pour les isothermes de 0°, 10°, 20°, 30°, 40° et 50°, aux valeurs de γ ci-après, en regard desquels nous indiquons la formule de l'hydrate alcalin par rapport auquel la solution se trouve saturée :

ISOTHERME	CONCENTRATION EN NaOH de la solution saturée	HYDRATE DÉPOSÉ
T = 0°	$\gamma = 29,5$	NaOH.4H ² O
10°	34,0	NaOH.3,5H ² O
20°	52,3	NaOH.H ² O
30°	54,3	D°
40°	56,4	D°
50°	59,1	D°

Voici les données, déduites du graphique des courbes de solubilité, qui définissent les isothermes de 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°.

γ	ISOTHERME de la surface de solubilité de la colophane	ISOTHERMES DE LA SURFACE DE SOLUBILITÉ DU SAVON RÉSINEUX						
		0°	10°	20°	30°	40°	50°	Branche inférieure
0,412	$z_1 = 3,60$	$z = 1,83$	$z = 1,35$	$z = 0,85$	$z = 0,38$	»	»	$z_1 =$
0,838	6,50	6,45	5,60	4,78	3,76	$z = 2,60$	$z = 1,50$	Valeurs
1,234	9,35	»	»	9,10	7,79	6,53	5,10	très
1,649	12,10	»	»	»	11,50	10,14	8,75	voisines
2,000	14,30	»	»	»	»	13,70	12,20	de
2,358	16,25	»	»	»	»	»	15,35	zéro

Ces données se trouvent résumées dans le graphique ci-contre : en ce graphique, un point quelconque représente un mélange de colophane, soude et eau de composition déterminée, son ordonnée z



donnant la proportion centésimale de colophane qu'il contient, tandis que son abscisse y représente la proportion centésimale de soude NaOH que contenait la liqueur alcaline qui a servi à le former. Ce mélange sera en équilibre à l'état de solution limpide, à une température donnée, si son point figuratif se trouve à l'intérieur de l'angle aigu formé par les deux branches de l'isotherme relative à cette température. La région située à gauche et au-dessus de cet angle aigu correspond aux mélanges qui, à cette température, ne sont en équilibre qu'à l'état hétérogène constitué par un dépôt de colophane et une solution de savon résineux dont la composition est représentée par un point de la branche supérieure de l'isotherme. La région située à droite et au-dessous du même angle aigu (exception faite pour les points situés sur l'axe Oy ou dans son voisinage immédiat) correspond aux mélanges qui, à la même température, ne sont en équilibre qu'à l'état hétérogène constitué par un dépôt de savon résineux et une solution dont la composition est représentée par un point de la branche moyenne de l'isotherme.

Sur la saponification de la colophane.

IV. Cas de la colophane américaine;

Par MM. VÈZES et SANS.

I. L'étude de la colophane d'Amérique, au point de vue de sa saponification par les solutions de soude caustique donne lieu aux mêmes difficultés que celle de la colophane landaise : l'influence de l'oxygène de l'air, celle des températures élevées s'y manifestent de la même façon et imposent au mode opératoire adopté les mêmes restrictions et des précautions identiques.

En ce qui concerne l'oxygène de l'air et son influence sur la colophane sèche, voici les résultats de deux séries de mesures de la température de saturation, effectuées au moyen de deux solutions alcalines de composition à peu près identique, et de deux échantillons de colophane provenant d'un même bloc, mais dont l'un A avait été pulvérisé deux mois environ avant l'emploi et conservé depuis lors dans un col droit bouché à l'émeri et à moitié rempli d'air, tandis

que l'autre B n'a été pulvérisé que quelques heures avant la confection des tubes (1).

SOLUTION ALCALINE $\frac{5N}{10} : y = 2,03$ COLOPHANE A $y_1 = 0,03$	
POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation
$z = 6,13$	$T = 69,0 \pm 0,6$
8,26	$60,7 \pm 0,7$
10,18	$50,8 \pm 0,8$
12,03	$40,0 \pm 0,5$
13,47	$32,3 \pm 0,7$

SOLUTION ALCALINE $\frac{5N}{10} : y = 2,01$ COLOPHANE B $y_1 = 0,04$	
POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation
$z = 7,12$	$T = 72,7 \pm 0,7$
8,78	$64,9 \pm 0,8$
10,44	$55,3 \pm 0,7$
11,00	$52,6 \pm 1,0$
11,20	$51,3 \pm 0,9$
13,70	$37,5 \pm 0,5$

On voit, en comparant les nombres des deux tableaux ci-dessus, et mieux encore en construisant les courbes qui les résument, que l'oxydation subie par la colophane A, pendant son séjour prolongé à l'air, a eu pour effet d'abaisser sa température de saturation de quantités variant entre 5° et 10°. Cette variation est sensiblement plus faible que celle que nous avons observée, dans des circonstances analogues, pour la colophane landaise ; mais il faut observer que les échantillons employés dans les deux cas différaient sensiblement par leur couleur, l'échantillon landais correspondant à la nuance M, tandis que l'échantillon américain correspondait à la nuance plus foncée G de l'échelle américaine usuelle, de sorte que l'échantillon américain, primitivement plus oxydé, devait avoir par cela même une vitesse d'oxydation plus faible que l'échantillon landais. Quoi qu'il en soit, l'influence de l'oxydation ayant été mise en évidence par cette comparaison, nous avons appliqué à l'étude de la saponification de la colophane d'Amé-

(1) Les notations employées dans ces tableaux comme dans les suivants sont celles qui ont été définies dans notre communication du 14 mai 1908 : T est la température de saturation, y le poids de soude pure NaOH contenu dans 100 grammes de la solution alcaline employée à faire les mélanges, y_1 la portion de ce poids d'alcali qui s'y trouve à l'état carbonaté, z le poids de colophane contenu dans 100 grammes du mélange, et z_1 le poids de colophane qui donne, avec 100 — z, grammes de cette liqueur alcaline, une solution neutre à la phénol-phtaléine.

rique les mêmes précautions que pour celle de la colophane landaise : ne pulvériser la colophane qu'au moment de l'introduire dans les tubes, confectionner ceux-ci aussi rapidement que possible, enfin y laisser le moins d'air possible.

D'autre part, le séjour des solutions de savon résineux à température élevée donne lieu, dans le cas de la colophane américaine comme dans le cas de la colophane landaise, à la formation d'un dépôt cristallin permanent, ou, si la température est moins élevée, à une élévation progressive de la température de saturation. C'est ainsi qu'un tube, construit en tenant compte des précautions indiquées ci-dessus, contenant un mélange défini par les nombres $\gamma = 1,614$, $z = 7,74$, et ayant donné, après les quelques heures d'agitation à froid qui suffisent pour la saponification complète de la colophane qu'il renferme, une température de saturation de $54^{\circ},2 \pm 0^{\circ},9$, a fourni, après quelques heures passées à l'étuve à 100° - 105° , un dépôt insoluble et cristallin, persistant aussi bien lorsqu'on élève encore la température que lorsqu'on la laisse redescendre jusqu'à la température ordinaire. Un autre tube, construit de même et contenant un mélange défini par les nombres $\gamma = 2,010$, $z = 11,20$, a donné :

Température de saturation, aussitôt après la construction du tube	51,3 \pm 0,9
— — après 32 jours de séjour à la température ordinaire.	52,7 \pm 0,9
— — après 33 — — — — .	52,8 \pm 0,8
— — après 35 — — — — .	52,9 \pm 0,8
— — après 35 jours à froid et 24 heures à 60° - 70° .	55,0 \pm 1,0

A ce point de vue encore, il y a donc lieu d'appliquer à l'étude de la saponification de la colophane américaine les mêmes précautions que pour celle de la colophane landaise : faire la mesure relative à chaque tube aussitôt après sa confection, la faire en une seule fois et aussi rapidement que possible, enfin laisser de côté, comme ne présentant pas une certitude suffisante, les résultats obtenus à des températures supérieures à 80° .

II. Les tableaux ci-dessous résument les résultats de nos mesures. Ils sont relatifs à des échantillons de colophane américaine empruntés à un bloc unique, de nuance moyenne, correspondant à la notation G de la classification américaine usuelle. La soude employée, comme aussi le mode opératoire adopté, ont été décrits dans notre première communication (14 mai 1908).

I. SOLUTION ALCALINE $\frac{N}{10} : \gamma = 0,407$

$z_0 = 3,27$

$\gamma_1 = 0,008$

POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation	NATURE du dépôt
$z = 0,42$	$T = 21,5 \pm 0,5$	Savon
0,86	$16,3 \pm 0,7$	D°
1,21	$13,4 \pm 0,4$	D°
1,87	$5,5 \pm 0,5$	D°
2,37	$0,0 \pm 1,0$	D°
2,89	$< 0^\circ$	(¹)
3,20	$< 0^\circ$	(¹)
4,48	Résidu de colophane persistant à toute température.	
4,70		

(¹) Dépôt de glace, rendant impossible la constatation du dépôt de savon et la mesure de sa température de saturation.

II. SOLUTION ALCALINE $\frac{2N}{10} : \gamma = 0,806$

$z_0 = 6,27$

$\gamma_1 = 0,013$

POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation	NATURE du dépôt
$z = 0,43$	$T = 61,5 \pm 0,5$	Savon
1,08	$55,0 \pm 0,5$	D°
1,34	$52,0 \pm 1,0$	D°
2,03	$45,5 \pm 0,6$	D°
2,46	$41,0 \pm 0,8$	D°
2,84	$37,7 \pm 0,7$	D°
3,72	$30,8 \pm 0,8$	D°
4,53	$23,0 \pm 1,0$	D°
5,63	$11,0 \pm 1,0$	D°
6,05	$6,0 \pm 1,0$	D°
6,21	$4,5 \pm 0,5$	D°
6,56	Résidu de colophane persistant à toute température.	

III. SOLUTION ALCALINE $\frac{3N}{10} : \gamma = 1,215$

$z_0 = 9,30$

$\gamma_1 = 0,013$

POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation	NATURE du dépôt
$z = 0,89$	$T = 78,2 \pm 0,7$	Savon
1,64	$70,3 \pm 0,3$	D°
2,60	$62,5 \pm 0,5$	D°
3,78	$54,7 \pm 0,6$	D°
4,47	$49,5 \pm 0,5$	D°
5,41	$43,4 \pm 0,6$	D°
7,15	$32,8 \pm 0,6$	D°
8,41	$22,4 \pm 0,4$	D°
8,74	$19,4 \pm 0,4$	D°
9,30	Résidu de colophane persistant à toute température.	

IV. SOLUTION ALCALINE $\frac{4N}{10} : \gamma = 1,614$

$z_0 = 11,85$

$\gamma_1 = 0,021$

POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation	NATURE du dépôt
$z = 3,57$	$T = 77,4 \pm 0,6$	Savon
5,60	$66,0 \pm 1,0$	D°
7,24	$57,7 \pm 0,9$	D°
7,74	$54,2 \pm 0,9$	D°
9,09	$46,1 \pm 0,9$	D°
9,27	$45,5 \pm 0,8$	D°
11,24	$32,2 \pm 1,2$	D°
11,68	$30,3 \pm 0,3$	D°
12,13	Résidu de colophane persistant à toute température.	

V. SOLUTION ALCALINE $\frac{5N}{10} : y = 2,010$		
$z_0 = 14,30$ $y_0 = 0,043$		
POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation	NATURE du dépôt
$z = 7,12$	$T = 72,7 \pm 0,7$	Savon
8,78	$64,9 \pm 0,8$	D°
10,44	$55,3 \pm 0,7$	D°
11,00	$52,6 \pm 1,0$	D°
11,20	$51,3 \pm 0,9$	D°
13,70	$37,5 \pm 0,5$	D°
14,31	Résidu de colophane persistant à toute température.	

VI. SOLUTION ALCALINE $\frac{6N}{10} : y = 2,380$		
$z_0 = 16,20$ $y_0 = 0,054$		
POIDS de colophane dans 100 grammes du mélange	TEMPÉRATURE de saturation	NATURE du dépôt
$z = 11,14$	$T = 67,2 \pm 0,8$	Savon
11,71	$64,6 \pm 0,6$	D°
12,97	$58,7 \pm 0,7$	D°
14,84	$49,1 \pm 0,6$	D°
15,36	$45,7 \pm 0,7$	D°
16,05	$44,0 \pm 0,2$	D°
16,22	Résidu de colophane persistant à toute température.	

III. Comme il est aisé de le voir en construisant, dans le plan TOZ, les courbes représentatives des nombres contenus dans ces tableaux, la saponification de la colophane américaine par les solutions étendues de soude caustique s'effectue sensiblement comme celle de la colophane des Landes. Nous constatons, en effet, dans un cas comme dans l'autre, l'insolubilité de la colophane dans les solutions de savon résineux neutre, qui se manifeste par la forme de la branche supérieure des courbes de solubilité (droites parallèles à OT), et par la quasi-identité de l'ordonnée z_1 de ces droites avec la valeur correspondante de z_0 ; dans l'espace défini par les trois axes rectangulaires OT, OY, OZ, la surface de solubilité de la colophane dans les solutions de soude caustique est donc constituée par un cylindre, dont les génératrices sont parallèles à OT, et dont la section par le plan YOZ est un arc de parabole, peu différent d'une droite, et défini par l'équation — presque identique à celle que nous a fournie la colophane landaise :

$$z_1 = 8,25y - 0,57y^2$$

comme le montre le tableau suivant :

y	z , TROUVÉ	z , CALCULÉ
0,407	3,27	3,27
0,806	6,27	6,28
1,215	9,30	9,19
1,614	11,85	11,84
2,010	14,30	14,28
2,380	16,20	16,40

Nous constatons également, dans le cas de la colophane américaine comme dans celui de la colophane landaise, que la solubilité du savon résineux est représentée par des courbes quasi rectilignes, descendant de gauche à droite dans la direction des températures croissantes, et correspondant, entre les limites ci-dessous indiquées, aux équations linéaires suivantes :

TABLÉAU	y	ÉQUATIONS	LIMITES DE TEMPÉRATURE	ÉCARTS LIMITES
I	0,407	$z = 2,37 - 0,0907T$	$T = 0^{\circ}$ à $T = 22^{\circ}$	$-0,05$ à $+0,03$
II	0,806	$z = 6,67 - 0,1014T$	4 à 62	$-0,19$ à $+0,06$
III	1,215	$z = 11,33 - 0,1335T$	19 à 78	$-0,20$ à $+0,38$
IV	1,614	$z = 16,90 - 0,1722T$	30 à 78	$-0,28$ à $+0,12$
V	2,010	$z = 20,79 - 0,1870T$	37 à 73	$-0,12$ à $+0,08$
VI	2,380	$z = 24,45 - 0,1963T$	44 à 67	$-0,24$ à $+0,12$

Le raccordement de ces quasi-droites inclinées avec les droites, parallèles à OT, qui figurent la solubilité de la colophane, paraît s'effectuer encore par de petites courbes arrondies, dont la position et l'importance dépendent du degré de carbonatation de la solution alcaline employée. Enfin, ces quasi-droites ne se prolongent pas, vers le bas, jusqu'à leur rencontre avec l'axe OT; elles donnent lieu à un maximum de température, très voisin de cet axe, et dont la position peut être déterminée approximativement pour les premières d'entre elles; elles longent ensuite l'axe OT dans la direction des tempéra-

tures décroissantes, et l'atteignent à la température correspondant au point de congélation de la solution alcaline employée. Voici les données qui caractérisent cette portion des courbes de solubilité, telles qu'elles résultent de l'examen du graphique ci-dessus et des données classiques de Raoult.

γ	TEMPÉRATURE DU MAXIMUM	POINT DE CONGÉLATION
0,407	De + 22° à + 27°	— 0,37
0,806	De + 62° à + 66°	— 0,73
1,215	De + 78° à + 87°	— 1,09
1,614	?	— 1,46
2,010	?	— 1,82
2,384	?	— 2,15

En résumé, pour la colophane américaine comme pour la colophane landaise, l'ensemble des courbes relatives à chaque valeur γ du titre de la solution alcaline affecte la forme d'un Z renversé (Σ), dont la branche inférieure serait presque confondue avec l'axe OT.

IV. De ces courbes de solubilité, il est aisé de déduire, par les procédés indiqués plus haut dans le cas de la colophane landaise, les isothermes de solubilité des mélanges d'eau, de soude caustique et de colophane américaine. Voici les données qui définissent les isothermes de 0°, 10°, 20°, 30°, 40° et 50° :

γ	ISOTHERME de la surface de solubilité de la colophane	ISOTHERMES DE LA SURFACE DE SOLUBILITÉ DU SAVON RÉSINEUX						
		0°	10°	20°	30°	40°	50°	Branche inférieure
0,407	$z_1 = 3,27$	2,37	1,42	0,58	»	»	»	$z_2 =$
0,806	6,27	»	5,73	4,80	3,81	2,59	1,57	Valeurs
1,215	9,30	»	»	8,76	7,48	6,00	4,40	très
1,614	11,85	»	»	»	11,75	10,00	8,43	voisines
2,010	14,30	»	»	»	»	13,22	11,40	de
2,380	16,20	»	»	»	»	»	14,58	zéro

La construction graphique des courbes définies par ces nombres fait ressortir une analogie complète de forme et de disposition avec les isothermes relatives aux solutions sodiques de colophane landaise.

Les migrations des parasites

(2^e CONFÉRENCE);

Par M. CH. PÉREZ.

Au nombre des publications reçues par la bibliothèque de la Société, se trouvent :

Les glaces et les brumes de l'Atlantique Nord, par M. HAUTREUX.

Pluviométrie en 1907 : Bordeaux, Arcachon, Biarritz. Températures extrêmes, par M. HAUTREUX.

Vins et Spiritueux, par M. BLAREZ.

Séance du 18 juin 1908.

PRÉSIDENTE DE M. BOULOUCH

M. Esclangon dépose, sur le bureau de la Société, un mémoire dont il demande l'impression et qui a pour titre :

Quelques problèmes sur le potentiel des masses attirantes.

MM. Cousin et Padé sont nommés rapporteurs chargés de l'examen de ce mémoire.

Sur une méthode d'approximation dans la résolution numérique des équations;

Par M. ERNEST ESCLANGON.

Les méthodes d'approximation habituellement employées pour déterminer avec précision une racine d'une équation, fournissent en général assez rapidement la racine cherchée avec l'approximation

1907-1908.

9

voulue; mais elles peuvent, dans certains cas, conduire à des calculs très longs et très fastidieux, si l'équation est tant soit peu compliquée.

Je me propose d'indiquer, dans cette note, une méthode permettant de réduire considérablement la longueur des calculs et d'obtenir à chaque opération, sans calcul particulier, une limite de l'approximation obtenue.

Pour faire saisir exactement l'avantage de cette méthode, il est utile de rappeler en quelques mots le principe des méthodes habituellement employées.

Les méthodes d'approximation, pour le calcul d'une racine, comprennent deux séries distinctes de calculs: en premier lieu, des opérations, en quelque sorte, préliminaires; en second lieu, les opérations d'approximation proprement dites.

Dans la méthode de Newton, on commence par déterminer un intervalle (a, b) contenant la racine de l'équation proposée

$$f(x) = 0$$

et tel que les dérivés $f'(x)$, $f''(x)$ n'aient aucune racine dans l'intervalle considéré. De plus il faut obtenir une limite supérieure de $|f''(x)|$ dans le même intervalle, cette limite devant servir à l'évaluation de l'erreur dans les approximations ultérieures.

Ce sont là *les opérations préliminaires* qui comportent ainsi la considération des *trois* fonctions, $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$. On peut remarquer qu'il n'est pas toujours très aisé de procéder à ces opérations préliminaires, qui peuvent conduire à des calculs d'une extrême complication si la fonction $f(x)$ renferme des termes de natures diverses, logarithmes exponentielles, arcs-tangentes, radicaux, intégrales définies, etc...

Ceci posé, l'un des nombres $f(a)$, $f(b)$ a le signe de $f''(x)$; supposons que ce soit $f(a)$. Alors le nombre

$$(1) \quad a' = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$$

est une nouvelle valeur approchée de la racine, plus approchée que a et dans le même sens que cette dernière. Enfin, appelant A une limite supérieure de $|f''(x)|$ dans (a, b) , on a comme limite de l'erreur

$$(2) \quad \epsilon = \frac{(b-a)^2 A}{2f'(a)}.$$

On substituera donc à l'intervalle initial (a, b) l'intervalle défini par a' [formule (1)] et $b' = a' + \epsilon$. On recommencera sur a' l'opération faite plus haut sur a , et ainsi de suite.

On voit donc, qu'en dehors des *opérations préliminaires*, chaque opération, représentée par les formules (1) et (2), comportera le calcul de *deux termes*, les termes $f(a)$, $f'(a)$, auquel il faudra joindre le calcul de la *limite de l'erreur* [formule (2)]. Si $f(x)$ est de nature compliquée, le calcul de chacun des termes, tels que $f(a)$, $f'(a)$ pourra être très long; aussi il n'est pas inutile de chercher à supprimer le calcul de l'un d'eux.

La méthode des *parties proportionnelles* peut offrir des difficultés analogues.

Les *opérations préliminaires* seront les mêmes que précédemment. Il faudra déterminer un intervalle initial (a, b) comprenant la racine de $f(x)$ et tel que $f'(x)$ et $f''(x)$ n'aient aucune racine dans le même intervalle. De plus, il faudra obtenir une limite supérieure A de $|f''(x)|$ et une limite inférieure m de $|f'(x)|$.

Partant de l'intervalle (a, b) on obtiendra une valeur plus approchée b' par la formule

$$(3) \quad b' = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}.$$

Cette valeur est approchée dans le même sens que celui des nombres a ou b qui donne pour $f(a)$ ou $f(b)$ un signe contraire à celui de la dérivée seconde. Une limite de l'erreur est donnée par

$$(4) \quad \epsilon = \frac{(b-a)^2}{2} \cdot \frac{A}{m}.$$

Dans cette méthode, une fois effectuées les opérations préliminaires, la dérivée $f''(x)$ n'intervient plus, mais à chaque opération il faudra calculer encore *deux termes*, les termes $f(a)$ et $f(b)$ comme le montre la formule (3).

On combine souvent les deux méthodes, car si l'une s'applique pour l'extrémité a de l'intervalle, l'autre s'applique pour l'extrémité b , la combinaison fournissant immédiatement un nouvel intervalle $(a' b')$; mais, dans tous les cas, il faudra toujours calculer *deux termes*, c'est-à-dire faire *deux substitutions* à chaque opération.

Je me propose d'indiquer maintenant une méthode permettant, d'une part, de simplifier les *opérations préliminaires*; d'autre part, de se borner au calcul d'un *seul terme* dans chacune des opérations successives.

Pour cela je rappellerai la proposition suivante. Soit une équation mise sous la forme

$$(5) \quad x = \varphi(x).$$

si la dérivée satisfait, quel que soit x , à la condition

$$|\varphi'(x)| < 1,$$

les nombres $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, obtenus en faisant successivement

$$\begin{aligned} x_1 &= \varphi(x_0), \\ x_2 &= \varphi(x_1), \\ x_3 &= \varphi(x_2), \\ &\dots\dots\dots \\ x_n &= \varphi(x_{n-1}) \end{aligned}$$

tendent vers une valeur x qui satisfait à la relation (5), c'est-à-dire est une racine de cette équation. La propriété est bien facile à établir. En effet, il suffit de montrer que la série dont le terme général est

$$u_n = x_n - x_{n-1}$$

est convergente. Or

$$(6) \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{x_{n+1} - x_n}{x_n - x_{n-1}} = \frac{\varphi(x_n) - \varphi(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} = \frac{(x_n - x_{n-1})}{(x_n - x_{n-1})} \varphi'(\xi_n) = \varphi'(\xi_n),$$

ξ_n étant un nombre compris entre x_n et x_{n-1} . Avec l'hypothèse faite, on voit que le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ restant inférieur à l'unité, la série considérée est convergente; par suite x_n a une limite x qui satisfait nécessairement à l'équation (5).

La résolution d'une telle équation peut donc être particulièrement simple, et l'on se trouve directement dans ce cas avec l'équation de *Képler*.

$$u = e \sin u + nt$$

(où u est l'inconnue). Cette équation joue, comme on le sait, un rôle

considérable en Astronomie, et on applique habituellement, pour la résoudre, cette dernière méthode.

Supposons maintenant que dans l'équation (5) la dérivée $\varphi'(x)$ soit négative, de sorte que l'on ait

$$-1 < \varphi'(x) < 0.$$

Dans ce cas les nombres, $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$, s'approchent de la racine, alternativement par défaut et par excès puisque la série

$$u_n = x_n - x_{n-1}$$

est alternée, ainsi qu'il résulte de la relation (6).

D'ailleurs, dans tous les cas, au bout de n opérations, l'erreur commise est de l'ordre de $(x - x_0) [\varphi'(x)]^n$ et on approche d'autant plus vite de la racine que la dérivée $\varphi'(x)$ est plus petite en valeur absolue.

Or nous allons montrer qu'une équation quelconque

$$f(x) = 0$$

peut toujours se ramener à la forme

$$x = \varphi(x)$$

avec les inégalités

$$-1 < \varphi'(x) < 0.$$

Supposons en effet qu'on ait déterminé un intervalle initial (a, b) comprenant la racine à calculer de l'équation $f(x) = 0$ et ne comprenant aucune racine de $f'(x) = 0$.

Supposons $f'(x)$ positive dans (a, b) (on changerait le signe de $f(x)$ dans le cas contraire); désignons par M le maximum absolu de la dérivée $f'(x)$, m son minimum absolu dans l'intervalle (a, b) . Nous supposerons l'intervalle (a, b) tel que l'on ait l'inégalité

$$M < 2m.$$

Il est à remarquer que l'on arrivera généralement assez vite à comprendre la racine cherchée entre deux nombres (a, b) entre lesquels la variation de $f'(x)$ sera faible, de sorte que les nombres M et m étant déjà très voisins, l'inégalité précédente sera largement satisfaite.

Ce seront là les *opérations et vérifications préliminaires* qui ne comprennent plus, comme dans les méthodes précédentes, la considération de la dérivée seconde.

Ceci posé, l'équation proposée est équivalente à la suivante

$$(7) \quad x = x + \alpha f'(x) = \varphi(x)$$

où α est une constante arbitraire (1). Nous allons déterminer la constante α de façon que dans l'intervalle (a, b) on ait

$$-1 < \varphi'(x) < 0.$$

Cette condition peut s'écrire ici, puisque $f'(x) > 0$

$$(8) \quad -\frac{2}{f'(x)} < \alpha < -\frac{1}{f'(x)}$$

Or, dans l'intervalle (a, b) , $-\frac{2}{f'(x)}$ varie entre $-\frac{2}{m}$ et $-\frac{2}{M}$ et $-\frac{1}{f'(x)}$ varie entre $-\frac{1}{m}$ et $-\frac{1}{M}$. Pour qu'on puisse déterminer α satisfaisant à (8) il suffit donc que l'on ait

$$-\frac{2}{M} < -\frac{1}{m}$$

c'est-à-dire

$$M < 2m,$$

condition qu'on a supposée satisfaite.

La constante α étant ainsi choisie, nous allons appliquer la méthode en prenant comme valeur initiale approchée pour la racine l'un des nombres a ou b . De ces deux nombres a ou b , il y en a certainement un d'acceptable comme valeur initiale. Considérons en effet les valeurs

$$a_1 = \varphi(a) \quad b_1 = \varphi(b)$$

et soit x la racine. On a

$$x - a_1 = \varphi(x) - \varphi(a) = (x - a)\varphi'(\xi)$$

(1) α pourrait être même une fonction quelconque de x , n'ayant aucune racine dans l'intervalle (a, b) , mais cette généralité n'offrirait aucun avantage au point de vue pratique.

ξ étant compris entre a et x , par suite entre a et b . L'intervalle (a, x) est donc plus grand que l'intervalle (x, a_1) . Si le nombre a_1 est compris entre a et b , le nombre a conviendra comme valeur initiale, et l'on continuera comme il a été indiqué. On a de même

$$b_1 - x = \varphi(b) - \varphi(x) = (b - x)\varphi'(\eta)$$

η étant compris entre x et b . Des deux nombres a_1 et b_1 il y en a nécessairement au moins un compris entre a et b . En effet, si l'on suppose l'intervalle (a, x) plus petit que l'intervalle (x, b) , le nombre a_1 sera compris entre x et b . Si au contraire c'est l'intervalle (x, b) qui est inférieur à l'intervalle (a, x) , ce sera la valeur b_1 qui tombera entre a et x .

En supposant que c'est le nombre a , par exemple, qui convient comme valeur initiale, on formera donc successivement les nombres

$$\begin{aligned} a_1 &= \varphi(a) = a + \alpha f(a) \\ a_2 &= \varphi(a_1) = a_1 + \alpha f(a_1) \\ &\dots\dots\dots \\ a_n &= \varphi(a_{n-1}) = a_{n-1} + \alpha f(a_{n-1}) \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

qui convergent vers la racine cherchée, *alternativement par excès et par défaut*.

On aura ici *un seul terme* à calculer à chaque opération, et la limite de l'erreur commise sera fournie, en quelque sorte automatiquement par la suite même des opérations, sans aucun calcul auxiliaire. De plus, la dérivée $f'(x)$, n'intervient pas dans les opérations d'approximation proprement dites. Enfin *la dérivée seconde n'intervient en aucune façon*, ni dans les opérations préliminaires, ni dans les calculs successifs d'approximation. Elle pourrait même s'annuler dans l'intervalle initial, sans que cette circonstance fût de nature à modifier la suite des calculs. Bien au contraire, ce serait plutôt une circonstance favorable, assurant à la dérivée première une variation plus faible, et permettant de donner à la constante α une valeur qui entraînerait une plus grande rapidité dans l'approximation. Or, dans la méthode des parties proportionnelles, ainsi que dans la méthode de Newton, la considération de la dérivée seconde est essentielle, et il faut avant tout s'assurer qu'elle ne s'annule pas dans l'intervalle (a, b) .

Il y a intérêt à choisir la constante α de façon que $\varphi'(x)$ soit, en

valeur absolue, la plus petite possible; pour cela on devra prendre α voisin de $-\frac{1}{m}$, égal à $-\frac{1}{m}$ si l'on connaissant par quelque calcul auxiliaire le nombre m [minimum absolu de $f'(x)$].

On pourra du reste changer la valeur de la constante α , au cours des opérations, s'il y a quelque intérêt à le faire, et si l'on a, d'autre part, des indications sur la variation de $f'(x)$ dans les intervalles tels que (a_{n-1}, a_n) . On peut, à partir de l'opération de rang n , remplacer α par un nombre voisin de $-\frac{1}{m_n}$, m_n désignant le minimum de $f'(x)$ dans l'intervalle (a_{n-1}, a_n) .

Quant à l'approximation obtenue dans chacune des opérations successives elle n'est pas inférieure à celle fournie par l'application, soit de la méthode de Newton, soit de la méthode des parties proportionnelles. Elle est très sensiblement du même ordre. Soit en effet (a, b) l'intervalle initial. La méthode étant supposée s'appliquer à partir de la valeur a , on aura

$$a_1 = a + \alpha f(a)$$

et x désignant la racine, on aura aussi

$$x = x + \alpha f(x);$$

par suite

$$\begin{aligned} x - a_1 &= (x - a) + \alpha [f(x) - f(a)] \\ &= (x - a) [1 + \alpha f'(\xi)], \end{aligned}$$

ξ désignant un nombre compris entre a et x , par suite entre a et b .

Si la constante α est bien choisie, c'est-à-dire voisine de $-\frac{1}{m}$ (m désignant le minimum absolu de $f'(x)$ dans l'intervalle (a, b)), on aura sensiblement

$$(9) \quad x - a_1 = (x - a) \left[1 - \frac{f'(\xi)}{m} \right].$$

D'autre part, si l'on désigne par η une valeur de l'intervalle (a, b) pour laquelle

$$f'(\eta) = m$$

on pourra écrire

$$f'(\xi) = f'(\eta) + (\xi - \eta) f''(\zeta),$$

ζ désignant une valeur comprise entre ξ et η , par suite entre a et b . En portant dans la formule (9) il vient finalement

$$x - a_1 = - (x - a) (\xi - \eta) \cdot \frac{f''(\zeta)}{f'(\eta)}$$

et par suite, puisque les nombres x, ξ, η , sont tous compris entre a et b ,

$$|x - a_1| < (b - a)^2 \cdot \left| \frac{f'(\xi)}{f''(\eta)} \right|;$$

ou enfin en désignant par A une limite supérieure de $|f''(x)|$ dans l'intervalle (a, b)

$$(10) \quad |x - a_1| < (b - a)^2 \cdot \frac{A}{m};$$

formule analogue à celle qui donne la limite de l'erreur dans la méthode de Newton et celle des parties proportionnelles.

Si la dérivée seconde $f''(x)$ s'annule dans l'intervalle (a, b) , ni la méthode de Newton, ni celle des parties proportionnelles ne s'appliquent. Ici, non seulement la méthode s'applique, mais l'approximation est de plus considérablement augmentée par ce fait que A est très voisin de 0.

On peut remarquer enfin que la méthode de Newton se ramènerait à celle qu'on vient d'indiquer en supposant α constamment variable et

$$\text{égal à } -\frac{1}{f'(a)}$$

En résumé, cette méthode appliquée aux cas où l'équation $f(x) = 0$ affecte une forme compliquée, où les dérivées $f'(x)$, $f''(x)$ sont elles-mêmes compliquées, permet de réduire considérablement, de moitié au moins, le temps nécessaire au calcul d'une racine, puisqu'à chaque opération on n'a plus qu'un terme à calculer au lieu de deux. De plus, si la constante α est bien choisie, l'approximation obtenue à chaque opération peut être plus grande que celle résultant soit de l'application de la méthode de Newton, soit de celle des parties proportionnelles.

Sur la formation des arséniures NiAs et Ni^2As^3 ;

Par M. E. VIGOUROUX.

Une réaction du trichlorure d'arsenic sur le nickel a été étudiée par Granger et Didier (1). D'après ces auteurs, le chlorure, entraîné par un courant d'anhydride carbonique, agit sur le nickel vers 600° ; leur expérience, prolongée en évitant une température susceptible de ramollir le verre, fournit l'arséniure Ni^2As^3 . Ce corps, obtenu à l'aide

(1) *B. Soc. Ch.*, t. XXIII, p. 506, 1900.

de nickel provenant de la réduction de son oxalate, rappelle, par son éclat et sa couleur, le même arsénium impur Ni^3As^3 , trouvé par Wöhler dans les fours à verre bleu des fabriques de smalt. Il possède l'éclat métallique et se présente sous forme de grains rougeâtres, avec des facettes et des pointements cristallins; il est décomposable par la chaleur et attaqué par les alcalis fondus.

L'action du chlorure d'arsenic sur le nickel chimiquement pur, résultant de la réduction de son oxyde par l'hydrogène, nous a permis de former deux arséniums :

1. NiAs obtenu vers 600° , cristallin, non fondu, de couleur rouge cuivre comme l'arsénium naturel, appelé pour cette raison Kupfer-nickel, décomposable par la chaleur.

2. Ni^3As^3 , formé au-dessus de 800° , fondu, à section cristalline, blanc d'argent, indécomposable dans les foyers ordinaires.

Ayant précédemment déterminé, d'une façon approchée, les limites de température favorables à l'obtention de divers arséniums de nickel, nous avons cherché à produire ces corps par l'action du trichlorure d'arsenic sur le même métal pulvérulent, en nous maintenant, autant que possible, dans les intervalles de température antérieurement trouvés.

Les effets de ce chlorure sur les arséniums ont également été étudiés.

I. Action du trichlorure d'arsenic sur le nickel.

1. *Expériences effectuées au-dessous de 400° .* — Du nickel, parfaitement réduit, pulvérulent, était disposé dans une nacelle en porcelaine, à l'intérieur d'un tube de verre horizontal, parcouru par de l'anhydride carbonique et chauffé autour de 350° . Cette température une fois atteinte, ce gaz était remplacé par la vapeur de trichlorure d'arsenic pendant une heure environ et, après ce passage, la masse formée était de nouveau maintenue dans l'anhydride carbonique pendant son refroidissement. Deux expériences successives permettent d'obtenir une matière encore complètement magnétique, ne cédant à l'eau que des traces de chlorure de nickel et dans laquelle l'analyse ne décèle que fort peu d'arsenic.

2. *De 400 à 600° .* — L'expérience effectuée avec ce même métal pulvérulent, et conduite comme la précédente, fait apparaître, avec du

chlorure de nickel en abondance, une masse résiduelle qui, après lavages, manifeste l'aspect brun clair, avec apparence cristalline. L'analyse décèle :

Nickel.	44,78	44,93 p. 100
Arsenic	55,63	56,04 —
	<u>100,41</u>	<u>100,97</u>

Chiffres qui correspondent à NiAs.

Le trichlorure d'arsenic ne paraît donc pas susceptible de porter, dans ces conditions, l'arséniuration jusqu'au composé Ni³As³ (soit à 65,71 p. 100 d'arsenic), teneur atteinte dans ces limites de température, avec les mélanges nickel-arsenic ou sous l'influence de la vapeur d'arsenic sur le nickel.

3. *De 600 à 800°.* — Le corps, élaboré de la même façon avec du nickel pur, puis lavé et séché, présente, après un nouveau passage du chlorure d'arsenic, la teinte brune précédente qu'il conserve encore après une action subséquente.

On y trouve en effet :

	APRÈS la 2 ^e action	APRÈS la 3 ^e action
Nickel	45,28	44,38 p. 100
Arsenic.	54,93	55,66 —
	<u>100,21</u>	<u>99,94</u>

Soit NiAs. Composé obtenu par action directe de l'arsenic, dans ces limites de température.

4. *Au-dessus de 800°.* — a. La température a été maintenue vers 900° environ, au four Mermet, dans deux opérations successives. La première entraîne la formation d'une masse frittée cristalline, qui abandonne au lavage beaucoup de chlorure de nickel; la seconde, de grains fondus, accusant respectivement :

	I	II
Nickel	54,03	54,08 p. 100
Arsenic	46,47	46,86 —
	<u>100,50</u>	<u>100,94</u>

Soit Ni^3As^3 , composé réalisé, au-dessus de 800° , dans le travail antérieurement publié.

b. Les essais repris, en expérimentant à température encore plus élevée (1400° environ), permettent de former, dès la première attaque, avec du chlorure de nickel déposé hors de la nacelle, un bouton métallique complètement fondu. Ce dernier, après pulvérisation et reprise par le chlorure d'arsenic vers 1450° , laisse également un culot présentant encore la composition de Ni^3As^3 , soit :

	I	II
	—	—
Nickel.	53,92	54,12 p. 100
Arsenic	46,19	45,80 —
	<u>100,11</u>	<u>99,92</u>

II. Action du trichlorure d'arsenic sur les arséniures.

1. *Expériences effectuées de 400 à 600° .* — Le corps NiAs , formé par synthèse, a été soumis à deux reprises différentes à l'action du trichlorure d'arsenic; la température étant maintenue autour de 400° autant que possible, mais sans jamais dépasser 600° . La substance conserve sa nuance brun clair et renferme toujours :

	I	II
	—	—
Nickel	44,03	44,05 p. 100
Arsenic.	55,93	56,17 —
	<u>99,96</u>	<u>100,22</u>

Sa composition n'a donc pas varié.

2. *De 600 à 800° .* — a. Les corps renfermant des proportions d'arsenic correspondant à NiAs^2 et Ni^3As^3 , chauffés vers 800° dans la vapeur de trichlorure d'arsenic, tendent vers NiAs ; leur transformation se fait donc comme sous l'influence de la chaleur seule.

b. Le composé Ni^3As^3 , obtenu au moyen du chlorure d'arsenic finement porphyrisé, a été soumis à l'action de ce même chlorure vers 700° (à la fin de l'opération 600°). Il apparaît du chlorure de nickel, un dépôt d'arsenic, et la masse obtenue, lavée, présente l'aspect rouge cuivre.

Il a été réalisé une deuxième opération sur le produit obtenu, pendant laquelle l'apparition de chlorure de nickel est faible.

La couleur du corps formé est celle que présente le composé NiAs.

Un troisième passage à l'aide du chlorure, effectué sur ce dernier lavé et porphyrisé, fournit un produit de même couleur rouge cuivre décelant à l'analyse :

	I	II
Nickel	43,12	43,84 p. 100
Arsenic	<u>56,16</u>	<u>56,06</u> —
	99,28	99,90

Soit NiAs.

Le corps Ni³As³ absorbe donc de l'arsenic vers 600°; cependant il se dépose de l'arsenic dans le tube.

3. *Au-dessus de 800°.* — *a.* L'arséniure Ni³As³ porphyrisé a été soumis, pendant une heure, à l'action du chlorure d'arsenic, ce qui entraîne une faible formation de chlorure de nickel. Le culot fondu, fragmenté, puis soumis de nouveau à une action semblable, engendre une substance titrant :

	I	II
Nickel	53,94	53,75 p. 100
Arsenic	<u>45,14</u>	<u>45,80</u> —
	99,08	99,55

Soit Ni³As³.

b. Au cours d'opérations effectuées de 900 à 1,000°, au four Mermet, en isolant la substance réagissante dans l'anhydride carbonique, au début et à la fin, Ni³As, finement porphyrisé, engendre, sous l'influence du chlorure d'arsenic, un culot très fragile qui, remis en expérience après pulvérisation, donne naissance à un bouton mordoré. Dans le tube, on rencontre toujours du chlorure de nickel et un peu d'arsenic.

L'analyse du composé obtenu fournit :

	I	II
Nickel	54,92	54,38 p. 100
Arsenic	<u>45,58</u>	<u>46,44</u> —
	100,50	100,82

Soit Ni³As.

CONCLUSIONS. — 1. Le chlorure d'arsenic agissant sur le nickel, dans nos expériences, nous a permis de préparer deux arséniures NiAs ($\text{Ni} : 43,90$; $\text{As} : 56,10$) et Ni^2As^3 ($\text{Ni} : 54,00$; $\text{As} : 46,00$), le premier se formant dans les essais effectués au-dessous de 800° , le second, toutes les fois que cette température est dépassée. Au-dessous de 400° , l'action du même chlorure sur le nickel paraît presque nulle.

2. Divers arséniures, soumis à l'action de la vapeur du trichlorure d'arsenic, amènent à l'obtention de ces deux mêmes composés, tout arséniure étant susceptible d'être transformé par le chlorure d'arsenic en NiAs de 400 à 800° , en Ni^2As^3 au-dessus de 800° .

Comparaison de quelques résultats relatifs aux alliages de cuivre et de manganèse;

Par M. ARRIVAUT.

A cause de leur malléabilité qui les rend susceptibles d'applications industrielles, les alliages de manganèse et de cuivre ont été beaucoup étudiés. Je ne rappellerai pas la bibliographie complète que j'ai déjà donnée⁽¹⁾, et si je reviens aujourd'hui sur la question, c'est à la suite de résultats divers et quelquefois contradictoires qui ont été publiés depuis.

Le premier travail réellement scientifique date de 1902 et est dû à l'ingénieur Lewis, de Birmingham⁽²⁾. Dans ce travail, M. Lewis donne les densités et les points de fusion de la série complète des alliages de cuivre et de manganèse, ainsi que les micrographies correspondantes, et à aucun moment on n'aperçoit un phénomène indiquant l'existence d'une combinaison. Je suis moi-même arrivé à un résultat semblable, en 1905, par l'emploi de la méthode chimique, et je me ~~fondais~~ ^{fondais} pour cela sur ce fait que les alliages purs que j'avais préparés, épuisés par

(¹) G. ARRIVAUT, *Constitution des alliages de cuivre et de manganèse (Procès-verbaux des séances de la Soc. des Sc. phys. et nat. de Bordeaux, séance du 20 juillet 1905)*.

(²) E. LEWIS, *The alloys of Copper and Manganese (Journal of the Society of chemical industry, XXI, 1902, p. 842)*.

les acides faibles, abandonnaient un résidu de cuivre, tout le manganèse étant passé en dissolution. En tout cas, disais-je, « s'il existe une combinaison, elle est décomposable par les acides en donnant le sel de manganèse correspondant et du cuivre métallique. »

Deux ans plus tard, M. Wologdine⁽¹⁾ crut pouvoir annoncer des résultats différents; après avoir étudié la fusibilité des cupromanganèses et tracé le diagramme, il constata dans la courbe un maximum correspondant à Mn^4Cu ; l'examen micrographique vint confirmer l'existence de cette combinaison. M. Wologdine énonçait encore un fait que je n'avais jamais constaté, c'est que les alliages contenant de 78 à 100 % de manganèse se réduisent en poussière à l'air.

Tout récemment, des travaux effectués par la méthode de Tammann sont venus appuyer nos premières conclusions :

M. Sahmen⁽²⁾, ayant déterminé le solidus et le liquidus d'une série d'alliages fondus, comme les nôtres, dans l'hydrogène, conclut à l'existence d'une série continue de cristaux mixtes, sans combinaison; ses résultats sont contrôlés par la métallographie.

De même, MM. Zemczuzny, Urasow et Pykowsow⁽³⁾ ont trouvé des résultats analogues en opérant dans un four à cryptol et en protégeant les alliages contre l'oxydation par du chlorure de baryum fondu. Les courbes de refroidissement étaient tracées au moyen du pyromètre enregistreur de Kurnakow. Le liquidus obtenu présente un accord satisfaisant avec celui de Sahmen; mais la forme des deux solidus diffère. Quoiqu'il en soit, les conclusions sont les mêmes, c'est-à-dire absence de combinaison et formation d'une série continue de cristaux mixtes.

Ces faits sont encore vérifiés par l'examen de la courbe de conductibilité électrique tracée par Feusser et Lindeck⁽⁴⁾, qui affecte une forme continue avec un maximum aplati pour environ 33 p. 100 atom de Mn.

Les résultats différents obtenus par Wologdine, et notamment l'existence du maximum correspondant à Mn^4Cu , seraient dus, d'après M. Portevin⁽⁵⁾, à l'emploi d'une couche de charbon de bois servant à préserver les alliages en fusion de l'oxydation, ce qui aurait produit une carburation du manganèse.

(1) WOLOGDINE, *Alliages de cuivre et de manganèse* (Revue de métallurgie, janvier 1907).

(2) SARHEN, *Zeit. an. Chemie*, LVII, 20-26 (1908).

(3) *Zeit. an. Chemie*, LVII, p. 253-261 (1908).

(4) *Abhandl. d. phys. tech. Reichsanstalt*, II, p. 501 (1895).

(5) *R. de metall.*, V, p. 373 (1908).

On voit combien sont délicates ces recherches et la nécessité d'employer des méthodes diverses, susceptibles de se contrôler les unes les autres et aussi avec quelle circonspection il faut admettre les résultats obtenus.

Sur un « oïdium » attaquant les feuilles de chêne;

Par M. GARD.

Voir Société de Biologie, juillet 1908.

Séance du 2 juillet 1908.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUCH

Conformément aux conclusions du rapport de MM. Cousin et Padé et la Commission des finances et d'impression entendue, la Société décide l'impression dans ses Mémoires du travail de M. Esclangon, qui a pour titre :

Quelques problèmes sur le potentiel des masses attirantes.

Sur les arséniures de chrome;

Par MM. VIGOUROUX et SANFOURCHE.

Les combinaisons que l'arsenic forme avec le chrome n'avaient jamais été étudiées jusqu'ici, à cause de la difficulté d'obtenir ce métal dans un état de pureté suffisante. La préparation par la voie de l'aluminothermie faite par l'un de nous ⁽¹⁾ du chrome exempt de carbone, de fer et de silicium, nous a permis de réaliser une première étude des arséniures de chrome.

⁽¹⁾ E. VIGOUROUX, *Sur la réduction des oxydes par l'aluminium. Réduction des oxydes de chrome* (Société des Sciences physiques, Bordeaux, 24 janvier 1907).

L'arsenic employé a été purifié par plusieurs distillations dans un courant d'hydrogène; le chrome avait été obtenu en réduisant par l'aluminium pur, dans un creuset de magnésie, le sesquioxyde mêlé d'anhydride chromique. L'addition de ce dernier corps avait pour but, grâce à la chaleur fournie par sa réduction, d'élever suffisamment la température pour amener la fusion et le rassemblement du métal mis en liberté.

Les arséniures que nous avons réussi à former jusqu'ici soit par union directe, soit par l'action du chlorure d'arsenic sur le chrome, sont les suivants :



Vu la dureté du chrome, qui rend impossible sa pulvérisation à un degré suffisant, les composés obtenus par union directe ne présentent une netteté satisfaisante que dans les opérations faites à haute température permettant la fusion de la combinaison formée; si cette condition n'est pas réalisée, l'action n'est jamais que superficielle, et ne donne que des produits manquant d'homogénéité.

ARSÉNIURE DE CHROME CrAs.

Composition :

$$\begin{array}{rcl} \text{Cr} & = & 40,99 \\ \text{As} & = & 59,01 \\ \hline & & 100,00 \end{array}$$

PRÉPARATION. — Ce composé s'obtient en saturant le chrome par la vapeur d'arsenic à 1200° environ, dans un courant d'hydrogène. Plusieurs opérations sont nécessaires avant d'arriver à un produit offrant la composition théorique; après la première, le chrome, légèrement fritté, n'a absorbé que peu d'arsenic; après la deuxième, la masse a fondu en un lingot boursoufflé, très cassant, cristallin, et dont la teneur en arsenic a atteint 53 p. 100. Une troisième action de la vapeur d'arsenic fournit un culot semblable au précédent, mais encore plus cassant, dont la composition est :

	I	II	III
Cr =	42,63	42,25	40,64 p. 100
As =	59,12	58,70	» —
	<u>101,75</u>	<u>100,95</u>	

PROPRIÉTÉS. — Ce corps se présente en lingots gris, très cassants, se divisant sous l'action du choc en une poussière cristalline. Densité théorique — 6,08. Densité trouvée à 0° — 6,85.

Chauffé légèrement dans un courant de chlore, il est attaqué avec incandescence.

Il brûle avec éclat dans l'oxygène au rouge sombre, mais le grillage à l'air ne l'oxyde que légèrement.

Le soufre l'attaque avant son point d'ébullition.

Les acides chlorhydrique et azotique ont une action nulle à froid, très légère à chaud.

L'eau régale le détruit rapidement à chaud, du chrome et de l'arsenic passant dans la solution.

L'acide sulfurique, sans action à l'état étendu et froid, l'attaque vivement en dégageant du gaz sulfureux quand il est concentré et bouillant.

Les alcalis en solution n'ont pas d'effet; fondus, leur action est rapide et complète.

Les carbonates alcalins produisent une action légère.

Le chlorate de potassium agit avec un vif éclat; l'azotate de potassium forme, sans incandescence, du chromate et de l'arséniate de potassium.

ARSÉNIURE DE CHROME. — Cr^3As^3 .

Composition :

Cr =	51,03
As =	<u>48,97</u>
	100,00

PRÉPARATION. — Il s'obtient :

1° *En chauffant autour de 1450° l'arséniure CrAs qui s'est formé vers 1200°.* Ce dernier, réduit en poudre, a été soumis à l'action du four Schlœsing, dans un tube en porcelaine traversé par un courant d'hydrogène.

Il en résulte perte d'arsenic et fusion, et l'on retire de la nacelle qui le contient un lingot très cassant, de composition :

Cr =	49,75
As =	<u>49,27</u>
	99,02

2° *Par l'action de AsCl_3 sur le chrome métallique.* 10 grammes de chrome contenus dans une nacelle sont chauffés sur la grille à gaz à 700° environ, dans un tube parcouru par du chlorure d'arsenic en vapeur. Un dépôt d'arsenic se manifeste sur les parois du tube. Il y a incandescence, et il se forme une masse noire, compacte, qui, une fois extraite du tube, absorbe l'humidité de l'air. Elle est broyée et traitée par l'eau, qui dissout le chlorure de chrome formé.

La surface des grains de chrome a seule été attaquée; en les broyant sous l'eau, on sépare le produit de la réaction sous forme d'une poudre noire très fine qui reste en suspension dans l'eau. Les grains de chrome non attaqués sont soumis de nouveau à l'action de AsCl_3 ; tout se passe comme dans la première expérience, et l'attaque est seulement superficielle.

L'analyse des produits obtenus a donné :

	1 ^{re} action	2 ^e action
Cr =	52,30	51,68
As =	»	»

ce qui correspond à la formule Cr^3As^3 .

Nous avons fait agir de nouveau le chlorure d'arsenic, mais à 450° au lieu de 700°. Les choses se passent d'une façon identique toujours avec dépôt d'arsenic; toutefois l'attaque est encore plus faible, et l'on ne recueille que quelques centigrammes de matière.

PROPRIÉTÉS. — Obtenu à haute température, le composé Cr^3As^3 se présente en lingots gris noirâtres, très cassants, donnant une poudre cristalline gris foncé.

Par l'action du chlorure d'arsenic, il constitue une poudre très fine paraissant à l'œil nu amorphe et noire, mais au microscope, elle est gris foncé et cristalline.

Densité théorique : 6,18. — Trouvée à 0° : 6,92.

Le chlore, l'oxygène, le soufre, les alcalis, les carbonates alcalins, le chlorate et l'azotate de potassium ont la même action que sur CrAs . L'acide chlorhydrique donne à chaud un dégagement d'hydrogène arsénié; l'attaque, d'abord suffisamment vive, diminue d'énergie jusqu'à devenir assez faible, bien que le résidu présente toujours la même composition.

L'acide azotique, sans action à froid, l'attaque légèrement à chaud.

L'acide sulfurique concentré et bouillant le détruit en dégageant du gaz sulfureux.

L'eau régale chaude l'attaque vivement au début, plus lentement ensuite; une action prolongée est nécessaire pour arriver à une dissolution complète.

ARSÉNIURE DE CHROME — Cr^5As^2

Composition :

Cr =	63,46
As =	36,54
	<hr/> 100,00

PRÉPARATION. — Cet arsénium a été extrait de culots contenant une quantité de chrome supérieure à 63 p. 100. Ces derniers, étant riches en chrome, sont d'une fusion difficile, même à l'aide du four Schloësing, où nous avons opéré; de plus, il est difficile de fixer à l'avance leur composition, une partie de l'arsenic distillant avant que la masse atteigne une température suffisante pour amener la combinaison.

Essai I. — Le mélange est effectué à 80 p. 100 de chrome et 20 p. 100 d'arsenic; il est introduit dans une nacelle en magnésie placée dans un tube de porcelaine, et chauffé vers 1450° dans un courant d'hydrogène. La masse subit un commencement de fusion et s'agglomère sans toutefois atteindre l'état liquide; une partie de l'arsenic a distillé.

Le culot offre la composition suivante :

Cr =	93,60	94,00
As =	»	»

Un fragment de ce culot pulvérisé est traité par l'acide chlorhydrique à 10 p. 100. A chaud, il y a une action très vive, qui cesse brusquement aussitôt que le chrome en excès est dissous, la liqueur ne contient pas trace d'arsenic; le résidu cristallin, broyé de nouveau, est repris par le même réactif chlorhydrique à 5 p. 100 à l'ébullition pendant deux heures sans qu'il y ait de nouvelle attaque.

Nous avons obtenu ainsi une petite quantité d'une poudre cristalline présentant la composition suivante :

Cr =	63,24	63,00
As =	»	»

Essai II. — Nous avons introduit dans le mélange une quantité d'arsenic plus grande que ne l'exige la formule, pour parer aux pertes par distillation. Après une demi-heure de chauffe à 1450° , nous avons obtenu un lingot bien fondu, assez fragile, à cassure cristalline, titrant :

Cr =	72,32	73,70
As =	»	»

Il a été attaqué dans les mêmes conditions que le précédent et a fourni un résidu absolument semblable, mais plus abondant, dont l'analyse a donné :

Cr =	63,45	64,32
As =	36,10	35,50
	<hr/>	<hr/>
	99,55	99,82

Comme le précédent, ce corps correspond à la formule Cr^4As^2 .

Essai III. — Nous avons tenté de reproduire directement le composé Cr^4As^2 en mettant en présence la quantité d'arsenic et de chrome strictement nécessaire à leur formation ; mais comme, dans ces conditions, le mélange des deux corps n'aurait pu, à cause de la volatilisation préalable de l'arsenic, donner un lingot présentant cette composition, nous avons employé du chrome déjà saturé d'arsenic vers 1000° et qui en contenait 53 p. 100. A ce produit, nous avons ajouté assez de métal pur pour arriver à la formule Cr^4As^2 , et nous avons chauffé le mélange à 1450° . Il part une faible quantité d'arsenic, et on obtient un lingot fondu, très boursoufflé, extrêmement cassant. Son analyse donne :

Cr =	62,72	»
As =	36,64	36,42
	<hr/>	
	99,36	

On voit que la proportion d'arsenic est suffisante pour que le culot réponde à la formule, malgré le départ d'un peu de ce corps. Cela tient à ce qu'une partie du chrome a été soustraite à la réaction par suite de son oxydation sous l'influence de la vapeur d'eau résultant de la réduction par l'hydrogène de la surface interne du tube. Dans les autres essais à haute température, comme dans ce dernier, nous avons

constaté la présence d'un peu d'oxyde de chrome vert à la surface des lingots.

Un fragment pesant 10 gr. 800 est porphyrisé et attaqué par HCl à 10 p. 100; comme avec les culots précédents, l'action est vive, rapide et du chrome passe seul en solution. Il reste 9 grammes d'un résidu cristallin semblable à ceux déjà obtenus, mais de couleur un peu plus foncée. Son analyse a fourni les chiffres suivants :

	I	II
Cr =	60,04	60,73
As =	»	»

Ces chiffres s'écartent assez de la formule Cr^{As} , aussi nous avons soumis le produit à une nouvelle attaque prolongée pendant une nuit, au moyen du même réactif. Cette fois, un peu d'arsenic est passé en solution avec le chrome. Le résidu obtenu, plus clair et plus fin que le précédent, se compose de deux parties, que l'on peut séparer par lévigation : d'abord une poudre noirâtre, dont la teneur, plus forte en arsenic, semble être la cause de l'écart de l'analyse du premier résidu avec la formule; puis des cristaux gris très nets, plus lourds que la poudre. Nous avons analysé avec soin ces derniers, ce qui nous a donné :

Cr =	62,00	62,40
As =	37,45	36,65
	<u>99,45</u>	<u>99,05</u>

Ces chiffres correspondent d'une façon satisfaisante à la formule.

Donc, l'attaque de culots d'une teneur en chrome égale ou supérieure à 63 p. 100 fournit le composé Cr^{As} , à condition qu'on élimine le résidu noirâtre capable de perturber les analyses.

PROPRIÉTÉS. — Isolé par les acides, le composé Cr^{As} se présente sous la forme d'une poudre très fine, cristalline, gris noirâtre. Fondu en lingots, il constitue des culots gris d'une fragilité excessive, à cassure blanche et cristalline, qui présente au bout de quelque temps des reflets irisés; dans ces lingots apparaissent une foule de soufflures tapissées de petits cristaux brillants.

Densité théorique : 6,31. Densité trouvée à 0° : 7,05.

Les oxydants, les alcalis, le chlore, exercent la même action que sur les composés précédents.

Le soufre ne manifeste pas d'effet sensible vers 500°.

L'acide chlorhydrique ne l'attaque légèrement qu'à l'ébullition.

L'acide azotique n'agit pas.

L'acide sulfurique concentré et bouillant le dissout avec dégagement de gaz sulfureux.

L'eau régale ne le détruit que faiblement.

MÉTHODE D'ANALYSE. — Tous les composés étudiés résistant fortement aux acides, nous avons dû, pour les doser, les attaquer par les alcalis. Nous avons employé la potasse en fusion dans un creuset d'argent, dont nous portions la température jusque vers le rouge. Les arséniures s'attaquent facilement et complètement s'ils se trouvent dans un état de division convenable. Après refroidissement, la masse fondue est reprise par l'eau additionnée d'acide chlorhydrique et traitée par l'hydrogène sulfuré, qui précipite l'arsenic et transforme le chromate en sel chromique.

Dans la solution filtrée, le chrome est séparé par le sulfure d'ammonium. Le précipité de sulfure d'arsenic, dissous dans l'ammoniaque, qu'on évapore au bain-marie, est repris par l'acide azotique, et l'arsenic est précipité à l'état d'arséniate ammoniaco-magnésien, qu'une calcination ménagée transforme sans perte en pyro-arséniate de magnésium.

L'acide carbonique en hydrologie;

Par M. le D^r P. CARLES.

La récente revendication de M. Glangeaud à propos de l'acide carbonique volcanique⁽¹⁾ nous engage à résumer divers passages des

(¹) Le *Journal de médecine de Bordeaux* a publié en primeur, le 14 juillet 1907, un article intitulé : « Le gaz carbonique dans l'industrie, la médecine et les terrains volcaniques ». Cette note a été reproduite peu après par le *Répertoire de pharmacie*, de Paris. M. Glangeaud, professeur à la Faculté de Clermont, en ayant eu connaissance, a tardivement revendiqué au *Répertoire* la primeur des faits publiés sous la signature P. Carles. Mais M. Crinon, rédacteur en chef de ce recueil, a répondu : « On aura de

leçons que nous avons faites à la Faculté de médecine et de pharmacie pendant les quelques années que nous y avons été chargé du cours d'hydrologie.

Nous nous bornerons aux eaux plus ou moins bicarbonatées.

Pour rappeler la puissance minéralisatrice du gaz carbonique, nous indiquions tout d'abord que Struve, avec la chaleur seule et l'eau carbonique sous pression, était arrivé à dissoudre des laves réfractaires aux acides forts. Puis nous montrions l'expérience suivante :

On apportait quatre litres d'eau distillée fortement colorée avec de la teinture de tournesol et on la divisait en cinq récipients. Le premier, flacon ouvert, servait de témoin. Le second était un siphon à eau de seltz; on le chargeait avec un sparklet de gaz carbonique. Le troisième, siphon pareil au précédent, recevait l'un après l'autre deux sparklets⁽¹⁾. Le quatrième, siphon jumeau, était mis en pression avec trois sparklets. Enfin, dans le cinquième flacon, l'eau était nettement rougie avec de l'acide sulfurique.

Lorsque tout était installé, ces cinq récipients formaient une gamme ascendante de couleur, visible de tout l'amphithéâtre. Elle indiquait nettement l'énergie acide progressive du gaz carbonique. Elle faisait tout de suite pressentir que dans les couches géologiques profondes la pression considérable que supportait ce gaz, pression centuplée et au delà par la chaleur, pouvait faire de lui un acide énergétique. Elle suggérait qu'en pareille occurrence il pouvait devenir capable de faire dissoudre par l'eau les roches les plus résistantes à l'air libre vis-à-vis des acides les plus énergiques.

Quoique de petits manomètres vissés aux siphons permissent de constater que le virage de la teinte était bien proportionnel à la pression intérieure, on vidait néanmoins ensuite l'eau gazeuse dans des flacons

la peine à enlever à M. Carles le mérite d'avoir compris qu'il serait possible d'utiliser industriellement l'acide carbonique volcanique. Il suffira, pour s'en convaincre, de lire les diverses notes écrites par cet auteur sur le sujet. On les trouvera dans le *Répertoire* de 1899 sous le titre de : « Fabrication de l'eau de Seltz », et en 1900 sous celui de : « Emploi de l'acide carbonique géologique ». Enfin, la même année, M. Carles a publié dans le *Moniteur vinicole de Paris* une note sur les « Mousseux à bon marché » où il met en relief les qualités de ce gaz pour les emplois vinicoles. Il y ajoute que lorsque cela deviendra nécessaire, on trouvera sur le plateau central français le gaz carbonique voulu pour champagner tous les vins doux venant de France et d'Algérie. (*Répert. pharm.*, juin 1908.)

(¹) Cette opération est aisée en plaçant dans le col du siphon une petite soupape s'ouvrant de dehors en dedans.

pareils au témoin; et bientôt on constatait ceci : c'est qu'au fur et à mesure du dégagement du gaz, la teinte tendait à s'uniformiser avec celle du témoin. A la leçon suivante, toutes ces teintes étaient à l'unisson.

Une autre fois, on introduisait dans un de ces siphons de l'eau distillée contenant en suspension du fluorure de calcium récemment précipité et bien lavé. On chargeait avec un ou deux sparklets et on passait bientôt sur un filtre serré. Au bout de quelques jours, on constatait que le gaz en se dégageant de ce liquide resté bien limpide avait laissé cristalliser de petits cubes visibles à l'œil nu, mais de régularité frappante à la loupe. Ces cristaux, mêlés d'acide sulfurique, donnaient des vapeurs qui gravaient le verre. Le gaz carbonique est donc capable de dissoudre le spath fluor malgré sa dureté.

Enfin, dans une autre circonstance, on faisait bouillir de la poudre de fluo-sulfate de barite naturel avec du carbonate de soude⁽¹⁾. Progressivement il se faisait du fluorure de sodium, du sulfate de soude, du carbonate de barite et du carbonate de soude en petit excès. Cette bouillie était introduite dans un siphon; on chargeait avec un ou deux sparklets. En filtrant, il venait un liquide limpide où se trouvaient en présence : du bicarbonate de barite soluble avec du sulfate de soude, et cependant ces deux sels n'obéissaient pas aux lois de double décomposition de Bertholet, regardées comme absolues. Cette impuissance était liée à la présence du bicarbonate de soude, dont la stabilité était commandée par l'acide carbonique en excès.

Si on mettait ce liquide dans un récipient dix fois plus profond que large (un tube à essais), il se maintenait limpide et en équilibre pendant bien des jours. Si, au contraire, on le logeait à côté dans un récipient dix fois plus large que haut (cristalliseur), le gaz carbonique se diffusait aisément, et deux à trois jours après tous les sels se déposaient, chacun à son tour, selon son rang de solubilité, dans ce liquide carbonique⁽²⁾.

(¹) Cette expérience avait pour but de montrer la formation naturelle des eaux de Nérès-les-Bains.

(²) C'est ainsi qu'ont dû se former géologiquement les couches successives de carbonates terreux, alcalino-terreux avec agglomérats ou cristaux de fluorine et autres; ainsi que les carbonates ou oxydes métalliques proprement dits. Nous y joignons aussi toutes les substances susceptibles de se dissoudre dans l'eau surchauffée et saturée à la fois d'acide carbonique sous pression, dans les couches profondes du globe, pour venir former des sédiments à la surface.

Cette expérience démontrait que lorsque dans certaines stations à eau hyperthermale on met cette eau à l'air, en grande surface, pour la ramener au degré propre à la balnéation, on change absolument sa composition chimique naturelle; et que lorsque, pour la refroidir plus vite, on pulvérise cette eau à l'air, on commet un mal pire. Nul n'a encore relevé cette fausse manœuvre.

Cette expérience explique encore la justesse de l'observation clinique qui dit : Les bains donnés avec cette eau en août n'ont pas les mêmes vertus thérapeutiques qu'en mai, juin ou septembre. Il est clair, en effet, qu'au commencement et à la fin de la saison la presse des baigneurs est moindre, les nuits sont plus froides, l'eau qu'on aère se refroidit plus vite et davantage, de telle sorte qu'il en faut bien moins pour atténuer la température de celle qui va *directement* du griffon à la baignoire.

Lorsque, contrairement à l'opinion courante, nous avons apporté la preuve de la présence du fluor dans la généralité des eaux minérales, et surtout quand nous avons démontré qu'il y en avait trois fois plus dans les eaux bicarbonatées alcalines qu'ailleurs, c'est parce que l'acide carbonique libre de ces eaux leur apporte ce privilège.

Les eaux superficielles qui sourdent du calcaire sont si fades et si lourdes à l'estomac qu'elles sont mauvaises pour tout le monde (hormis pour quelques hyperchlorhydriques) et même malsaines pour certains sujets. Ces eaux sont éminemment aptes à se saturer d'acide carbonique. En cet état, elles deviennent légères à la digestion. Leur composition se rapproche alors de celle des eaux de table du plateau central français, et on peut indéfiniment en user sans inconvénient.

Lorsque les eaux potables contiennent près de 0,10 de sulfate de chaux par litre, elles sont réputées crues ou séléniteuses; à 0,25, l'hygiène prescrit de les bannir de l'usage alimentaire. Cependant il y a des eaux minérales que notre organisme supporte relativement bien à des doses supérieures. Ainsi à Capvern la dose de sulfate de chaux est de 1,123 par litre; à Vittel, de 1,420; à Cransac et à Contrexéville, de 1,565; à Martigny, de 1,593; à Bagnères-de-Bigorre, de 1,836, et enfin à Aulus, de 1,861.

Cette tolérance tient à ce qu'elles renferment en même temps des bicarbonates alcalins, maintenus toujours en saturation par de l'acide carbonique en excès. Supprimons, en effet, ce dernier, en laissant la bouteille en vidange et débouchée, et aussitôt le bicarbonate se dissociera, rendant l'eau indigeste et de saveur détestable.

Ce point est à retenir, car en bicarbonatant légèrement les eaux séléniteuses de puits et autres et en les gazéifiant ensuite, on les rend supportables à nos organes gastro-intestinaux.

Rappelons à ce propos que les purgatifs salins dans lesquels il y a un petit excès de bicarbonate de soude saturé de gaz carbonique sont moins désagréables à prendre et mieux tolérés par l'estomac que lorsqu'ils sont simplement dissous dans l'eau ordinaire.

Tous ces exemples font ressortir le rôle considérable que joue le gaz carbonique en hydrologie. Quelques-uns justifient le nom qu'on lui donne parfois d'*agent grand minéralisateur*.

Séance du 16 juillet 1908.

PRÉSIDENCE DE M. BOULOUGH

Sur les arséniures de fer;

Par M. EM. VIGOUROUX.

Ces recherches constituent un premier travail capable de faire connaître, par voie chimique, quels sont les composés susceptibles d'être engendrés sous l'action directe de l'arsenic et du fer.

I. — Expériences susceptibles de former le corps FeAs^3 .

a. Action des *vapeurs* d'arsenic sur le fer. — On prend un tube horizontal en verre contenant deux nacelles en porcelaine, l'une chargée d'arsenic, l'autre de fer réduit pur. Un courant lent d'hydrogène parcourt le tube pendant que le métal est porté graduellement à une température comprise entre 300° et 400°. On atteint facilement un point tel que l'arsenic entraîné par le courant d'hydrogène et venant passer sur le fer est lentement absorbé par cette dernière substance. Au bout de trois heures environ, il est mis fin à l'expérience, les nacelles sont abandonnées au refroidissement dans le courant gazeux, puis, les surfaces étant renouvelées par pulvérisation subséquente de la masse métallique, cette même opération est recommencée un certain nombre de fois.

Une quantité de 10 grammes de fer a pesé 24 gr. 458 après le premier passage d'arsenic, et dès le second, son poids atteint 34 gr. 227. Ensuite, de multiples passages ne font monter que de petites quantités le poids de la nacelle renfermant ce métal. En s'arrêtant lorsque ce dernier ne s'élève pas sensiblement, on trouve facilement par le calcul que l'augmentation totale de poids correspond approximativement à FeAs^2 qui exige $\text{Fe} = 27,15 \text{ p. } 100$ et $\text{As} = 72,85 \text{ p. } 100$.

L'analyse décèle en effet dans cette substance :

	I	II
Fer.	28,41	28,64
Arsenic	<u>70,42</u>	<u>71,12</u>
	98,83	99,76

La proportion d'arsenic s'y trouve un peu faible, mais, en répétant son action, on peut constater que, la température de la nacelle renfermant le métal étant maintenue le mieux possible vers le rouge naissant, il s'en absorbe encore une certaine quantité, bien que faible (autour de 0,1 p. 100 dans chaque opération) et cela, tant que sa proportion n'a pas atteint 72,85 p. 100.

Le résultat de cet essai est représenté par une poudre gris clair, non magnétique. La densité à zéro égale 7,05 (densité théorique : 6,25).

b. — De l'arsenic en poudre mélangé intimement avec du fer réduit est chauffé, comme précédemment, dans un courant lent d'hydrogène et à des températures comprises entre 350° et 400°. Le métalloïde est utilisé toujours en excès et, après une première opération, le contenu de la nacelle est additionné d'une nouvelle quantité d'arsenic dont une partie distille, comme dans les cas précédents, tandis que l'autre est absorbée par le métal. Lorsque la saturation de ce dernier paraît complète, la masse résiduelle pulvérulente, exempte d'arsenic libre, décèle à l'analyse :

	I	II
Fer.	28,09	27,85
Arsenic	<u>71,55</u>	<u>72,12</u>
	99,64	99,97

c. Opération en *tube scellé*. — 3 grammes de fer réduit furent intimement mélangés à 8 grammes d'arsenic et le tout introduit dans un

tube en verre d'léna d'environ 15 centimètres de long, que l'on ferma à la lampe après y avoir fait le vide. Ce dernier, disposé dans un tube en fonte, fut chauffé aussi régulièrement que possible, sa partie inférieure étant portée vers le rouge naissant. Comme, après refroidissement, de l'arsenic se trouvait condensé à l'une des extrémités du tube, on agita ce dernier de façon à rétablir le contact des deux substances, à les ramener vers son milieu et l'on chauffa encore à une température sensiblement comprise entre 300° et 400°. On arriva ainsi à faire absorber au fer une nouvelle quantité d'arsenic et finalement, l'arsenic libre ayant été amené à se condenser à une extrémité du tube, on analysa la substance grise formée; sa proportion d'arsenic fut trouvée égale à 71,95 p. 100.

II. — Expériences susceptibles d'engendrer FeAs.

a. — Un mélange de fer réduit et d'arsenic en excès est chauffé vers 700°-800°, toujours dans une nacelle en porcelaine disposée dans un tube horizontal parcouru par de l'hydrogène. La combinaison a lieu avec incandescence; de l'arsenic distille. En répétant deux autres fois cette même opération, c'est-à-dire en chauffant environ deux heures la masse précédente, après l'avoir additionnée d'une nouvelle quantité d'arsenic et après avoir renouvelé les contacts à l'aide du mortier, on tombe sur une substance renfermant :

	I	II	CALCULÉ POUR FeAs
	—	—	—
Fer . .	42,96	43,19	42,70 p. 100
Arsenic.	<u>56,82</u>	<u>56,49</u>	<u>57,30</u> —
	99,78	99,68	100,00

C'est une poudre gris clair; densité à zéro : 7,23 (densité théorique : 6,48); non magnétique.

b. — Le biarséniure de fer FeAs², disposé dans une nacelle en porcelaine et longtemps chauffé autour de 700°-800° dans un tube horizontal en verre dans lequel circule un courant d'hydrogène, perd peu à peu une certaine quantité d'arsenic. Dès que tout dégagement a cessé, le produit résiduel décèle à l'analyse :

	I	II
Fer	42,27	42,6½ p. 100
Arsenic.	57,53	57,25 —
	<u>99,80</u>	<u>99,89</u>

Pour atteindre ce résultat, un poids de 4 grammes de FeAs^3 a dû être maintenu plusieurs jours à la température indiquée ci-dessus.

III. — Expérience susceptible de donner naissance à Fe^3As^3 .

Un alliage d'arsenic titrant environ 65 p. 100 de ce dernier, disposé dans une nacelle en porcelaine et chauffé à une température voisine de 1400° à l'intérieur d'un tube en porcelaine parcouru par de l'hydrogène, a laissé dégager de l'arsenic et a abandonné une masse renfermant :

	I	II	CALCULÉ POUR Fe^3As^3
Fer . .	53,02	52,43	52,79 p. 100
Arsenic.	48,45	47,74	47,21 —
	<u>101,47</u>	<u>100,17</u>	<u>100,00</u>

C'est un corps fondu, blanc d'argent, densité à zéro : 7,38; sa densité théorique serait de 6,68. Non magnétique.

IV. — Expérience susceptible de former Fe^3As .

Un mélange intime de fer réduit : 66 grammes; arsenic : 34 grammes est disposé dans une nacelle en porcelaine contenue à l'intérieur d'un tube de même nature parcouru par un courant d'hydrogène pur et sec. Le tout est chauffé dans un four à gaz capable de fournir une température de 1100° - 1200° . Après refroidissement, le culot, d'homogénéité douteuse, est chauffé dans les mêmes conditions, après avoir été pulvérisé.

Le lingot, obtenu dans cette seconde opération, se présente sous l'état complètement fondu et avec une cassure lamellaire. Son titre est de :

Fer	70,00 p. 100
Arsenic.	29,20 —
	<u>99,20</u>

ATTAQUE PAR LES ACIDES. — *a.* Un fragment d'environ 7 grammes est placé à l'intérieur d'un petit panier de platine plongeant dans une solution aqueuse d'acide sulfurique commercial en renfermant 5 p. 100 : une attaque assez vive se produit à chaud. Au bout de quelques jours, toute action ayant cessé, les grains obtenus en effritant entre les doigts le morceau restant dans le panier accusent, après lavage et dessiccation, une proportion d'arsenic voisine de 36 p. 100. Cette proportion s'élève si l'on pulvérise la substance et l'on constate, de plus, qu'il ne passe que des traces d'arsenic dans la liqueur.

b. — Un poids de 10 grammes amené à l'état de poudre très fine est projeté dans une solution chaude d'acide chlorhydrique commercial en renfermant 15 p. 100. L'attaque, faible en commençant, s'accroît lorsqu'on porte le liquide à l'ébullition. Le gaz qui se dégage, brûle avec une flamme blanche indiquant la présence de l'arsenic. Après que tout dégagement a cessé, on lave le résidu solide à l'alcool, l'éther, puis on le sèche vers 150° dans un tube parcouru par de l'hydrogène sec.

Le produit obtenu est constitué par une poudre brillante, cristalline, d'aspect gris d'acier, non magnétique. Les résultats de son analyse sont les suivants :

	I	II	CALCULÉ POUR Fe^3As
	—	—	—
Fer . .	58,22 p. 100	57,75 p. 100	59,85
Arsenic.	41,66 —	»	40,15
	99,88		100,00

On voit qu'il paraît se former le corps Fe^3As en présence du fer en excès. Dans ce dernier cas, l'attaque par les acides a souillé les résidus obtenus d'une poudre noire, pyrophorique dont il est difficile de les débarrasser et qui élève leur teneur en arsenic.

Sur les arséniures de manganèse;

Par G. ARRIVAUT.

Lorsqu'on fait agir l'arsenic sur le manganèse, la réaction se produit avec incandescence dès la température de 500°, et l'on obtient une

masse plus ou moins frittée, généralement douée de fortes propriétés magnétiques.

L'étude détaillée de cette réaction m'a permis de caractériser trois arséniures définis : $\text{Mn}^{\text{I}}\text{As}$, $\text{Mn}^{\text{II}}\text{As}^{\text{I}}$ et MnAs .

I. ARSÉNIURE $\text{Mn}^{\text{I}}\text{As}$. — C'est le plus stable et celui qui se forme à haute température; je l'ai préparé soit par union directe des éléments, en chauffant du manganèse pur (1) avec un excès d'arsenic, au four Schlöesing et dans un courant d'hydrogène, soit en décomposant par la chaleur un arséniure plus arsénié, vers 1400° , toujours dans un courant d'hydrogène.

Voici les nombres trouvés dans l'analyse de deux échantillons obtenus en utilisant les modes de préparation indiqués :

	I	II	CALCULÉ pour $\text{Mn}^{\text{I}}\text{As}$
	—	—	—
Mn . . .	59,90	Mn 58,18	Mn 59,45
As . . .	40,05	As 41,05	As 40,55
	<u>99,95</u>	<u>99,23</u>	<u>100,00</u>

PROPRIÉTÉS. — Le corps formé se présente sous la forme d'une masse métallique fondue, souvent caverneuse et de couleur gris d'acier, très fragile, peu altérable à l'air et *non magnétique*. L'acide chlorhydrique l'attaque mal, mais l'acide azotique le dissout rapidement en dégageant des vapeurs nitreuses.

II. ARSÉNIURE $\text{Mn}^{\text{II}}\text{As}^{\text{I}}$. — Ce composé intermédiaire est le plus facile à obtenir par suite de sa formation à température moyenne, c'est-à-dire vers $700-800^{\circ}$, chaque fois que l'on met en présence du manganèse et de l'arsenic. J'ai opéré :

1° En faisant passer des vapeurs d'arsenic sur du manganèse pulvérisé et chauffé vers $700-800^{\circ}$. Au four Mermet, dans un tube en porcelaine parcouru par un courant d'hydrogène, je disposais deux nacelles, l'une contenant le manganèse, l'autre l'arsenic, et dans un ordre tel que le

(1) Métal aluminothermique; pour la préparation, voir *Process-verbaux des séances de la Soc. des Sc. phys. et nat. de Bordeaux*, séance du 8 juin 1905 : *Contribution à l'étude des alliages de manganèse et d'antimoine*.

courant d'hydrogène entraînant sur le manganèse les vapeurs d'arsenic. Au bout de deux heures de chauffe, la nacelle contient une masse frittée dont le poids a presque doublé. Après l'avoir porphyrisée, je la soumettais une deuxième fois à l'action des vapeurs d'arsenic et ainsi jusqu'à poids constant, la température étant toujours de 760-800°.

2° En chauffant un mélange de manganèse et d'arsenic fraîchement distillé ⁽¹⁾ en excès, toujours au four Mermet, vers 800° et dans un courant d'hydrogène. La réaction commence dès 500° avec incandescence.

3° En décomposant à 800° l'arséniure MnAs dans un courant d'hydrogène. Il se dégage de l'arsenic et il reste Mn³As⁴.

Voici les chiffres obtenus à l'analyse :

	I	II	III	CALCULÉ pour Mn ³ As ⁴
Mn. . . .	53,15	52,30	53,00	52,38
As. . . .	46,70	47,67	46,34	47,62
	<u>99,85</u>	<u>99,97</u>	<u>99,34</u>	<u>100,00</u>

PROPRIÉTÉS. — Poudre grise, *très magnétique*, mal attaquée par l'acide chlorhydrique, soluble dans l'acide azotique avec dégagement de vapeurs nitreuses.

III. ARSÉNIURE MnAs. — Il correspond à la limite supérieure d'arséniuration du manganèse et n'est stable qu'au-dessous de 400-450°.

Je l'ai obtenu :

1° En faisant passer des vapeurs d'arsenic sur du manganèse ou mieux sur l'arséniure Mn³As⁴, au voisinage de 400°. Mais même en répétant l'opération un grand nombre de fois, on n'arrive jamais à saturer complètement le métal et à arriver exactement à MnAs qui doit être considéré comme une limite difficile à atteindre.

2° En chauffant ensemble les éléments porphyrisés. Mais, dans ce cas encore, on n'obtient que difficilement la saturation et seulement

(¹) L'arsenic fraîchement distillé est brillant comme un miroir, mais il ternit rapidement par suite d'une légère oxydation. Il est absolument essentiel dans ces expériences de n'employer qu'un corps non oxydé, sans cette précaution, sa réduction par l'hydrogène donnerait de la vapeur d'eau qui serait réduite à son tour par le manganèse avec formation d'oxyde vert irréductible.

après un assez grand nombre de chauffes effectuées toujours en excès d'arsenic et au voisinage de 400° (1).

3° En tubes scellés. Pour arriver plus rapidement à la limite, il y a avantage à opérer sous pression et à chauffer plusieurs fois le mélange intime des corps en tubes scellés entre 400 et 500°, en ayant soin d'employer un grand excès d'arsenic. Après refroidissement, on trouve toujours le métalloïde localisé à une extrémité du tube, ce qui rend facile sa séparation de l'arséniure.

Voici quelques-uns des chiffres d'analyses obtenus dans ces trois séries d'essais.

	I	II	III	CALCULÉ pour MnAs
Mn. . . .	44,60	43,47	42,69	42,30
As. . . .	55,13	56,50	57,25	57,70
	99,73	99,97	99,94	100,00

PROPRIÉTÉS. — Poudre gris clair, *très magnétique*, insoluble dans l'acide chlorhydrique, soluble dans l'acide azotique.

REMARQUES. — I. J'ai préparé aussi un certain nombre d'alliages titrant moins de 40 p. 100 d'arsenic, pensant obtenir l'arséniure Mn^2As , en enlevant l'excès de manganèse par un acide faible. Mais lorsqu'on effectue ce traitement, il se dégage des quantités considérables d'hydrogène arsénié, ce qui indique la présence d'un arséniure inférieur décomposable par les acides, en même temps qu'il se forme une matière noirâtre sur la nature de laquelle je reviendrai plus tard et dont la présence m'a jusqu'ici empêché d'isoler de cette manière l'arséniure Mn^2As .

II. L'arséniure $MnAs$ peut être encore obtenu en faisant agir au rouge sombre le chlorure d'arsenic sur le manganèse. L'étude détaillée de cette réaction fera l'objet d'une communication ultérieure.

En résumé, en faisant réagir l'arsenic sur le manganèse et en variant les conditions d'expériences, j'ai pu isoler trois arséniures définis : Mn^2As , Mn^3As et Mn_4s . Les derniers étant caractérisés par des propriétés magnétiques très accentuées.

(1) L'arsenic se volatilisant très lentement à 400°, il y a avantage à employer de l'arsenic amorphe qui se sublime à une température plus basse.

Sur les arséniures d'argent;

Par MM. VIGOUROUX et SANFOURCHE.

BIBLIOGRAPHIE. — Les composés que l'argent peut former avec l'arsenic ont été étudiés par Descamps⁽¹⁾ en même temps qu'une série d'autres arséniures. En réduisant l'arséniate d'argent par le cyanure de potassium à basse température, il obtenait AgAs sous forme d'un culot blanc très dur, cassant qui, fondu dans le cyanure de potassium, perdait de l'arsenic en donnant un nouveau corps dont il n'indiquait pas la composition. Celui-ci, refondu à une température plus élevée, sous une couche d'acide borique, fournissait Ag^3As .

Descamps préparait encore divers arséniures de compositions inconnues, en faisant séjourner de l'arsenic métallique dans une solution de sulfate d'argent.

Gehlen, Berthier, Guetier⁽²⁾, pensent avoir obtenu, par l'action de l'arsenic sur l'argent en fusion, des arséniures à 14 p. 100 d'arsenic, par conséquent correspondant à peu près à la formule Ag^4As qui en exige 14,8 p. 100, mais il est probable que ce n'étaient pas des composés définis.

Nous avons reproduit les expériences de Descamps, en réduisant l'arséniate d'argent par le cyanure de potassium à température aussi basse que possible; dans un premier essai, effectué au-dessous du rouge sombre, un peu d'arsenic s'est volatilisé au début, et il est resté une grenaille métallique fondue ne contenant que 10 p. 100 d'arsenic. Un autre essai effectué à température moins élevée encore (au-dessous de 300°) a abandonné, après épuisement par l'eau, un résidu spongieux grisâtre et peu homogène, où l'analyse a décélé 14 p. 100 d'arsenic. Ce nombre est fort éloigné des 41 p. 100 qu'exigerait la formule AgAs .

Les procédés de ces auteurs nous ayant conduit à des résultats douteux, il a été appliqué des méthodes nouvelles à l'étude des arséniures d'argent; nous avons ainsi obtenu, avec le corps Ag^3As , le composé Ag^4As , qui n'avait jamais été mentionné, et dont l'étude est

⁽¹⁾ DESCAMPS, *Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, t. LXXXVI, p. 1022, année 1878.

⁽²⁾ *Encyclopédie chimique de Frémy*, art. Argent, p. 278.

rendue plus compliquée par suite de l'action toute particulière que la chaleur exerce sur lui.

ARSÉNIURE Ag^3As

Composition :

$$\begin{array}{r} \text{Ag} = 81,20 \\ \text{As} = 18,80 \\ \hline 100,00 \end{array}$$

PRÉPARATION. — Le composé Ag^3As se forme :

1° Par l'action du chlorure d'arsenic sur l'argent pur ou l'arséniure Ag^3As .

Un courant de vapeurs de chlorure d'arsenic porté à l'ébullition dans une cornue tubulée passe sur l'argent pulvérulent contenu dans une nacelle placée à l'intérieur d'un tube chauffé sur une grille à gaz. A une température inférieure à 700° , il commence à se déposer de l'arsenic sur le tube, et l'argent est attaqué en formant du chlorure d'argent, qui reste dans la nacelle. Le contenu de cette dernière, mis en digestion dans l'ammoniaque qui dissout le chlorure d'argent, abandonne un corps pulvérulent formé d'argent renfermant plus ou moins d'arsenic combiné, mais jamais plus de 5 p. 100.

En opérant vers 800° , l'action s'exerce d'une façon plus nette; il apparaît toujours de l'arsenic libre dans le tube, et la masse fondue de chlorure d'argent englobe un lingot également fondu dont la teneur en arsenic va en augmentant, après chaque opération, jusqu'au nombre correspondant à la formule Ag^3As . Il n'est pas possible de remplacer ces attaques successives par une seule action prolongée du chlorure d'arsenic, le chlorure d'argent formé au bout de quelque temps arrêtant toute action ultérieure.

Après le premier passage, le produit obtenu présente la composition suivante :

$$\begin{array}{r} \text{Ag} = 91,87 \\ \text{As} = 7,25 \\ \hline 99,12 \end{array}$$

Après le second :

	I	II
	<u> </u>	<u> </u>
Ag =	83,05	83,21
As =	15,25	15,83
	<u>98,30</u>	<u>99,04</u>

La troisième action du chlorure d'arsenic conduit à la formule Ag^3As :

I	II	CALCULÉ POUR Ag^3As
$\text{Ag} = 81,40$	81,33	81,20
$\text{As} = 18,00$	18,21	18,80
<u>99,40</u>	<u>99,54</u>	<u>100,00</u>

Ce titre une fois atteint, le chlorure d'arsenic agissant toujours dans les mêmes conditions n'élève plus la teneur du culot; il y a dépôt d'arsenic et formation de chlorure d'argent comme dans les expériences antérieures, et la masse d'arséniure ne fait que diminuer peu à peu sans changer de formule. 10 grammes de Ag^3As traités comme ci-dessus fournissent un lingot de 4 grammes englobé dans du chlorure d'argent fondu, et de composition :


I	II
$\text{Ag} = 80,70$	81,13
$\text{As} = 18,70$	18,84
<u>99,40</u>	<u>99,97</u>

Une dernière action réduit son poids à 0 gr. 900; l'analyse donne :

$$\begin{aligned}\text{Ag} &= 81,37 \\ \text{As} &= \text{ » }\end{aligned}$$

de sorte que c'est la réaction inverse de la formule ci-dessus qui tend à se produire.

2° Ag^3As se forme encore en réduisant le chlorure d'argent par la vapeur d'arsenic. La réaction a lieu dans un tube horizontal, au sein d'une atmosphère de gaz carbonique produit par la décomposition de bicarbonate de sodium. L'arsenic en excès se dépose dans les parties froides de l'appareil, accompagné de gouttelettes de chlorure d'arsenic formé :



Il reste une masse fondue de chlorure d'argent qui n'a pas réagi, englobant un lingot métallique dont l'analyse décèle :

$$\begin{aligned}\text{Ag} &= 80,44 \\ \text{As} &= 19,25 \\ &\underline{\hspace{1cm}} \\ &99,69\end{aligned}$$

Ce qui correspond à la formule Ag^3As .

PROPRIÉTÉS. — Obtenu par l'un ou l'autre de ces deux procédés, l'arséniure Ag^{As} forme des lingots parfaitement fondus, à surface blanche cristallisée, s'écrasant sous le choc du marteau, à cassure foncée et cristalline. Densité théorique : 9,09. Densité trouvée à 0° : 9,25 (1).

Chauffé dans un courant d'hydrogène, le composé perd son arsenic à partir de 300° et, avant d'atteindre 400°, il n'en retient plus que 4 ou 5 p. 100, qu'il abandonne sous l'action prolongée de la chaleur au rouge faible.

Le chlore l'attaque à chaud en donnant du chlorure d'arsenic et du chlorure d'argent. Le grillage à l'air ou l'oxygène au rouge naissant chassent complètement l'arsenic à l'état d'anhydride arsénieux.

Le soufre à l'ébullition le transforme en sulfures.

L'acide chlorhydrique ne manifeste pas d'action.

L'acide azotique étendu le dissout complètement.

L'acide sulfurique n'a d'effet qu'à l'état concentré et chaud; il se dégage du gaz sulfureux.

L'eau régale agit vivement à chaud; la solution, additionnée d'eau, précipite du chlorure d'argent.

Les alcalis et les carbonates alcalins sont sans effet sensible.

Le chlorate de potassium en fusion forme de l'arséniate de potassium et du chlorure d'argent.

Les nitrates alcalins fondus oxydent l'arséniure en le faisant passer à l'état d'arséniate d'argent.

ARSÉNIURE Ag^{As}

Composition :

$$\begin{array}{rcl} \text{Ag} & = & 87,80 \\ \text{As} & = & 12,20 \\ & & \hline & & 100,00 \end{array}$$

PRÉPARATION. — Ce composé se forme par union directe de l'arsenic et de l'argent, dans certaines limites de température que nous verrons d'une façon détaillée en étudiant l'action de la chaleur. En général, si l'on chauffe dans un gaz inerte, à une température quelconque au-dessus du rouge sombre, un mélange d'argent et d'arsenic en

(1) DESCAMPS donne pour son produit la densité 9,51.

poudre, lorsqu'on atteint 500° environ, il y a combinaison avec fusion de la masse et départ de l'arsenic en excès. Il en est de même si l'on fait passer des vapeurs d'arsenic sur de l'argent chauffé. Mais l'action prolongée d'une température comprise entre 300° et 900° (températures approchées) a pour effet de détruire lentement le composé en faisant dégager son arsenic. Dans les cas où l'arséniure est formé à des températures supérieures à 900°, il est nécessaire de refroidir aussi rapidement que possible, afin d'éviter les températures moyennes qui le dissocient.

Le tableau suivant donne les résultats d'analyses de produits obtenus à des températures variées. Il est à remarquer que ceux qui s'écartent un peu de la formule par défaut d'arsenic ont précisément été soumis, soit à dessein, soit involontairement, à ces températures moyennes qui favorisent la dissociation.

		Ag	As	TOTAL
		—	—	—
Théorie pour Ag^3As		87,80	12,20	100,00
Vers 500° (grille à gaz)	I	87,50	11,90	99,40
	II	88,88	»	»
Vers 800° (grille à gaz)	I	88,34	12,07	100,41
	II	88,48	»	»
Vers 1100° (four à réverbère).	I	86,82	13,33	100,15
Le produit a été refroidi brusquement par projection dans l'eau	II	86,80	13,00	99,80
Vers 1450° (four Schlœsing)	I	88,90	»	»
	II	88,86	»	»
	III	87,34	»	»
	IV	86,77	»	»

Ces diverses opérations ont lieu dans des tubes de verre ou de porcelaine parcourus par un lent courant d'hydrogène.

PROPRIÉTÉS. — L'arséniure Ag^3As se présente en lingots d'un blanc mat, assez fragiles, à cassure grise et cristalline. Le produit obtenu vers 1100°, qui a été trempé à l'eau froide, est plus cassant que les autres, et sa section présente une texture à grain fin ressemblant à celle de l'acier.

Ce corps, chauffé aussi rapidement que possible, passe à l'état liquide vers 500° , avant d'avoir subi une altération sensible.

La densité théorique est 9,55; la densité à 0° , prise sur un échantillon titrant 88 p. 100 d'argent, est égale à 9,70.

L'action des divers réactifs est identique à celle qu'ils exercent sur l'arséniure Ag^{As} . La propriété la plus remarquable consiste dans l'action de la chaleur, qui classe le composé Ag^{As} dans la catégorie des rares corps se formant à une température supérieure à celle de leur décomposition.

Chauffé dans une atmosphère d'hydrogène, il commence à dégager de l'arsenic à partir de 300° ; dans tous les cas où la température est comprise entre ce nombre et 900° , il y a dissociation, plus ou moins rapide, suivant les conditions de l'expérience. Dans une première opération, le composé pulvérisé a été maintenu pendant 12 heures entre 300° et 400° ; sa teneur en argent est montée de 88 p. 100 à 95 p. 100. La température du rouge vif, maintenue pendant plusieurs heures, lui enlève encore 2 p. 100 d'arsenic, et l'amène finalement à 97,19 p. 100 d'argent.

Nous avons pensé qu'en prolongeant l'action de la chaleur, on pourrait arriver à lui faire perdre tout son arsenic. Aussi avons-nous fait une seconde expérience, en procédant d'une façon inverse: nous avons soumis l'arséniure en un seul lingot à l'action de la chaleur, mais en commençant par la plus haute température que la grille à gaz puisse donner (850°). Le dépôt d'arsenic s'est manifesté et a continué pendant toute une journée; au bout de 8 heures, le lingot qui, jusque-là, était resté liquide, était revenu à l'état solide, mais sans cesser de dégager de l'arsenic. Les dernières traces sont très difficiles à chasser, et il a fallu prolonger pendant 40 heures l'action de la chaleur (700° environ) pour y arriver. Le résidu qui, bien qu'à l'état solide, avait débordé hors de la nacelle en perdant le reste de son arsenic, présente toutes les propriétés de l'argent: couleur, malléabilité, etc... A l'analyse, il donne 99 p. 100 d'argent.

Nous avons formé et maintenu plusieurs heures à 1100° le produit dont l'analyse est mentionnée plus haut. Il n'a pas perdu d'arsenic, ce qui semble indiquer qu'à cette température il n'y a pas dissociation. Enfin à 1450° , les faits se passent de la même façon. Dans les deux cas, un refroidissement rapide paraît donc nécessaire pour éviter l'action décomposante des températures moyennes. Comme nous

l'avons indiqué, il est assuré, dans le premier cas, par l'immersion du composé dans l'eau froide; dans le second, par l'action d'un violent courant d'air froid sur le tube qui le contient.

MÉTHODE D'ANALYSE. — Le corps est attaqué par l'acide azotique étendu, qui le dissout complètement; après avoir chassé par ébullition la plus grande partie de l'acide en excès, on étend d'eau et précipite l'argent par l'acide chlorhydrique. Dans la liqueur filtrée et concentrée, l'arsenic est dosé à l'état d'arséniate ammoniaco-magnésien.

I. Action du trichlorure d'antimoine sur le nickel;

Par E. VIGOUROUX.

Le nickel pulvérulent, soumis à l'action des vapeurs de trichlorure d'antimoine, est susceptible de fixer ce métalloïde : la réaction donne toujours naissance à du chlorure NiCl_2 et, dans des conditions particulières, il y a formation d'un anneau d'antimoine.

L'obtention d'antimoniures définis est malaisée aux températures élevées; l'attaque étant très vive, l'alliage se trouve souvent complètement détruit avant d'avoir atteint une composition fixe; de plus, s'il est amené à fusion, l'action du chlorure n'est plus que superficielle.

Nous dirigeons des vapeurs de chlorure d'antimoine sur du nickel réduit placé dans une nacelle en porcelaine, à l'intérieur d'un tube horizontal de même nature. Le métal est porté à 1450° à l'aide d'un four à chalumeau. La réaction s'effectue avec incandescence; un peu d'antimoine se dépose dans le tube. Si l'on refroidit brusquement après une demi-heure de chauffe, on ne retrouve, entourés de chlorure de nickel anhydre, que quelques grains à texture cristalline, non magnétiques, gris de fer, de composition :

	I	II	
Nickel :	59,90	60,23	p. 100
Antimoine	39,70	39,05	—
	<u>99,60</u>	<u>99,28</u>	

Ces proportions ne se retrouvent pas, lorsque l'on opère vers 1200°; le produit est alors une poudre cristalline, grise, contenant 44,40 p. 100 d'antimoine.

Dans une nouvelle série d'expériences, entreprise avec un poids initial de dix grammes de nickel porphyrisé et parfaitement réduit, le métal a été soumis vers 1000°, à trois reprises différentes, à l'action des vapeurs de trichlorure d'antimoine. Entre chaque opération, l'antimoniure était lavé et porphyrisé. La fusion n'a pas été obtenue et il ne s'est pas déposé d'antimoine dans le tube.

La production du chlorure de nickel diminue d'une opération à l'autre; après le premier passage, la substance est encore légèrement magnétique, propriété qui disparaît dès la deuxième; la troisième fournit, après élimination du chlorure métallique par l'eau, une poudre brune décelant à l'analyse :

	I	II	
Nickel	42,32	43,01	p. 100
Antimoine	57,14	56,35	—
	99,46	99,36	

Ces premiers essais montrant que la proportion d'antimoine, capable de se fixer sur le nickel, est susceptible d'augmenter lorsque l'on abaisse la température des expériences, nous avons recherché quel pouvait être l'antimoniure riche, se formant à la plus basse température possible.

A cet effet, nous avons soumis de nouveau à l'action du chlorure, après porphyrisation, l'alliage à 57 p. 100 d'antimoine. Les expériences sont effectuées dans un tube de verre sur une grille à gaz; le produit formé est abandonné au refroidissement dans la vapeur même du trichlorure. Nous opérons ainsi, dans un intervalle de température allant de 800°, température maxima obtenue à notre grille à gaz, à 230°, ce qui correspond à l'ébullition du trichlorure d'antimoine. Le premier passage fournit, avec le chlorure de nickel, une poudre cristalline, rouge violacée, à 60 p. 100 d'antimoine; il ne se libère pas d'antimoine.

Les opérations subséquentes montrent que la quantité de chlorure de nickel élaborée diminue d'une expérience à la suivante, et que lorsque l'antimoniure contient 67 p. 100 d'antimoine, ce dernier

commence à être mis en liberté, la production de chlorure de nickel étant alors très faible.

Cette proportion de 67 p. 100 d'antimoine n'a pu être dépassée; l'analyse fournit, en effet, les chiffres suivants, pour les quatre derniers passages :

	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>	<u>IV</u>
Nickel. . .	34,07	33,75	32,52	32,75 p. 100
Antimoine.	<u>65,48</u>	<u>66,15</u>	<u>67,25</u>	<u>67,15</u> —
	99,55	99,90	99,77	99,90

Nous nous sommes alors trouvé en présence d'une poudre brillante cristalline, rouge violacée, dont la composition correspond à NiSb qui exige:

CALCULÉ POUR NiSb.

Nickel	32,85	p. 100
Antimoine	<u>67,15</u>	—
	100,00	

Ces résultats étant acquis, il nous a été facile, en opérant sur la grille à gaz, d'obtenir le composé NiSb par l'action du trichlorure d'antimoine sur le nickel pulvérulent; nous avons alors trouvé que la température de 800° est la plus favorable à la formation de ce composé; la réaction s'effectue avec incandescence; il n'y a cependant pas fusion de la masse.

Cet antimoniure artificiel, NiSb, correspond au nickel antimonial, naturel, ou Breithauptite; comme ce dernier, il présente un éclat violacé, tout particulier.

CONCLUSIONS. — a). Le nickel pulvérulent, soumis à l'action des vapeurs de trichlorure d'antimoine, à température élevée, forme des corps non magnétiques, dans lesquels la proportion la plus faible d'antimoine fixée est de 39 p. 100 (Ni³Sb). Ces composés s'enrichissent en antimoine à mesure que l'on abaisse la température d'attaque; mais ils ne peuvent toutefois en contenir plus de 67 p. 100.

b) Maintenus à 800° dans le chlorure d'antimoine, le nickel ou les alliages de nickel et d'antimoine à moins de 67 p. 100 d'antimoine, se transforment en NiSb, composé dont la teneur n'a pu être élevée, sous l'action du chlorure volatil, quelle que soit la température mise en œuvre.

II. Antimoniures de nickel;

Par E. VIGOUROUX.

Dans une précédente étude, nous avons montré que le nickel, en présence du trichlorure d'antimoine, fournissait un alliage de composition NiSb.

Des expériences dans lesquelles nous avons fait agir directement les deux composants, soit en les fondant ensemble, soit en soumettant le nickel à l'action des vapeurs d'antimoine, nous ont amené à étudier de nouveau cette combinaison.

1° TEMPÉRATURE DE COMBINAISON DU NICKEL ET DE L'ANTIMOINE. —

Des mélanges pulvérulents, en proportions déterminées, de nickel parfaitement réduit et d'antimoine, placés dans des tubes à essais, ont été chauffés à des températures croissantes.

Une pince thermo-électrique, plongeant dans de la magnésie contenue dans un tube semblable aux précédents et chauffé dans les mêmes conditions, permettait d'estimer la température approchée. Quelle que soit la proportion des deux substances, on observe l'incandescence au voisinage de 500°. Cette dernière est particulièrement vive pour des quantités de 1 gramme de nickel et 2 grammes d'antimoine, ce qui correspond environ à NiSb. Lorsque la proportion de ce dernier est plus faible, la réaction ne diminue guère en intensité, mais elle apparaît beaucoup moins vive dès que la teneur en antimoine surpasse celle exigée par la formule NiSb.

2° EFFET DE LA CHALEUR SUR LES ALLIAGES RICHES EN ANTIMOINE EN PRÉSENCE DE L'HYDROGÈNE. — Un mélange de nickel et d'antimoine, préparé à 95 p. 100 de ce dernier, porté à 500° de façon à obtenir l'incandescence, puis porphyrisé, a été disposé dans une nacelle, à l'intérieur d'un tube en verre horizontal parcouru par un courant d'hydrogène et amené progressivement jusqu'à 900°. Dès 450°, on a observé le départ d'un peu d'oxyde d'antimoine; un anneau métallique a commencé à se former vers 700°. Après avoir été maintenu plusieurs heures à 900°, l'alliage contenait encore 88,90 p. 100 d'antimoine.

Si, dans une opération consécutive, on élève peu à peu la température jusqu'à 1200°, on amène une décomposition assez rapide du corps précédent, qui prend une teinte violacée. Fragmenté, puis maintenu de nouveau à 1200°, il nous a fourni un culot donnant à l'analyse :

Nickel.	33,27	p. 100
Antimoine. . . .	<u>66,89</u>	—
	100,16	

Soit NiSb.

Différents essais semblables, effectués par nous, confirment les résultats précédents et nous permettent de conclure que tous les alliages à plus de 67 p. 100 d'antimoine perdent de ce corps dans l'hydrogène et s'y transforment en NiSb, corps de couleur rouge violacée, fondant vers 1100° sans décomposition. Ainsi, un mélange riche en antimoine, maintenu dans l'hydrogène à 1200°, nous a fourni, dès la première opération, le composé NiSb.

L'alliage NiSb ainsi obtenu, maintenu dans l'hydrogène de 1200 à 1400°, ne s'est pas sensiblement décomposé. Vers 1450°, il a perdu de l'antimoine, mais lentement. Ainsi cette température, maintenue une demi-heure environ, a enlevé à NiSb les proportions d'antimoine ci-dessous indiquées :

Après la première opération

Nickel.	36,85	p. 100
Antimoine. . . .	<u>63,75</u>	—
	100,60	

Après la seconde :

Nickel.	39,25	p. 100
Antimoine. . . .	<u>60,45</u>	—
	99,70	

Après la troisième :

Nickel.	42,36	p. 100
Antimoine. . . .	<u>57,73</u>	—
	100,09	

En somme, un temps d'arrêt sensible apparaît dans la décom-

position des antimoniures de nickel, et cet arrêt correspond à la formule NiSb.

3. ACTION DE LA VAPEUR D'ANTIMOINE SUR LE NICKEL. — Le composé NiSb a été également préparé en soumettant vers 1300°, du nickel pulvérulent à l'action des vapeurs d'antimoine, entraînées par un courant d'hydrogène. A cet effet on a disposé dans un tube en porcelaine deux nacelles; la première contenant de l'antimoine, la seconde du nickel. Après un refroidissement rapide de l'appareil, on a retrouvé dans la seconde nacelle un culot rouge violacé qui a fourni à l'analyse :

Nickel.	32,15 p. 100
Antimoine.	<u>67,42</u> —
	99,57

Soit NiSb.

PROPRIÉTÉS DE L'ANTIMONIURE NiSb. — De couleur rouge violacée, non magnétique, fondant vers 1100°, ce corps se présente généralement sous forme de lingots fragiles, à texture cristalline; obtenu par l'action du trichlorure d'antimoine sur le nickel à 800°, il est constitué par des cristaux pulvérulents. Sa densité trouvée à 0° : 7,702 est supérieure à la densité théorique 7,31.

Le chlore l'attaque avec une vive incandescence, à partir du rouge naissant; des fumées de chlorure d'antimoine se dégagent.

L'oxygène provoque également l'incandescence, vers la même température; il y a production de fumées d'oxyde d'antimoine.

Le soufre l'altère, avant d'entrer en ébullition, sans incandescence.

L'acide chlorhydrique, même concentré et bouillant, est sans effet.

L'acide sulfurique n'a d'effet qu'à l'état concentré et chaud; il y a dégagement d'anhydride sulfureux et formation d'un dépôt d'oxyde d'antimoine.

L'acide azotique étendu, dont l'action est légère à froid, l'attaque assez vivement lorsqu'on élève sa température; à l'état concentré et chaud, il le décompose rapidement et complètement avec dégagement de vapeurs nitreuses et dépôt d'anhydride antimonique.

Les alcalis en solution ou fondus n'ont pas d'effet sensible.

L'eau régale ordinaire attaque le corps complètement, même à froid, en abandonnant également de l'anhydride antimonique.

Avec les carbonates ou les azotates alcalins fondus, l'attaque est longue et difficile.

Le chlorate de potassium fondu ne produit qu'une très légère oxydation superficielle, avant sa décomposition; mais, dès que cette dernière commence, l'antimoniure s'oxyde avec incandescence.

ANALYSE. — Les alliages sont mis en solution à l'aide d'eau régale étendue, faible en acide azotique.

La liqueur, fortement diluée, est précipitée à l'ébullition par l'hydrogène sulfuré; une filtration sépare le sulfure d'antimoine qui, traité par l'acide azotique fumant, produit l'antimoniate d'antimoine. Ce corps, calciné et pesé, fournit la teneur en antimoine.

La solution ne contenant que le nickel, additionnée d'acide sulfurique, est évaporée à sec; le résidu est redissous à l'aide d'un peu d'acide sulfurique et la liqueur étendue est fortement additionnée d'ammoniaque. Ce liquide alcalin est soumis à l'électrolyse.

CONCLUSIONS. — 1. Le nickel et l'antimoine se combinent avec incandescence autour de 500°.

2. Les alliages de nickel et d'antimoine contenant plus de 67 p. 100 de ce dernier, maintenus vers 1200° dans l'hydrogène, s'y transforment facilement en NiSb.

3. Les vapeurs d'antimoine, entraînées par l'hydrogène sur le nickel, vers 1200° ou mieux 1300°, fournissent le même composé.

D'un composé retiré de certains alliages de cobalt et d'antimoine;

Par F. DUCELLIEZ.

Ce premier travail sur les alliages de cobalt et d'antimoine comprend l'étude chimique de ceux dont la teneur en antimoine est supérieure à 67 p. 100; les seuls qui sont magnétiques, à la température ordinaire. Leur fusion est obtenue dans des nacelles en magnésie placées à l'intérieur de tubes en porcelaine parcourus par un lent courant d'hydrogène.

D'après une expérience de Gehlen, le cobalt et l'antimoine sont susceptibles de se combiner avec incandescence. Pour nous rendre compte de ce fait, nous plaçons dans des tubes à essais divers mélanges pulvérulents de ces deux corps, le cobalt étant bien réduit, et nous en élevons progressivement la température à l'aide d'un bain de sable. Vers 500°, l'incandescence se produit pour tous les mélanges; elle est particulièrement vive et amène la fusion complète pour une teneur en antimoine de 67 p. 100; d'autre part, elle est moins accentuée lorsque la composition en antimoine est supérieure à ce nombre, que lorsqu'elle lui est inférieure : dans ce dernier cas, le produit présente l'aspect d'une masse frittée, cristalline, grise, complètement attaquable par l'acide azotique, laissant un résidu cristallin sous l'action des acides sulfurique et chlorhydrique. Aussi, les mélanges de cobalt et d'antimoine fournissent-ils facilement, dans les foyers ordinaires, des culots fondus homogènes. Cependant, lorsque la teneur est inférieure à 30 p. 100 d'antimoine, la fusion complète n'est obtenue qu'au four à chalumeau Schlœsing.

1. Un premier culot, formé en fondant un mélange pulvérulent à 10 p. 100 d'antimoine, donne à l'analyse :

	CULOT I
	—
Cobalt	90,32
Antimoine	9,02
	<hr/> 99,34

Très magnétique, dur, il contient des géodes à tout petits pointements cristallins. Il peut être broyé au mortier d'Abich, la poussière, tamisée, est mise en digestion soit avec de l'acide sulfurique à 20 p. 100, soit avec de l'acide chlorhydrique étendu de moitié :

a) L'acide sulfurique met en solution du cobalt et de l'antimoine :

Après plusieurs attaques successives, précédées de porphyrisation, on obtient un produit d'aspect noirâtre, non magnétique, en quantité juste suffisante pour l'analyse; celle-ci fournit :

Cobalt	34,28
Antimoine	65,83
	<hr/> 100,11

b) A l'aide de l'acide chlorhydrique, on isole un résidu, de même apparence et en aussi faible quantité. Les analyses donnent :

	I	II
	—	—
Cobalt.	33,82	33,03
Antimoine.	66,38	66,24
	<u>100,20</u>	<u>99,27</u>

2. Une deuxième fusion, opérée sur un mélange à 20 p. 100 d'antimoine, fournit une masse brillante, grise, moins magnétique, mais plus fragile que la première, contenant :

	CULOT II
	—
Cobalt	80,54
Antimoine.	19,34
	<u>99,88</u>

a) L'acide sulfurique à 20 p. 100 et bouillant, agissant sur le culot finement fragmenté, met en solution du cobalt et de l'antimoine, et fournit, après une longue attaque, une poudre gris foncé non magnétique, contenant 65 p. 100 d'antimoine. Cette teneur est modifiée par des opérations subséquentes, qui ne laissent que la quantité de matière nécessaire à l'analyse ; elle est finalement :

	I	II
	—	—
Cobalt	33,01	32,96
Antimoine	66,76	67,05
	<u>99,77</u>	<u>100,01</u>

b) La composition du produit, abandonné sous l'influence de l'acide chlorhydrique étendu de moitié et bouillant, est :

	I	II
	—	—
Cobalt	32,92	33,19
Antimoine	67,10	67,02
	<u>100,02</u>	<u>100,21</u>

Du cobalt et de l'antimoine entrent en solution.

3. Une troisième chauffe amène la fusion d'un mélange à 70 p. 100 de cobalt; le culot obtenu, auquel l'analyse assigne :

	CULOT III
	—
Cobalt	70,15
Antimoine	29,38
	<u>99,53</u>

diffère du précédent par sa plus grande fragilité; il est moins attiré que lui par l'aimant.

a) Le corps que l'on en retire par l'action de l'acide sulfurique a pour composition :

	I	II
	—	—
Cobalt	33,14	32,56
Antimoine	66,45	67,66
	<u>99,59</u>	<u>100,22</u>

b) L'acide chlorhydrique sépare un résidu de teneur :

	I	II
	—	—
Cobalt	33,75	32,35
Antimoine	66,26	67,27
	<u>100,01</u>	<u>99,62</u>

Ces produits isolés, non magnétiques, représentent une très faible fraction du corps traité; du cobalt et de l'antimoine passent en solution.

Nous sommes donc arrivés, dans ces trois premiers essais, en continuant les attaques jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la matière nécessaire à l'analyse, à des résidus non magnétiques, contenant environ 67 p. 100 d'antimoine.

Comme suite à ces expériences, des mélanges pulvérulents contenant

respectivement environ 40, 50, 60 p. 100 d'antimoine, sont fondus et analysés; leur composition est :

	CULOT IV	CULOT V	CULOT VI
	—	—	—
Cobalt.	58,14	50,83	40,12
Antimoine. . . .	40,90	49,50	59,38
	<u>99,04</u>	<u>100,33</u>	<u>100,50</u>

Ces lingots sont brillants, gris clair, à section cristalline; leur magnétisme diminue et leur fragilité devient plus grande, tandis que leur teneur en antimoine augmente.

Ils sont mis en digestion, comme les précédents, soit avec de l'acide sulfurique à 20 p. 100, soit avec de l'acide chlorhydrique étendu de son volume d'eau. Ces attaques sont toujours faites à plusieurs reprises, d'abord sur le culot fragmenté, puis sur les résidus porphyrisés. On arrive rapidement à un résidu de teneur en antimoine voisine de 65 p. 100, légèrement magnétique, mais les opérations sont continuées jusqu'à ce que le résidu ne soit plus magnétique, ce qui est fort long et amène à l'obtention d'un antimonium défini. Il entre en solution beaucoup de cobalt et très peu d'antimoine pour les culots IV et V; le culot VI, dont la composition se rapproche cependant de celle du résidu à obtenir, laisse de l'antimoine se dissoudre en plus forte proportion. Le poids du composé obtenu représente une partie plus forte du culot attaqué que dans nos trois premiers essais; la proportion en augmente avec la teneur en antimoine.

Les analyses nous fournissent les résultats suivants :

a) **Après attaque** par l'acide sulfurique du résidu non magnétique, provenant des culots :

	IV	V	VI
	—	—	—
Cobalt.	34,07	34,09	33,91
Antimoine. . . .	66,30	65,18	66,24
	<u>100,37</u>	<u>99,27</u>	<u>100,15</u>

Ces chiffres ne sont pas sensiblement modifiés par une nouvelle opération; nous trouvons :

	IV —	V —	VI —
Cobalt.	33,19	33,23	33,07
Antimoine.	<u>66,68</u>	<u>66,13</u>	<u>66,48</u>
	99,87	99,36	99,55

b) Pour l'acide chlorhydrique, les chiffres d'analyse se rapportant au résidu non magnétique provenant des mêmes culots, sont :

	IV —	V —	VI —
Cobalt	34,14	33,50	33,74
Antimoine	<u>66,45</u>	<u>66,60</u>	<u>66,46</u>
	100,59	100,10	100,20

On trouve après une nouvelle attaque :

	IV —	V —	VI —
Cobalt.	33,10	33,13	33,32
Antimoine.	<u>66,18</u>	<u>66,92</u>	<u>67,13</u>
	99,28	100,05	100,45

Le corps isolé dans tous ces essais a donc une composition voisine de CoSb, qui exige :

COMPOSITION CALCULÉE POUR CoSb

Cobalt	32,96
Antimoine	<u>67,04</u>
	100,00

Un culot est fait dans la proportion de cette formule ; sa teneur trouvée est :

	CULOT VII —
Cobalt	33,33
Antimoine	<u>66,14</u>
	99,47

Il est particulièrement fragile et cristallin. Broyé, il nous permet d'isoler rapidement par l'acide chlorhydrique une quantité notable de

cristaux, de composition correspondant à CoSb qui, ajoutée aux résidus précédents, nous facilite l'étude des propriétés physiques et chimiques de l'antimoniure cité.

PROPRIÉTÉS DE L'ANTIMONIURE CoSb . — Ce corps se révèle sous la forme d'une poudre brillante, gris de fer, nettement cristalline, se ternissant à l'air, non magnétique, fondant vers 1200° . Sa densité prise à $0^\circ = 8,12$, est plus forte que sa densité théorique : 7,25 (Densité $\text{Sb} = 6,72$).


Maintenu à température élevée dans un courant d'hydrogène, il commence à perdre de l'antimoine à 1450° . Le lingot résiduel est magnétique. Après une longue opération, faite vers 1500° , il titrait 52 p. 100 d'antimoine; porphyrisé et attaqué, comme les culots précédents, par l'acide chlorhydrique, il nous fournit un résidu cristallin, non magnétique, auquel l'analyse assigne la composition :

	Après la 3 ^e attaque.	Après la 4 ^e attaque.
Cobalt	32,78	32,52
Antimoine	67,70	67,76
	<u>100,48</u>	<u>100,28</u>

Soit CoSb .

Chauffé dans le chlore, ce corps donne lieu à un vif dégagement de chaleur; du chlorure d'antimoine distille. Avec l'oxygène il y a incandescence et départ de fumées d'oxyde d'antimoine. Le soufre l'attaque aussi, vivement, avant de bouillir. L'acide chlorhydrique étendu n'a pas d'action (lorsque le composé est oxydé, il y a attaque momentanée); concentré et bouillant, il le dissout très lentement. L'acide sulfurique étendu n'a pas d'effet; concentré et chaud, il produit une réaction vive avec dégagement d'anhydride sulfureux et dépôt d'oxyde d'antimoine. L'acide azotique, étendu ou concentré, met rapidement le cobalt en solution et laisse un dépôt d'oxyde d'antimoine; l'eau régale l'attaque très vivement, la solution est complète. Les alcalis en solution n'ont pas d'effet; fondus, ils détruisent le corps, en donnant un dépôt d'oxyde de cobalt. Les carbonates alcalins en fusion ne l'attaquent que difficilement. Le chlorate de potassium l'amène à l'incandescence au moment de sa décomposition. L'azotate de potassium fondu a sur lui une action lente.

Le trichlorure d'antimoine attaque, mais ne change pas la composition de CoSb de 700 à 1450°. L'action est très faible si l'on ne dépasse pas sensiblement 800°; aux températures élevées CoSb est rapidement détruit. La réaction produit, dans tous les cas, du chlorure de cobalt et un dépôt d'antimoine :



De 600 à 700°, le trichlorure d'antimoine tend à fixer sur CoSb une petite quantité d'antimoine; l'opération amène encore la formation de chlorure de cobalt, et de l'antimoine est mis en liberté. Ainsi dans une série d'expériences dans lesquelles le chlorure volatil est dirigé un grand nombre de fois sur le composé CoSb, dans l'intervalle de température indiquée, nous obtenons un produit exempt d'antimoine libre, mais non homogène. Il est en effet facile d'en séparer par lévigation d'une partie lourde, abondante, fournissant à l'analyse 66,24 d'antimoine et correspondant par conséquent à CoSb non attaqué, une partie plus légère contenant 71,03 d'antimoine.

ANALYSE. — Après dissolution du corps dans l'eau régale faible en acide azotique, la liqueur, fortement étendue, est précipitée à l'ébullition par l'hydrogène sulfuré. Le sulfure d'antimoine, séparé par filtration, est transformé par l'acide azotique fumant en antimoniate d'antimoine qui est calciné, puis pesé. La liqueur filtrée, additionnée d'acide sulfurique, est évaporée à sec; du poids de sulfate métallique obtenu, on déduit celui du cobalt.

CONCLUSIONS. — 1. Les alliages de cobalt et d'antimoine de teneur, en antimoine inférieure à 67 p. 100 sont seuls magnétiques; ils abandonnent, sous l'action prolongée des acides sulfurique ou chlorhydrique, un corps de formule définie CoSb, dénué de propriétés magnétiques.

2. Le composé CoSb est susceptible de perdre de l'antimoine à température élevée en donnant des lingots magnétiques dont on peut isoler de nouveau la combinaison CoSb.

Ces faits tendent à prouver que les alliages cobalt-antimoine à moins de 67 p. 100 d'antimoine ne contiennent qu'un seul composé défini: CoSb.

Sur différents modes d'obtention de l'antimoniure de cobalt CoSb;

Par F. DUCELIEZ.

Dans notre précédente communication nous avons montré que l'on peut isoler de certains alliages de cobalt et d'antimoine la combinaison CoSb.

Ce composé peut encore s'obtenir :

I. En maintenant à 1200°, dans un courant d'hydrogène, des alliages de cobalt et d'antimoine contenant plus de 67 p. 100 d'antimoine.

Un mélange effectué à 97 p. 100 d'antimoine est porté à 500°, de façon à obtenir la combinaison, puis porphyrisé. La matière première ainsi préparée, isolée dans un courant d'hydrogène, a été soumise à des températures croissantes. Nous avons constaté, dans une première série d'expériences effectuées dans un tube de verre, sur la grille à gaz, le début de la formation d'un anneau d'antimoine vers 700°. Ce début de décomposition se fait toujours à 700°, lorsque les alliages contiennent plus de 80 p. 100 d'antimoine. Le lingot provenant de ces opérations, finement fragmenté, est placé dans une nacelle en porcelaine contenue dans un tube de même nature, parcouru par un courant d'hydrogène, et chauffé au four à gaz. Des opérations successives faites à des températures croissantes montrent que l'antimoine ne distille abondamment que vers 1200° sans entraîner de cobalt. Nous obtenons, après avoir maintenu dix heures la température de 1200°, un nouveau culot titrant 78,81 p. 100 d'antimoine.

Une nouvelle chauffe semblable, effectuée sur le corps précédent porphyrisé, amène encore la distillation de l'antimoine; on trouve un bouton métallique auquel l'analyse assigne la composition :

Cobalt	29,80
Antimoine.	70,17
	<hr/>
	99,97

Par un traitement subséquent, on produit un alliage gris fer brillant,

particulièrement fragile, se réduisant en poussière cristalline sous la seule pression des doigts ; il contient :

Cobalt	33,07
Antimoine.	<u>66,85</u>
	99,92

composition correspondant à CoSb.

Un nouveau traitement ne libère alors que des traces d'antimoine ; l'aspect du culot n'est pas modifié, sa teneur en antimoine trouvée est 66,88 p. 100 (1).

II. En faisant agir, à une température voisine de 1300°, de l'antimoine en vapeur, entraîné par un léger courant d'hydrogène, sur du cobalt bien réduit ou sur les alliages à moins de 67 p. 100 d'antimoine.

Deux nacelles, l'une contenant 1 gramme de cobalt, l'autre, un grand excès d'antimoine, sont placées dans un tube en porcelaine ; un léger courant d'hydrogène est susceptible d'amener les vapeurs d'antimoine au contact du cobalt. Le tout est maintenu plusieurs heures à 1300° environ, au moyen d'un four à gaz, puis refroidi par un rapide courant d'hydrogène, exempt de vapeurs d'antimoine, à l'intérieur du tube ; à l'extérieur, par l'air froid, puis par l'eau.

Le cobalt est alors transformé en un alliage pesant 3 gr. 07, présentant l'aspect ordinaire de CoSb. Sa composition calculée :

Cobalt	1 ^{er} »
Antimoine.	<u>2,07</u>
	3,07

correspond à :

Cobalt	32,57
Antimoine	<u>67,43</u>
	100,00

soit CoSb

L'analyse confirme ce résultat, elle donne :

Cobalt	33,07
Antimoine.	<u>67,85</u>
	100,92

(1) La température de 1200° correspond justement à la fusion du composé CoSb.

Il est nécessaire d'éviter par un courant d'hydrogène assez vif le dépôt de l'antimoine auprès de la nacelle; cette facile condensation, même dans les parties chaudes, qui indique probablement la formation momentanée d'hydrogène antimoné, empêche de prendre pour le début des opérations la température de 700° à laquelle l'antimoine est déjà susceptible de se déplacer dans l'hydrogène.

III. PAR L'ACTION DU TRICHLORURE D'ANTIMOINE SUR LE COBALT. a) Une nacelle contenant du cobalt bien réduit est placée dans un tube de verre horizontal, parcouru momentanément par un courant d'hydrogène, puis ce gaz est chassé par des vapeurs de chlorure d'antimoine. On élève progressivement la température; à 600°, du chlorure de cobalt commence à se déposer près de la nacelle, mais la réaction n'est vive que vers 800°; à cette température apparaît au-dessus du métal soumis à l'expérience une flamme livide.

Après refroidissement dans l'hydrogène, on retrouve dans la nacelle une masse qui abandonne sous l'action de l'eau une poussière cristalline gris clair, tandis que du chlorure de cobalt passe en solution. Cette matière cristalline est encore influencée par l'aimant, qui est susceptible d'en attirer un tiers environ; traitée par l'acide chlorhydrique étendu, elle abandonne des cristaux donnant à l'analyse :

	I	II
Cobalt.	33,80	33,25
Antimoine.	66,28	66,90
	<u>100,08</u>	<u>100,15</u>

soit CoSb.


b) Dans une série d'expériences effectuées de 700 à 800°, du cobalt est soumis à l'action du chlorure d'antimoine, comme antérieurement, mais sans employer l'hydrogène; ensuite, après lavage et porphyrisation de la matière obtenue, celle-ci est remise en expérience; une opération a environ la durée de deux heures.

Après le deuxième passage du chlorure volatil, le produit n'est plus magnétique. Il fournit à l'analyse successivement :

	Après la 3 ^e opération	Après la 4 ^e opération
Cobalt.	33,27	32,78
Antimoine.	66,14	66,29
	<u>99,41</u>	<u>99,07</u>

Cette composition, qui correspond à CoSb, ne peut être dépassée si l'on maintient la température au-dessus de 700°; le produit est une poudre gris fer, nettement cristalline.

Dans cet intervalle de température fort peu d'antimoine se dépose dans le tube et seulement lorsque la composition de l'alliage est voisine de CoSb. Le poids de matière obtenu finalement pour 10 grammes de cobalt est : 11 gr. 52, ce qui vérifie approximativement la formule :



qui exige, pour 10 grammes de cobalt, 12 gr. 14 de CoSb.

La température de 800°, à laquelle l'action est vive et qui n'amène pas la fusion de l'antimoniure, nous paraît particulièrement favorable à la préparation de CoSb.

c) Si l'on opère à des températures plus élevées, le métal ou l'alliage élaboré subit une attaque d'autant plus rapide que la température est plus haute, il se dépose de l'antimoine dans le tube; au-dessus de 1200°, la difficulté de l'expérience s'accroît encore du fait de la fusion du corps. Toutefois, les deux résultats précédents se retrouvent seuls; on obtient : soit CoSb en opérant au-dessous de 1200° environ, soit si l'on dépasse 1200° un alliage magnétique susceptible d'abandonner le composé CoSb sous l'influence de l'acide chlorhydrique; ce dernier résultat était à prévoir au-dessus de 1450°.

Le composé CoSb est donc toujours formé au-dessus de 700°, lorsque l'on fait agir le trichlorure d'antimoine sur le cobalt.

d) Les alliages de cobalt et d'antimoine à moins de 67 p. 100 d'antimoine préparés par nous, porphyrisés et maintenus à 800° dans la vapeur de trichlorure d'antimoine, nous ont fourni l'antimoniure CoSb.

CONCLUSIONS. — Le composé CoSb s'obtient : 1. En maintenant à 1200° des lingots de cobalt et d'antimoine contenant plus de 67 p. 100 d'antimoine.

2. En faisant agir à 1300° de l'antimoine en vapeur sur le cobalt pulvérulent.

3. Par l'action à 800° du trichlorure d'antimoine sur le cobalt pulvérulent ou sur les alliages à moins de 67 p. 100 d'antimoine.

Les limites extrêmes de température où ces opérations paraissent pouvoir s'effectuer sont 700 et 1450°.

Les deux premières préparations sont susceptibles de donner le

corps, sous forme d'un culot fondu, cristallin, particulièrement fragile; la dernière le fournit ayant l'apparence d'une poudre cristalline; il doit toujours être dépourvu de propriétés magnétiques.

On reconnaît que le composé ainsi préparé possède les propriétés chimiques précédemment indiquées.

4. Des opérations incomplètes ou à température dépassant 1200° donnent, pour les préparations II et III, des produits magnétiques dont on peut isoler chimiquement la combinaison CoSb.

Étude chimique d'alliages binaires de cobalt, riches en antimoine;

Par M. F. DUCELLIEZ.

Dans cette étude, nous comprenons les lingots contenant plus d'antimoine que CoSb; nous savons qu'ils ne sont pas magnétiques et nous avons indiqué qu'ils s'obtiennent facilement dans les foyers ordinaires. Nos résultats nous conduisent à séparer les alliages à plus de 80 p. 100 d'antimoine de ceux en contenant de 67 à 80 p. 100.

I. ALLIAGES A PLUS DE 80 P. 100 D'ANTIMOINE. — Les mélanges de cobalt et d'antimoine à aussi forte teneur en ce dernier perdent, pendant leur fusion dans un courant d'hydrogène, une notable quantité d'antimoine. Aussi, des mélanges contenant respectivement 95, 90, 85 p. 100 d'antimoine, nous fournissent-ils des lingots donnant à l'analyse :

	CULOT A	CULOT B	CULOT C
Cobalt.	7,14	12,35	16,05
Antimoine. . . .	92,30	87,52	83,72
	99,44	99,87	99,77

Brillants, moirés, sonores, à texture cristalline, ils se fragmentent facilement. Leur poussière, finement porphyrisée, est traitée, avec ménagements, par l'acide azotique à 10 p. 100 et bouillant; l'action est vive et met en solution du cobalt; il reste une masse jaunâtre, composée en grande partie d'oxyde d'antimoine. Cette matière, reprise par la potasse en fusion, ou mieux, par l'acide chlorhydrique

concentré et chaud, laisse, après dissolution de l'acide antimonique par ces réactifs, un corps métallique, cristallin, de composition fixe.

Les culots A et B donnent des résidus représentant environ en poids 1 p. 100 de l'alliage mis en expérience.

a) Le corps éliminé du culot A, à l'aide de l'acide azotique et de l'acide chlorhydrique, fournit à l'analyse :

	I	II
	—	—
Cobalt.	20,55	19,05
Antimoine	79,21	80,27
	<u>99,76</u>	<u>99,32</u>

b) Le culot B, porphyrisé, traité par l'acide azotique, puis par la potasse, donne un corps contenant :

Cobalt.	20,29
Antimoine	80,08
	<u>100,37</u>

L'acide chlorhydrique substitué à la potasse fournit un résultat analogue soit :

Cobalt.	19,94
Antimoine	80,35
	<u>100,29</u>

c) Le culot C, finement fragmenté, mis en digestion avec de l'acide azotique très étendu, donne, après l'action de l'acide chlorhydrique concentré, un résidu assez abondant, qui, de nouveau, est traité de la même manière, ce qui ne modifie pas sa composition.

L'analyse donne :

	Après la 1 ^{re} attaque.	Après la 2 ^e attaque.
	—	—
Cobalt	19,13	19,16
Antimoine	80,03	80,07
	<u>99,16</u>	<u>99,23</u>

Nous sommes donc amené, par ces réactions, à un alliage de composition constante, voisine de celle exigée par la formule CoSb^2 soit :

FORMULE CALCULÉE POUR CoSb^2 .

Cobalt	19,73
Antimoine	80,27
	<hr/>
	100,00

PROPRIÉTÉS DE L'ANTIMONIURE CoSb^2 . — Ce corps se présente sous la forme d'une poudre grise, nettement cristalline, non magnétique. Chauffé dans un courant d'hydrogène, il se décompose à partir de 700° , il fond vers la même température. Les températures sont prises au moyen d'une pince thermo-électrique plongeant dans un bain de magnésie entourant le tube au niveau de la nacelle. Maintenu à 1200° dans un courant d'hydrogène, il se transforme en CoSb . La densité prise à zéro, 7,76, est supérieure à sa densité théorique 7,02. Le trichlorure d'antimoine n'a pas d'action sur lui au-dessous de 700° ; au-dessus de cette température, il y a formation de chlorure de cobalt et dépôt d'antimoine; la composition du produit se rapproche de CoSb , la réaction n'est bien nette qu'à température élevée, 1200° . Le trichlorure d'antimoine ne semble donc pas modifier les conditions de décomposition de ce corps sous l'influence de la chaleur seule.

Les réactifs chimiques usuels ont sur lui les mêmes effets que sur CoSb .

II. ALLIAGES DONT LA TENEUR EN ANTIMOINE VARIE DE 67 A 80 P. 100.

— Dans ces alliages dépourvus de propriétés magnétiques, la fragilité diminue avec la teneur en antimoine. Ils résistent à l'action des acides chlorhydrique et sulfurique. Cependant, porphyrisés et traités par ces acides concentrés et bouillants, ils fournissent, après élimination de cobalt et d'antimoine, un résidu cristallin non influencé par l'aimant. Des attaques par l'acide azotique donnent de l'azotate de cobalt et de l'acide antimonique; cet acide, éliminé par l'acide chlorhydrique, laisse apparaître également un résidu cristallin.

La composition de ces résidus, quel que soit le mode d'attaque, est celle du culot ou intermédiaire entre elle et celle de CoSb . Ainsi un culot contenant 78,92 p. 100 d'antimoine donne un résidu de

teneur 71,63; un autre culot à 70,60 p. 100 nous fournit un résidu à 68,13, soit environ CoSb .

Il ne nous est pas possible d'arriver, par action de réactifs chimiques sur ces alliages, à nous rapprocher de la combinaison CoSb^2 .

La chaleur agit sur eux, même lorsqu'ils sont en présence du trichlorure d'antimoine, comme sur CoSb^2 .

CONCLUSIONS. — Les alliages de cobalt et d'antimoine à plus de 80 p. 100 d'antimoine contiennent le composé CoSb^2 que nous en isolons par des attaques à l'acide azotique suivies de lavages de la matière obtenue à l'acide chlorhydrique.

Les propriétés de CoSb^2 ont été étudiées.

TABLEAU

résumant les principaux résultats de notre étude sur les alliages de cobalt et d'antimoine.

TENEUR DES CULOTS en antimoine	ALLIAGES DÉFINIS ISOLÉS	PROPRIÉTÉS DES CULOTS									
92 »		Sonores		Sous l'influence de l'ac. azotique laissent un résidu de CoSb^2							
80,27	CoSb^2 <table><tr><td>Co. .</td><td>19,73</td></tr><tr><td>Sb². .</td><td>80,27</td></tr><tr><td></td><td>100,00</td></tr></table> <p>$\text{Do}^0 = 7,76$. Se décom- pose dans l'hydrogène à 700°. Fond vers 700°.</p>	Co. .	19,73	Sb ² . .	80,27		100,00	De plus en plus fragiles	Alliages non magnétiques.		Maintenus à 1200° dans l'hydrogène se transforment en CoSb
Co. .	19,73										
Sb ² . .	80,27										
	100,00										
67,04	CoSb <table><tr><td>Co. .</td><td>32,96</td></tr><tr><td>Sb. .</td><td>67,04</td></tr><tr><td></td><td>100,00</td></tr></table> <p>$\text{Do}^0 = 8,12$. Se décom- pose dans l'hydrogène à 1450°. Fond à 1200°.</p>	Co. .	32,96	Sb. .	67,04		100,00	Fragilité maxima	Limite du magnétisme		Maintenus (1) à 800° dans la vapeur de trichlorure d'antimoine se transforment en CoSb . (2) A 1500° dans la vapeur d'antimoine entraînée par l'hydrogène se transforment en CoSb .
Co. .	32,96										
Sb. .	67,04										
	100,00										
9 »		De moins en moins fragiles	Alliages magnétiques.	Traités par l'acide chlorhy- drique ou sulfurique abandonnent CoSb							

Action de quelques métaux sur les solutions aqueuses d'émétique;

Par M. A. RICHARD.

L'action des bases et des acides sur les solutions aqueuses d'émétique a été étudiée par un certain nombre de chimistes. En revanche, peu de recherches ont été entreprises ayant pour objet l'action des métaux sur ces mêmes solutions. Je n'ai même trouvé qu'une seule indication de ces études, et encore se réduit-elle à fort peu de chose. « Certains métaux : le fer, le zinc, l'étain, mettent en liberté l'antimoine de l'émétique. »

Dans l'espoir que cette étude, faite d'une façon plus approfondie, apporterait quelque éclaircissement au problème de la constitution de l'émétique, j'ai examiné quelques cas particuliers, et ce sont les résultats de ces recherches que je vais résumer.

I. Dans une première série d'expériences, j'ai fait réagir, à la température ordinaire, les trois métaux précédemment nommés : le fer, le zinc et l'étain, sur des solutions d'émétique ayant la même concentration. Les résultats sont loin d'être identiques.

Le zinc se recouvre presque instantanément d'une couche noire d'un métal qui n'est autre que l'antimoine. En même temps, quelques bulles gazeuses se dégagent. Enfin, au bout de quelque temps se forme un oxyde d'antimoine.

Avec le fer, l'attaque est plus lente, le dépôt d'antimoine est à peine visible après vingt-quatre heures.

Enfin, l'étain est sans action et reste brillant après plusieurs mois de séjour dans la solution d'émétique.

II. Ces résultats peu concordants m'engagèrent alors à prendre des métaux plus réducteurs, tels les métaux alcalins.

Mais ces corps présentent un grave inconvénient; la base qui prend naissance au contact de l'eau, produit une réaction secondaire qui masque presque complètement le fait que je voulais mettre en évidence, c'est-à-dire le déplacement de l'antimoine de l'émétique par des métaux. Toutefois, si l'on suit un peu attentivement ce qui se passe

lorsqu'on projette un fragment de potassium ou de sodium dans une solution d'émétique, on constate qu'avec le précipité blanc d'oxyde d'antimoine qui se forme par l'action de la potasse ou de la soude, il y a un corps noir pulvérulent qui est de l'antimoine métallique.

III. Le magnésium donne des résultats plus précis qui ont retenu particulièrement mon attention.

Si l'on ajoute du magnésium en petits fragments dans une solution d'émétique, on voit le brillant du métal se ternir rapidement en même temps qu'il se dégage de fines bulles d'hydrogène. Au bout de quelque temps, un corps blanc gélatineux prend naissance et, au bout de vingt-quatre heures environ, le vase est rempli presque complètement par cette masse blanche. Si l'on chauffe, le corps blanc se dissout, mais se reforme à nouveau par le refroidissement. J'ai profité de cette propriété pour étudier séparément le métal précipité et le corps blanc en filtrant le liquide chaud.

Le résidu métallique a été traité par l'acide acétique qui a attaqué le magnésium en excès et laissé un métal pur, l'antimoine, comme le montre le résultat suivant.

Pour un poids de 0 gr. 4789 de métal, j'ai obtenu 0 gr. 6052 de l'oxyde $\text{Sb}^{\circ}\text{O}^4$, alors que le nombre théorique est égal à 0 gr. 6066 si le corps est de l'antimoine pur. La presque identité de ces nombres montre bien que le magnésium a précipité l'antimoine de l'émétique.

Quant au corps blanc, je le traite par l'eau bouillante de façon à le séparer des tartrates qui sont mélangés avec lui. Des nombreuses analyses que j'ai faites, il résulte que le précipité ainsi obtenu est de l'acide méta-antimonieux $\text{SbO}(\text{OH})$.

Ainsi 0 gr. 2144 de ce corps blanc contiennent 78,24 p. 100 d'antimoine, alors que le nombre calculé pour $\text{SbO}(\text{OH})$ est 78,46 p. 100.

La formation de cet oxyde d'antimoine est due à une action secondaire, car la proportion d'antimoine métallique obtenue augmente si l'on traite la solution d'émétique par une grande quantité de magnésium ajouté en une seule fois, alors que l'oxyde diminue dans les mêmes conditions.

Ainsi, dans une première expérience où j'avais employé 1 gr. 0103 de magnésium j'ai obtenu 1 gr. 5975 d'antimoine dans une solution contenant 9 gr. 6616 d'émétique, alors que dans une autre expérience faite dans les mêmes conditions de concentration de la solution

pour 4 gr. 0588 de magnésium ajoutés en une seule fois, j'ai obtenu 2 gr. 2756 d'antimoine.

Il faut enfin noter que dans cette réaction la solution, légèrement acide au début, devient nettement basique.

Si enfin l'on rapproche cette action du magnésium sur les solutions d'émétique de l'action de ce même métal sur un très grand nombre d'autres sels métalliques⁽¹⁾, on constate une identité complète : précipitation du métal du sel et formation d'un oxyde métallique avec dégagement d'hydrogène. Ce parallélisme dans les réactions du magnésium semblerait donner raison aux chimistes qui considèrent l'émétique comme un sel double de potassium et d'antimoine. Toutefois, de nouvelles études sont nécessaires avant de pouvoir donner pareille conclusion.

(¹) SERGIUS-KERN, *Chem. News*, t. XXXII, p. 309, 1875, et t. XXXIII, p. 112, 1876.

OUVRAGES REÇUS PAR LA SOCIÉTÉ

DU 1^{er} NOVEMBRE 1907 AU 1^{er} NOVEMBRE 1908.

N. B. — *A partir du 1^{er} novembre 1908, il n'est plus envoyé d'accusés de réception; la liste des ouvrages reçus, rédigée avec soin, en tient lieu.*

I. — PÉRIODIQUES

ALLEMAGNE

- BERLIN.** — **K. Preussische Akademie der Wissenschaften.** — Mathematische Abhandlungen, 1907; Physikalische Abhandlungen, 1907; Sitzungsberichte, 1907 (XXXIX-LIII) et 1908 (I-XXXIX).
- BONN.** — **Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.** — Sitzungsberichte, t. 64 (I-II, 1907).
- **Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinland und Westphalen,** t. 64 (I-II, 1907).
- BRAUNSCHWEIG.** — **Verein für Naturwissenschaft.** — Jahresbericht, t. 15 (1907).
- BREMEN.** — **Naturwissenschaftlicher Verein.** — Abhandlungen, t. 17 (II).
- BRESLAU.** — **Schlesische Gesellschaft für vaterlandischen Cultur.** — Jahresbericht, t. 84 (1906); Litteratur (1904-1906).
- CASSEL.** — **Verein für Naturkunde.** — Abhandlungen und Bericht, t. 51 (1907).
- DANZIG.** — **Naturforschende Gesellschaft.** — Schriften, t. 12 (I-II).
- **Westpreussischer botanisch-zoologischer Verein.** — Bericht, n° 30 (1908).
- DRESDEN.** — **Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis.** — Sitzungsberichte und Abhandlungen, 1907 (II), 1908 (I).
- FRANKFURT a M.** — **Senckenbergische naturforschende Gesellschaft.** — Abhandlungen, t. 30 (III, 1907), Festschrift... (1907), Bericht, 1907.
- FREIBURG i B.** — **Naturforschende Gesellschaft.** — Berichte, t. 15 (1907) et t. 17 (I).
- GÖTTINGEN.** — **K. Gesellschaft der Wissenschaften.** — Nachrichten, Mathem.-physik. Klasse, 1907 (IV, V) et 1908 (I à III); Geschäftl. Mittheilungen, 1906 (II), 1907 (II), 1908 (I).
- HALLE.** — **Wissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen.** — Zeitschrift für Naturwissenschaften, t. 79 (III à VI), t. 80 (I-II).
- HAMBURG.** — **Naturwissenschaftlicher Verein.** — Verhandlungen, 3^e Folge, t. 14 (1906) et 15 (1907); Abhandlungen, t. 19 (I et II).
- KÖNIGSBERG.** — **Physikalisch-ökonomische Gesellschaft.** — Schriften, t. 47 (1906).
- LEIPZIG.** — **Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften, Math.-Phys. Klasse.** — Abhandlungen, t. 30 (I, II, III); Berichte, t. 59 (II à IV) et 60 (I, II).
- **Naturforschende Gesellschaft.** — Sitzungsberichte, t. 33 (1906).
- **Fürstlich Jablonowskische Gesellschaft.** — Jahresbericht, März 1908.

- MÜNCHEN. — **K. Bayer. Akad. der Wissenschaften, Math.-Phys. Klasse** — Abhandlungen, t. 23 (II) et 24 (I); Sitzungsberichte, t. 37 (III).
- OSNABRUCK. — **Naturwissenschaftlicher Verein.** — Jahresbericht, t. 16 (1903-06).
- STUTTGART. — **Verein für Vaterländische Naturkunde.** — Jahresheft 64 et 2 Beilagen.
- THORN. — **Copernicus Verein.** — Mittheilungen, n° 15 (1907).

ALSACE-LORRAINE

- MULHOUSE. — **Société industrielle.** — Bulletin, t. 77 (VIII à XII), t. 78 (I à VIII); Procès-verbaux, 1908 (I à III).

AUTRICHE-HONGRIE

- BRÜNN. — **Naturforschender Verein.** — Verhandlungen, t. 45 (1906); Bericht der Meteor. Commission, t. 25 (1905) et Ergebnisse... im J. 1905.
- BUDAPEST. — **Académie hongroise des Sciences.** — Rapport sur ..., 1906; Math. es Term. Ertesitő, t. 24 (III à V) et 25 (I); Math. es Term. Közlemenyek, t. 29 (I, II); Math. und naturw. Berichte, t. 23 (1905).
- **Institut royal géologique de Hongrie.** — Földtani Közlöny, t. 37 (IV à XII) et t. 38 (I à V); Jahresbericht, 1906: Evkönyve, t. 4 (I); t. 6 (I, II); t. 9, 10, 11 (sauf III), 12, 13 (sauf II), 14, 15, 16; Mittheilungen aus dem Jahrbuch, t. 1 (I à V), 2 (I à III), 3 (I, II), 4 (IV), 8 (VIII), 16 (I à III); Geol. Spezialkarten, 19-XXVI, 19-XXVIII, 20-XXVIII; Erläuterungen ..., die Umgebung von Magura, die Umgebung von Abrudbánya.
- CRACOVIE. — **Académie des Sciences.** — Rozprawy, nauki mat.-fiz., t. 47; nauki biologiczne, t. 47.
- GRAZ. — **Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.** — Mittheilungen, t. 22.
- INNSBRUCK. — **Naturw.-Medizinischer Verein.** — Berichte, t. 31 et Beilage.
- PRAG. — **K. Böhmisches Gesellschaft der Wissenschaften.** — Jahresbericht, 1907; Sitzungsberichte, 1907.
- **Jednoty Ceskych Matematiků.** — Sborník, t. 10; Casopis, t. 36 (V) et 37 (I à V).
- **K.-K. Sternwarte.** — Magnetische und meteorologische Beobachtungen, t. 68.
- WIEN. — **K.-K. Akademie der Wissenschaften.** — Sitzungsberichte, math. naturw. Klasse, II Abtheilung, A, t. 115; B, t. 115.

BELGIQUE

- BRUXELLES. — **Académie royale.** — Annuaire, 1908; Bulletin de la classe des Sciences, 1907 (VI à XII), 1908 (I, II); Mémoires in-4°, t. 1 (III à V); Mémoires in-8°, t. 1 (IV à VIII), 2 (I, II).
- **Observatoire royal.** — Annuaire astronomique, 1907, 1908; Annuaire météorologique, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 et 1908; Annales (météorologie), t. 20.
- **Société entomologique.** — Annales, t. 51.
- **Société malacologique.** — Annales, t. 41, 42.
- **Société scientifique.** — Annales, t. 32.
- **Société belge de Microscopie.** — Annales, t. 28 (II).
- LIÈGE. — **Société géologique.** — Annales, t. 34 (II, III), 35 (I); Mémoires, t. 1 (III).
- **Société royale des Sciences.** — Mémoires, 3^e série, t. 7.

BRÉSIL ET RÉPUBLIQUES SUD-AMÉRICAINES

RIO-DE-JANEIRO. — **Observatorio.** — Anuario, t. 24; Boletín mensual, 1907 (I, II).
MONTEVIDEO. — **Museo Nacional.** — Anales, t. 6.

DANEMARK

KOPENHAGEN. — **K. Danske Videnskabernes Selskabs.** — Oversigt, 1907 (III à VI), 1908 (I à III).

ÉGYPTE

LE CAIRE. — **Institut Égyptien.** — Bulletin, 5^e série, t. I; Mémoires, t. 5 (II).

ESPAGNE

MADRID. — **Sociedad Espanola de Fisica y Química.** — Anales, t. 6 (XLIX à LI).

ÉTATS-UNIS ET RÉPUBLIQUES NORD-AMÉRICAINES

BALTIMORE. — **John Hopkins University.** — Circular, 1907 (VII à IX), 1908 (I à V, VII); American Journal of Mathematics, t. 29 (IV), 30 (I, II).

BERKELEY. — **University of California.** — Botany, t. 2 (XIV à XVI), 3 (I); Geology, t. 5 (VI à XI); Physiology, t. 3 (X à XI); Zoology, t. 2 (XIII), t. 3 (VIII à XIV), 4 (I, II).

BOSTON. — **American Academy of Arts and Sciences.** — Proceedings, t. 43 (IV à XXII).

— **Society of Natural History.** — Proceedings, t. 33 (III à IX).

BOULDER. — **University of Colorado.** — Studies, t. 5.

BROOKLYN. — **Museum of the Brooklyn Institute.** — Science Bulletin, t. 1 (XI à XIII).

CAMBRIDGE. — **Museum of comparative zoology at Harvard College.** — Annual Report, 1906-07; Notice sur L. Agassiz; Adress. de 1902; Bulletin, t. 48 (IV), 49 (V à VII), 51 (V à XII), 52 (I à V); Memoirs, t. 26 (VI), 35 (II).

CHICAGO. — **Academy of Science.** — Special public., n^o 2.

KANSAS. — **University of Kansas.** — Science Bulletin, t. 7 (V).

NEW-HAVEN. — **Connecticut Academy of Arts and Sciences.** — Transactions, t. 13 (II à VII).

NEW-YORK. — **Academy of Science.** — Annals, t. 17 (II, III), 18 (I, II).

— **American mathematical Society.** — Annual Register, 1908; Bulletin, t. 14 (II à X), 15 (I); Transactions, t. 8 (IV), 9 (I à III).

— **Cornell University.** — Journal of physical Chemistry, t. 11 (VII à IX), 12 (I à III, VI à VII); Physical Review, t. 25 (V, VI), 26, 27 (I à IV).

PHILADELPHIA. — **Academy of Natural Science.** — Proceedings, t. 59 (II, III), 60 (I).

— **American philosophical Society.** — Proceedings, t. 46, 47 (188).

— **University of Pensylvania.** — Publications of the Botanical Laboratory, t. 3 (I).

SAINT-LOUIS. — **Academy of Science.** — Transactions, t. 16 (VIII, IX), 17 (I, II).

— **Missouri Botanical Garden.** — Annual Report, 1907.

- WASHINGTON. — **U. S. Department of Agriculture.** — Yearbook, 1907.
 — **U. S. Naval Observatory.** — Report of the Superintendent, 1907.
 — **Smithsonian Institution.** — Annual Report, part I, 1906; part II (States National Museum), 1907.
 TORONTO. — **Royal Society of Canada.** — Proceedings and Transactions, 2^e série, t. 12 (II) et General Index, 1882-1906; 3^e série, t. 1.

FRANCE

- AGEN. — **Société d'Agriculture, Sciences et Arts.** — Recueil des travaux, t. 15.
 ALAIS. — **Société scientifique et littéraire.** — Revue Cévenole, t. 9.
 AMIENS. — **Société industrielle.** — Bulletin, t. 45 (IV à VI), 46 (I); Table générale 1892-1902.
 — **Société linnéenne du Nord de la France.** — Bulletin, t. 18 (p. 369 à 380).
 ANGERS. — **Société d'études scientifiques.** — Bulletin, t. 36.
 ARCACHON. — **Société scientifique et zoologique.** — Travaux des Laboratoires, t. 10, 11.
 BAGNÈRES-DE-BIGORRE. — **Société Ramond.** — Bulletin, t. 42 (II à IV), 43 (I, II).
 BESANÇON. — **Société d'émulation du Doubs.** — Mémoires, 8^e série, t. 1.
 BÉZIERS. — **Société d'étude des sciences naturelles.** — Bulletin, t. 29.
 BORDEAUX. — **Société de Médecine et de Chirurgie.** — Bulletins et Mémoires, 1907.
 — **Société de Pharmacie.** — Bulletin, t. 47 (VII à XII), 48 (I à VII).
 — **Société de Géographie commerciale.** — Bulletin, t. 33 (XI, XII), 34 (I à X).
 CAEN. — **Société linnéenne de Normandie.** — Bulletin, t. 10.
 — **Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.** — Mémoires, 1907.
 CHERBOURG. — **Société des Sciences naturelles et Mathématiques.** — Mémoires, t. 36.
 DAX. — **Société Borda.** — Bulletin, t. 32 (II à IV), 33 (I, II).
 GRENOBLE. — **Académie Delphinale.** — Bulletin, 5^e série, t. 1.
 — **Université.** — Annales, t. 19 (IV), 20 (I, II).
 MARSEILLE. — **Société scientifique et industrielle.** — Bulletin, t. 34 (III, IV), 35 (I, II).
 — **Faculté des Sciences.** — Annales, t. 16.
 NANCY. — **Société des Sciences.** — Bulletin, t. 8 (II, III), 9 (I à IV).
 — **Académie Stanislas.** — Mémoires, 1907-08.
 PARIS. — **Ministère de l'Instruction publique.** — Bibliographie générale..., t. 2 (I); Comptes rendus des Congrès des Sociétés savantes (section des Sciences), 1907; Discours. ..., 1908; Comité des travaux..., liste des membres, 1907.
 — **Académie des Sciences.** — Comptes rendus, t. 145 (XVIII à XXVI), 146, 147 (I à XVII).
 — **École Polytechnique.** — Journal, 2^e série, cahier 12.
 — **Conservatoire des Arts et Métiers.** — Catalogue des collections, t. 3, 5.
 — **Association française pour l'avancement des Sciences.** — Comptes rendus des sessions, 35^e (II), 36^e (I), 37^e (I, II); Bulletin (nouvelle série), n^{os} 8 à 11.
 — **Société d'Anthropologie.** — Bulletins et Mémoires, t. 8 (II à VI), 9 (I, II).
 — **Société française de Minéralogie.** — Bulletin, t. 30 (VII à IX), 31 (I à VI).
 — **Bulletin des Sciences mathématiques,** t. 31 (IX à XII), 32 (I à VIII).

- PARIS. — **Société mathématique de France.** — Bulletin, t. 35 (IV), 36 (I à III).
 — **Société Philomathique.** — Bulletin, t. 9.
 — **Club Alpin français.** — La Montagne, t. 3 (X à XII), 4 (I à X).
 RENNES. — **Société scientifique et médicale de l'Ouest.** — Bulletin, t. 15 (IV), 16, 17 (I).
 LA ROCHELLE. — **Académie (section des Sciences naturelles).** — Annales, t. 35; Flore de France, t. 10.
 ROUEN. — **Société des Amis des Sciences naturelles.** — Bulletin, t. 42.
 SAINT-LO. — **Société d'Agriculture, d'Archéologie et d'Histoire naturelle du département de la Manche.** — Notices, mémoires et documents, t. 25.
 SEMUR. — **Société des Sciences historiques et naturelles.** — Bulletin, t. 34, 35.
 TOULOUSE. — **Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres.** — Mémoires, t. VII.
 — **Société d'Histoire naturelle.** — Bulletin, t. 40, 41 (I, II).
 — **Faculté des Sciences.** — Annales, t. 9 (II à IV), 10 (I).

GRANDE-BRETAGNE

- CAMBRIDGE. — **Philosophical Society.** — Proceedings, t. 14 (III à V) et List of members for 1907; Transactions, t. 20 (XIV à XVI) et 21 (I à IV).
 DUBLIN. — **Royal Irish Academy.** — Proceedings, t. 26 (B, X) et 27 (A, III à IX; B, I à V); Transactions, t. 9 (II).
 — **Royal Dublin Society.** — Scientific Proceedings, t. 11 (XXVI à XXVIII); Economic Proceedings, t. 1 (X à XII).
 EDINBURGH. — **Royal Society.** — Proceedings, t. 27 (V) et 28 (I à VIII); Transactions, t. 45 (II à IV), 46 (I).
 GLASGOW. — **Philosophical Society.** — Proceedings, t. 38.
 — **Institution of Engineers and Shipbuilders.** — Transactions, t. 50.
 LIVERPOOL. — **Literary and Philosophical Society.** — Proceedings, n° 60.
 LONDON. — **Royal Society.** — Proceedings, t. 79 (B, 535), 80 (A, 535 à 543; B, 536 à 542); 81 (A, 544 à 547).
 — **Royal astronomical Society.** — Monthly notices, t. 67 (IX), 68 (I à VIII).
 — **Royal microscopical Society.** — Journal, n° 180 à 186.
 — **Linnean Society.** — Proceedings, n° 119; List of members, 1907-08; Botany, t. 38 (264-267); Zoology, t. 30 (196 à 198) et 31 (203).
 — **Mathematical Society.** — Proceedings, t. 5 (VI, VII) et 6 (I à V); List of members, 1907-1908.
 MANCHESTER. — **Literary and Philosophical Society.** — Memoirs and Proceedings, t. 52 (I à III).

ITALIE

- BOLOGNA. — **R. Accademia delle Scienze.** — Memorie, t. 4; Rendiconti, vol. 11.
 CATANIA. — **Accademia Gioenia di Scienze naturali.** — Atti, t. 20; Bollettino delle Sedute, série 2, n° 1, 2.
 FIRENZE. — **Biblioteca nazionale centrale.** — Bollettino degli Pubblicazioni Italiane, n° 82 à 94 et Table 1907.
 MESSINA. — **R. Accademia Peloritana.** — Atti, t. 22 (I, II); Resoconti, 1907, aprile à giugno.
 MILANO. — **R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.** — Memorie, t. 20 (IX); Rendiconti, t. 39 (XVII à XX), 40 (I à XV).

- MILANO. — **Società Italiana di Scienze naturali.** — Atti, t. 46 (II à IV), 47 (I, II).
- MODENA. — **R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arte.** — Memorie, t. 6, 7.
- NAPOLI. — **Società Reale.** — Atti, t. 13; Rendiconti, t. 13 (III à XII).
- PALERMO. — **Circolo Matematico.** — Rendiconti, t. 24 (III), 25, 26 (I, II); Supplémenti, t. 2 (V, VI), 3 (I à IV); Annuario 1908.
- PISA. — **Società Toscana di Scienze naturali.** — Memorie, t. 23; Processi verbali, t. 16 (IV, V), 17 (I à IV).
- ROMA. — **R. Accademia di Lincei.** — Rendiconti, t. 16, (VII à XII), 17 (I à XII), 17, (I à VII); Rendic. dell' Adunanza... del 7 giugno 1908.
- **Società Italiana per il progresso delle Scienze.** — Atti, t. 1.
- TORINO. — **R. Accademia delle Scienze.** — Atti, t. 42 (XII à XV), 43 (I à X).
- **R. Osservatorio astronomico.** — Osservazioni meteorologiche, 1907.
- VENEZIA. — **Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti.** — Atti, t. 65, 66, 67 (I à IV); Eleuco dei Membri et Soci, 1907-08; Osservazioni meteorologiche e geodinamiche, 1906.

JAPON

- TOKYO. — **Imperial University, College of Science.** — Journal, t. 21 (VII à XII), 23 (I à XIV), 25 (XIX); Mémoires, t. 1 (III).
- **Earthquake Investigation Committee.** — Bulletin, t. 1 (tables), t. 2 (I); Publications, n° 22 A, 22 C.

PAYS-BAS ET INDES NÉERLANDAISES

- AMSTERDAM. — **K. Akademie van Wetenschappen.** — Verslagen, t. 15, 16; Proceedings, t. 9, 10; Verhandeligen, eerste Sectie, t. 9 (IV à VII); tweede Sectie, t. 13, 14 (I); Revue semestrielle des publications mathématiques, t. 16 et Index.
- **Wiskundig Genootschap.** — Nieuw Archief, t. 8 (II, III) et programme 1908; Wiskundige Opgaven, t. 10 (I).
- BATAVIA. — **K. Natuurkundige Vereeniging.** — Tijdschrift, t. 66, 67.
- **R. magnetical and meteorological Observatory.** — Observations, t. 28; Regenwaarneningen, 1906.
- HAARLEM. — **Hollandische Maatschappij der Wetenschappen.** — Natuurkundige Verhandeligen, t. 6 (III, IV); Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles, t. 12 (V), 13 (I à V).
- **Musée Teyler.** — Archives, t. 11 (I, II).
- LEYDE. — **Nederlandsche dierkundige Vereeniging.** — Tijdschrift, t. 10 (IV) et Aanwinsten der Bibliotheek, 1906-07.
- **Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas et de la Belgique,** t. 26 (III à VI), 27 (I à III).

PORTUGAL

- PORTO. — **Academia polytechnica.** — Annaes scientificos, t. 2 (IV), 3 (I, II).

RUSSIE

- KAZAN. — **Université.** — Mémoires, t. 74 (I, II, IV à XII), 75 (I à IX).
- KIARKOFF. — **Société des Sciences physicochimiques.** — Travaux, t. 32 (Suppléments XVI à XIX).
- MOSCOU. — **Société mathématique.** — Recueil mathématique, t. 25 (IV), 26 (I à III).
- **Société impériale des naturalistes.** — Bulletin, t. 20 (III, IV), 21 (I à III).

SAINT-PÉTERSBOURG. — **Académie impériale des Sciences.** — Bulletin, 1907 (XIV à XVII), 1908 (I à XIII); Mémoires, t. 17 (VII), 18 (I à VI), 19 (I à III, V à XI), 20 (II à IX).

— **Jardin botanique impérial.** — Acta, t. 25 (II), 27 (I, II), 28 (I), 29 (I).

VARSOVIE. — **Towarzystwa Naukowego.** — Sprawozdania, t. 1 (I à III).

SUÈDE ET NORVÈGE

LUND. — **Université.** — Acta, t. 17, 18.

STOCKHOLM. — **K. Svenska Vetenskaps-Akademia.** — Handlingar, t. 42 (V à IX); Arsbok, 1907; Les prix Nobel en 1905; Medellanden, t. 1 (I, II, VI à XI); Arkiv för Matematik, t. 3 (III, IV), 4 (I, II); Arkiv för Kemi, t. 2 (IV à VI), 3 (I); Arkiv för Zoologi, t. 3 (III, IV), 4 (I, II); Arkiv för Botanik, t. 6 (III, IV), 7 (I, II); Accessions-Katalog, t. 20; Astronomiska iakttagelser, t. 8 (IV, VI, VII).

SUISSE

BASEL. — **Naturforschende Gesellschaft.** — Verhandlungen, t. 19.

BRUN. — **Naturforschende Gesellschaft.** — Mittheilungen, 1906 (p. 1609 à 1628).

— **Société helvétique des Sciences naturelles.** — Actes, 1906, 1907; Comptes rendus, 1904, 1905, 1906, 1907.

GENÈVE. — **Société de physique et d'histoire naturelle.** — Mémoires, t. 35 (III).

LAUSANNE. — **Société Vaudoise des Sciences naturelles.** — Bulletin, n° 160, 161, 162.

NEUCHÂTEL. — **Société Neuchâteloise des Sciences naturelles.** — Bulletin, t. 33, 34.

ZÜRICH. — **Naturforschende Gesellschaft.** — Vierteljahrsschrift, t. 51 (II à IV), 52 (I à IV).

II. — NON PÉRIODIQUES

D^r W. VAN BEMMELEN. — **Over den Regenval op Java.** Batavia, 1908, 1 vol. in-8°.

D^r Ch. BLAREZ. — **Vins et Spiritueux considérés au point de vue de la loi sur les fraudes.** Paris, 1908, 1 vol. in-8°.

A. BRASSEUR. — **La psychologie de la Force.** — Paris, 1907, 1 vol. in-8°.

Josef-Georg BÖHM. — **Die Kunst-Uhren auf der K. K. Sternwarte zu Prag.** Prag, 1908, 1 vol. in-4°.

P. CARMIGNAC-DESCOMBES. — **Congrès de l'Aménagement des montagnes,** t. I, II; avec 8 brochures sur le même sujet. Bordeaux, 2 vol. et 8 broch. in-8°.

E. FALLOT. — **Adrien Baysseance.** — Bordeaux, 1908, 1 brochure in-8°.

VAN GELDER. — **Sur l'emploi de la force centrifuge pour la séparation des minerais.** — Thèse Delft, 1908, 1 brochure in-8°.

A. HAUTREUX. — **Les glaces et les brumes de l'Atlantique Nord.** — Bordeaux, 1908, 1 brochure in-8°.

— **Pluviométrie en 1907.** — Bordeaux, 1908, 1 brochure in-8°.

W. HEIN. — **Zur Biologie der Forellenbrut,** t. II, III. Munich, 1907, 1 volume in-8°.

G. HENRIKSEN. — **Sundry geological Problems.** Christiania, 1908, 1 vol. in-8°.

HULTH. — **Bibliographia linnaeana,** part I, livr. I. Upsal, 1907, 1 volume in-8°.

- Christian HUYGHENS. — **Œuvres complètes**, t. 11. Haarlem, 1908, 1 volume in-4°.
- International Association for promoting the Study of quaternions and allied Systems of Mathematics.** Lancaster, 1908, 1 brochure in-8°.
- KOOMANS. — **Influence de la self induction sur les conducteurs téléphoniques.** Thèse Delft, 1908, 1 brochure in-8°.
- J. MIKLOS. — **Étude sur les parasites de la fièvre intermittente.** Budapest, 1907, 1 brochure in-8°.
- A. MOMBER. — **Friedrich Ernst Kayser, sein Leben und Wirken.** Danzig, 1908, 1 brochure in-8°.
- Georges RAYET. — (Notice sur la vie et les travaux de). — Bordeaux, 1907, 1 brochure in-4°.
- D^r Z. RÓNA. — **Eghajlat.** I Resz. — Budapest, 1907, 1 volume in-8°.
- J.-M. SCHAEFERLE. — **Geological Climates.** — Ann Arbor, 1908, 1 extrait in-8°.
- **An Explanation of the Cause of the Eastward Circulation of our atmosphère.** Ann Arbor, 1908, 1 extrait in-8°.
- Alf. SELLA. — (Onoranze al Prof.) — Roma, 1908, 1 brochure in-4°.
- D^r GOMES TEIXEIRA. — **Obras sobre Mathematica**, t. IV. Coïmbra, 1908, 1 volume in-4°.
- D^r D.-R.-M. VERBEER. — **Rapport sur les Moluques.** — Batavia, 1908, 1 volume in-8°, avec un atlas in-f°.
- D^r F. VEJDovsky. — **Neue Untersuchungen über die Reifung und Befruchtung.** Prag, 1907, 1 brochure in-4°.
- VIVIEN DE SAINT-MARTIN et SCHRADER. — **Atlas**, cartes 68, 74 et 76. — Paris, 1907 et 1908, trois cartes in-f°.

TABLE DES MATIÈRES DES PROCÈS-VERBAUX

ANNÉE 1907-1908

	Pages
L. BARTHE. — Sur quelques nouveaux dérivés bromés de la pyridine.	2
M. VÈZES et R. BRÉDON. — Sur la solubilité réciproque de l'essence de térébenthine et de l'alcool aqueux. — V. Résultats	7
J. KOWALSKI. — De l'imprégnation, par la méthode à l'argent réduit de Cajal, des neurofibrilles du <i>Lumbricus</i> , consécutivement à l'action du froid.	16
P. CARLES. — Le fluor et les produits œnologiques.	18
P. CARLES. — L'intoxication plombique par la vaisselle culinaire. . .	23
L. BARTHE. — Sur des combinaisons de l'acide borique et de l'acide sulfo-salicylique.	27
CH. PÉREZ. — Sur la présence du « <i>Lernæodiscus galatheaë</i> » Smith dans le golfe de Gascogne.	27
EM. VIGOUROUX. — Action réciproque du nickel et du plomb. . . .	28
F. DUCELLIEZ. — État chimique des alliages de cobalt et de plomb .	31
J. DUBAQUIÉ. — Élaboration et destruction de la matière grasse dans les végétaux.	35
M ^{me} BAUDEUF. — Action de la lumière sur les faux équilibres électriques	39
P. CARLES. — A propos de la fraude des farines	40
P. DESCOMBES et H. DEVAUX. — Reboisement en montagnes sans pépinières d'altitude	41
G. BOYER. — Recherches et observations sur les conditions de formation et de développement de la truffe mélanospore ou truffe du Périgord	44
M ^{me} BAUDEUF. — Action de la lumière sur les faux équilibres électriques	48
P. CARLES. — Louche singulier en bouteilles de quelques vins blancs.	48
EM. VIGOUROUX. — Action de l'arsenic sur le nickel	48
F. DUCELLIEZ. — Action de la chaleur sur le mélange d'arsenic et de cobalt.	57
L. BARTHE. — Action de l'acide sulfosalicylique sur le borax oxydiborodisulfone-salicylate de soude	74
EM. VIGOUROUX. — Sur la siliciuration du fer et du manganèse. . .	78
CH. PÉREZ. — Sur une Némerte d'eau douce « <i>Stichostemma Eilhardi</i> », Montgomery	81
M. VÈZES. — Sur les falsifications de l'essence de térébenthine. . . .	83
CH. PÉREZ. — Sur la métamorphose des mouches	88

	Pages
DUBAQUIÉ. — Extraction d'une « lipase » de l' <i>Aspergillus niger</i> . . .	88
J. LABORDE. — Sur l'origine de la matière colorante des raisins rouges.	91
M. VÈZES et SANS. — Sur la saponification de la colophane. —	
I. Méthode	94
M. VÈZES et SANS. — Sur la saponification de la colophane. —	
II. Courbes de solubilité.	101
H. PADÉ. — Sur la règle de Kummer	108
BARBARIN. — Sur la formule du prismatoïde	109
CH. PÉREZ. — Les migrations des parasites.	111
P. CARLES. — Les vins rouges girondins de 1907.	111
M. VÈZES et SANS. — Sur la saponification de la colophane. —	
III. Isothermes	119
M. VÈZES et SANS. — Sur la saponification de la colophane. —	
IV. Cas de la colophane américaine.	122
CH. PÉREZ. — Les migrations des parasites.	129
E. ESCLANGON. — Quelques problèmes sur le potentiel des masses	
attirantes	129
E. ESCLANGON. — Sur une méthode d'approximation dans la résolu-	
tion numérique des équations.	129
EM. VIGOUROUX. — Sur la formation des arséniures $NiAs$ et Ni^3As^2 . .	137
G. ARRIVAUT. — Comparaison de quelques résultats relatifs aux	
alliages de cuivre et de manganèse	142
M. GARD. — Sur un « oïdium » attaquant les feuilles de chêne . . .	144
E. ESCLANGON. — Quelques problèmes sur le potentiel des masses	
attirantes	144
EM. VIGOUROUX et SANFOURCHE. — Sur les arséniures de chôme .	144
P. CARLES. — L'acide carbonique en hydrologie.	151
EM. VIGOUROUX. — Sur les arséniures de fer	155
G. ARRIVAUT. — Sur les arséniures de manganèse	159
EM. VIGOUROUX et SANFOURCHE. — Sur les arséniures d'argent. .	163
EM. VIGOUROUX. — I. Action du trichlorure d'antimoine sur le	
nickel.	169
EM. VIGOUROUX. — II. Antimoniures de nickel	172
F. DUCELLIEZ. — D'un composé retiré de certains alliages de cobalt	
et d'antimoine.	175
F. DUCELLIEZ. — Sur différents modes d'obtention de l'antimoniure	
de cobalt $CoSb$	183
F. DUCELLIEZ. — Étude chimique des alliages binaires de cobalt riche	
en antimoine	187
A. RICHARD. — Action de quelques métaux sur les solutions aqueuses	
d'émétique.	191
<i>Ouvrages reçus par la Société du 1^{er} novembre 1907 au 1^{er} novembre 1908.</i>	195



3 2044 106 221 179

